本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

护理类考试真题及答案 9 篇

护理类考试真题及答案 9 篇 第 1 篇

有效沟通的方法是 A.沟通过程应使用专业术语 B.沟通中少用描述性语言 C.需要反反复复地与一个对象进行沟通 D.沟通中应该多说多讲，表达自己的情绪 E.随时评价沟通对象的观点，展开讨论

答案：C解析：有效沟通的方法包括：创造良好的沟通环境；学会有效地聆听；强化沟通能力；增强语言文字的感染力；“韧”性沟通；重视沟通细节的处理。

患者，女性，因 间断心悸半个月 入院，入院后经相关检查，诊断为 阵发性室上性心动过速 ，导致该患者发生快速性心律失常最常见的发病机制是 A.自律性增高 B.出现异常自律性 C.触发活动 D.折返 E.后除极

答案：D 解析：本题考查了心律失常的发病机制。折返是所有快速性心律失常最常见的发病机制。

可出现平均肺动脉压降低的是 A.肺血管阻力升高 B.二尖瓣狭窄 C.肺动脉狭窄 D.左心功能不全 E.肺血流量增加

答案：C解析：肺动脉狭窄可出现平均肺动脉压降低。

在健康教育的行为诊断中属于高可变行为的是 A.形成时间已久的行为 B.深深植根于文化传统或传统的生活方式之中的行为 C.既往无成功改变实例的行为 D.正处在发展时期或

刚刚形成的行为 E.社会赞成的行为

答案：D 解析：高可变行为包括：①正处在发展时期或刚刚形成的行为；②与文化传统或传统的生活方式关系不大的行为；③在其他计划中已有成功改变实例的行为；④社会不赞成的行为。A，B，C，E 均属于低可变行为。

急性腹膜炎发生休克的主要原因 A、腹膜吸收大量毒素，血容量减少 B、肠内积液刺激 C、大量呕吐致液体丢失 D、腹胀引起呼吸困难 E、剧烈疼痛

答案：A 解析：急性腹膜炎时病人腹膜会渗出大量液体以稀释毒素，减轻刺激，若液体渗出过多，病人可有血容量减少。腹膜有较强的吸收功能，可吸收大量渗液、血液、空气和毒素。但若急性腹膜炎病人病情严重，细菌产生的毒素超过了腹膜的吸收能力，病人可能出现感染中毒性休克。

需要避光保存的药物是 A、α－糜蛋白酶 B、酵母片 C、葡萄糖酸钙 D、洋地黄 E、盐酸肾上腺素

答案：E 解析：容易氧化和遇光变质的药物：应装在深色密盖瓶中，或放在有黑纸遮盖的纸盒中，并置于阴凉处。如盐酸肾上腺素、维生素 C、氨茶碱等。肾上腺素遇光易变质，针剂盒内应用黑纸遮盖。

患者男，45 岁。慢性咳嗽、咳痰 3 年多，冬重夏轻，3 天前咳嗽加重，咳黄痰。查体：双肺散在干、湿啰音，心脏正常。实验室检查：WBC1*109/L。胸片示：双肺中下肺野纹理增

强。最可能的诊断是（）。A.支气管哮喘 B.慢性支气管炎 C.支气管扩张 D.细菌性肺炎 E.支气管肺癌

答案：B 解析：患者有慢性咳、痰、喘，考虑诊断为慢性支气管炎。患者现咳嗽加重、咳黄痰、中性粒细胞升高、肺野纹理增强，考虑为慢性支气管炎急性加重期，合并细菌感染。

护理类考试真题及答案 9 篇 第 2 篇

行乙状结肠镜检查的患者，应采取的卧位是 A.头低足高位 B.膝胸位 C.侧卧位 D.俯卧位 E.截石位

答案：B 解析：膝胸卧位时，臀部抬高，肛门显露，便于医生操作。

关于缺铁性贫血的原因和发病机制的描述中，不包括 A:胃大部切除术后影响铁吸收 B:溶血性贫血 C:妇女月经过多 D:叶酸和维生素 B12缺乏 E:青少年生长发育需铁量增加，补充不足

答案：D 解析：与以下原因有关。①需要增加而摄入不足：婴幼儿、青少年生长快，需铁量多，铁摄入不足。育龄期女性需铁量亦增加，饮食中供铁不足。②铁吸收不良：胃大部切除或胃空肠吻合术后，由于胃酸缺乏、肠道功能紊乱、小肠黏膜病变等均可使铁吸收障碍。③损失铁过多：慢性失血，由于反复多次小量失血，常使体内贮存铁逐渐耗竭。选项 D 可引起巨幼细胞性贫血。

肝硬化病人发生肝性脑病最常见的诱因是（ ）。A.上消化道

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

出血 B.高蛋白饮食 C.大量放腹水 D.感染 E.电解质紊乱

答案：A 解析：肝性脑病最常见的病因是肝硬化，常见诱因有消化道出血、大量排钾利尿、放腹水、高蛋白饮食、催眠镇静药、麻醉药、便秘、尿毒症、外科手术及感染等。

患者女，32 岁。因双侧腰背酸痛，尿频，尿急，尿痛 7 天就诊。T:39.5 ℃，双肾叩击痛(++)，尿检：蛋白(+)，脓细胞(+++)，红细胞(+)，诊断为急性肾盂肾炎，下列哪项不是其护理诊断 A.体温过高 B.排尿异常 C.焦虑 D.知识缺乏 E.预感性悲哀

答案：E 解析：急性肾盂肾炎的护理：①提供良好的休息环境，保证病人睡眠充足。②给予富有高蛋白、高维生素的饮食，发热、全身症状明显者应给予流质或半流质饮食。消化道症状明显者可静脉补液，同时做好口腔护理，必要时遵医嘱用止吐药。在无禁忌证的情况下，指导病人多摄入水分、勤排尿，每日入液量应在 2000ml 以上。③高热时给予降温，注意观察及记录，给予相应护理；该患者体温 39.5℃，高于正常；尿检：蛋白(+)，脓细胞(+++)，红细胞(+)，另外可有焦虑、知识缺乏等。预感性悲哀是癌症患者的常见护理诊断，故选 E。解题关键：急性肾盂肾炎最严重的并发症是中毒性休克。

共用题干患者，男性，45 岁，有慢性乙型病毒性肝炎病史多年，因肝区疼痛 1 周来就诊，体格检查肝大，可扪及结节，

B 超怀疑肝癌。疼痛是困扰晚期肝癌患者的大问题，最新镇痛方式是 A:肌内注射哌替啶 B:患者自控镇痛 C:想像美好事物 D:提供安静舒适的环境 E:听音乐

答案：B解析：

宫内节育器放置术后的健康指导，错误的是 A:术后休息 3 天 B:2 周内禁性生活及盆浴 C:3 个月内月经或大便时注意有无节育器脱落 D:术后 3 个月、6 个月、1 年各复查一次，以后每年复查一次 E:术后如出现腹痛、发热、出血大于月经量，持续时间超过 7 天应随时就诊

答案：D 解析：宫内节育器放置术后的健康指导：术后休息 3 日，1 周内避免体力劳动，2 周内禁性生活及盆浴；3 个月内月经或大便时注意有无节育器脱落；术后 1 个月、3 个月、6 个月、1 年各复查 1 次，以后每年复查 1 次；注意保持外阴清洁，术后可有少量阴道流血及下腹不适，如出现腹痛、发热、出血大于月经量，持续时间大于 7 日应随时就诊。

A.梭状指 B.杵状指 C.匙状指 D.肢端肥大 E.雷诺现象类风湿关节炎可有(　　)

答案：A 解析：类风湿关节炎关节畸形：可形成梭状指。晚期可引起关节畸形，最常见的是手指关节半脱位引起尺侧偏斜、天鹅颈样畸形等。

护理类考试真题及答案 9 篇 第 3 篇

对心脏起搏器安置术后的患者进行指导，错误的是 A.平卧

4～6 小时 B.平卧 8～12 小时 C.可抬高床头 30° D.避免过度活动 E.保持伤口干燥

答案：A解析：

肝硬化患者全身状况良好，突然发生大量呕血，可能是 A.应激性溃疡出血 B.食管静脉曲张破裂出 mC.胃十二指肠溃疡出血 D.反流性食管炎出血 E.急性胆道出血

答案：B 解析：严重烧伤患者的应激反应可表现为消化道的溃疡出血。故选 A。肝硬化病人突发大量呕血，可能是食管静脉曲张破裂出血所致。故选 B。

治疗小儿病毒性心肌炎，主张大量使用的维生素是 A.维生素 AB.维生素 BC.维生素 CD.维生素 DE.维生素 E

答案：C 解析：大量维生素 C：维生素 C 是一种较强的抗氧化剂，有清除自由基的作用，从而保护心肌，改善心肌功能。

《医疗事故处理条例》将医疗事故分为 A.二级 B.三级 C.四级 D.五级 E.六级

答案：C解析：《医疗事故处理条例》将医疗事故分为四级。

甲状腺功能亢进症术后错误的护理是 A:病情平稳后给予半卧位 B:术后当天可给予温凉流食 C:注意观察切口渗血及引流管情况 D:引流物一般于术后 12～24 小时拔除 E:继续服碘剂

答案：D 解析：甲亢术后护理①血压平稳后给予半卧位，利于呼吸和切口渗出物的引流，A 对；②术后 6 小时可给予患

者温凉流食，B 对；③术后伤口内常放置胶片引流或胶管引流，保持引流通畅，注意引流液性质及量，C 对。引流物一般在术后，24～48 小时拔除，D错误。注意观察切口渗血及引流管情况。继续服用碘剂，E 对；④早期可用止痛药物，减轻疼痛。本题考生易误选 B，多数手术不可以在当天进食，以免产生胀气等不良反应，甲状腺手术患者消化系统不受影响，可在当天进食温凉流食，故 B 正确，本题错误护理选项是 D。

A.代谢性酸中毒 B.代谢性碱中毒合并呼吸性酸中毒 C.代谢性碱中毒 D.呼吸性碱中毒失代偿 E.混合型酸中毒低位肠梗阻最常见的酸碱失衡是

答案：A解析：1.高位肠梗阻呕吐出大量胃液，丢失氢离子，病人出现代谢性碱中毒。2.低位肠梗阻大量肠液积存在肠道，病人丢失大量碱性液体，出现代谢性酸中毒。

共用题干护士小张用紫外线灯为某病室进行空气消毒。消毒前，小张发现紫外线灯管积聚大量灰尘，应用下列哪种棉球擦拭灯管 A:无水乙醇棉球 B:75%乙醇棉球 C:生理盐水棉球 D:次氯酸钠棉球 E:碘伏棉球

答案：A解析：紫外线灯管应每周 2 次用无水乙醇棉球擦拭灰尘及污垢。7 选 A。紫外线消毒的效果受环境温度、湿度的影响。该病室内湿度过高，为保证良好的消毒效果，应延长消毒时间。8 选 B。

本文格式为 Word 版，下载可任意编辑

护理类考试真题及答案 9 篇 第 4 篇

遗传的物质基础是 A.基因 B.线粒体 C.染色体 D.生殖细胞 E.脱氧核糖核酸

答案：A 解析：基因是遗传的物质基础，是带有遗传信息的 DNA 分子片段，在染色体上有特定的位点。

新生儿胃食管反流的护理措施不正确的是 A.采用体位治疗 B.少量多餐 C.防止窒息 D.早产儿可采用胃管喂养 E.要保证药物和液体的进入

答案：D解析：

患者，男性，65 岁，胃溃疡病史 10 年。检查发现粪便隐血持续(+)，考虑可能是 A.溃疡加重 B.食管癌 C.溃疡性结肠炎 D.胃癌 E.萎缩性胃炎

答案：D 解析：根据题目意思，患者胃溃疡病史十年，粪便隐血实验持续阳性，故考虑为胃癌的可能，胃癌多数由胃溃疡转变。

属于器官移植慢性排斥反应特点的是（ ）。A.术后 1～2 周 B.术后 24 小时内发生 C.突发寒战高热 D.移植器官功能逐渐减退 E.移植器官肿大，局部疼痛

答案：D 解析：器官移植慢性排斥反应一般在器官移植后数月至数年发生，表现为进行性移植器官的功能减退直至丧失，主要病理特征是移植器官的毛细血管床内皮细胞增生，使动脉腔狭窄，并逐渐纤维化。慢性免疫性炎症是导致组织病理

变化的主要原因。

“您多大年纪了”属于（ ）。A.封闭式提问 B.开放式提问 C.探索式提问 D.偏向式提问 E.复合式提问

答案：A 解析：封闭式提问的问题比较具体，对方用简短、确切的语言即可做出回答，适用于收集简明的事实性资料。

A.妇科三合诊检查 B.子宫颈刮片细胞学检查 C.阴道镜检查 D.分段诊断性刮宫病理检查 E.碘试验宫颈癌普查筛选的首要方法为

答案：B 解析：子宫颈刮片细胞学检查是发现宫颈癌前期病变和早期宫颈癌的主要方法，敝第 10 题选 B。存诊断子宫内膜癌时除了根据病史、症状和体征外，最后确诊须根据分段诊断性刮宫病理检查结果，分段诊断性刮宫是确诊内膜癌最常用最可靠的方法，故第 11 题选 D。解题关键：早期确诊子宫内膜癌的方法是分段诊断性刮宫病理检查。

为确诊新型冠状病毒肺炎，对患者的痰液、咽拭子、下呼吸道分泌物等标本行实时荧光 RT-PCR，可检测到（ ）。A. 结核杆菌 B. MERS 冠状病毒阳性 C. SARS 冠状病毒阳性 D. 金黄色葡萄球菌 E. 新型冠状病毒核酸阳性

答案：E 解析：采用 RT-PCR 和或 NGS 方法在鼻咽拭子、痰和其他下呼吸道分泌物、血液、粪便等标本中可检测出新型冠状病毒核酸。因此答案选 E。

护理类考试真题及答案 9 篇 第 5 篇

65 岁。诊断为糖尿病，经过 2 年综合治疗，到医院复查，医生建议其抽血检查糖化血红蛋白。请问糖化血红蛋白可以反映多长时间血糖控制情况 A.近 2～3 个月 B.近 3～6 个月 C.近 1 个月 D.近 6～12 月 E.近 4～6 个月

答案：A 解析：糖化血红蛋白(GHb)测定可反映取血前 2～3 个月的血糖水平。

急性肾小球肾炎患儿出现严重循环充血时首选的治疗药物是 A:强心药 B:降压药 C:抗感染药 D:利尿药 E:扩张血管药

答案：D解析：

甲肝采用 A.血液体液隔离 B.接触隔离 C.呼吸道隔离 D.保护性隔离 E.消化道隔离

答案：E 解析：呼吸道隔离是预防经空气中的飞沫传播的感染性疾病的隔离方式。用于肺结核、麻疹等。消化道隔离用于防止经粪-口传播的感染。用于伤寒、甲型肝炎、脊髓灰质炎、感染性腹泻、细菌性痢疾等。

加重慢性肾小球肾炎患者功能损害的因素不包括（ ）。A.感染 B.劳累 C.持续低蛋白饮食 D.血压控制不佳 E.使用氨基糖苷类抗生素

答案：C 解析：感染、劳累、妊娠、肾毒性药物（如氨基糖苷类抗生素等）、高血压和蛋白尿是加速肾小球硬化、促进肾功能恶化的重要因素，均可能损伤肾脏，导致肾功能恶化，应予以避免。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/428064073120006137