

全科医学住院医师：社区卫生服务考试题（三）

- 1、单选 现行我国计划免疫工作（儿童基础免疫）规定接种的疫苗是（）。
- A. 卡介苗、百白破、麻疹疫苗、脊髓灰质炎疫苗、乙肝疫苗
 - B. 麻疹疫苗、卡介苗、百白破、乙肝疫苗、流行性（江南博哥）乙型脑炎疫苗、流行性腮腺炎疫苗
 - C. 乙肝疫苗、卡介苗、麻疹疫苗、流行性乙型脑炎疫苗、
 - D. 卡介苗、麻疹疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百日咳疫苗、流行性脑脊髓膜炎疫苗
 - E. 卡介苗、百白破、乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、流行性腮腺炎疫苗

正确答案：D

- 2、单选 治疗大多数品种的有机磷农药中毒采用（）。
- A. 阿托品
 - B. 胆碱酯酶复能剂
 - C. 对症治疗
 - D. 阿托品加对症治疗
 - E. 阿托品加胆碱酯酶复能剂加对症治疗

正确答案：E

- 3、单选 莱男，33岁，热水瓶厂喷漆工，近五年来常感头昏乏力，失眠，多梦，牙龈出血，皮下偶可见到紫癜，其可能与接触何种毒物有关（）。
- A. CS₂
 - B. CCl₄
 - C. 正己烷
 - D. 二甲苯
 - E. 苯

正确答案：E

- 4、单选 2003年春夏之交，我国发生的严重急性呼吸综合征（SARS），很快波及许多省市，这种发病情况称为（）。
- A. 爆发
 - B. 大流行
 - C. 季节性升高
 - D. 周期性流行
 - E. 局部流行

正确答案：B

参考解析：爆发指某地区某病在短时间内（一般以小时、天、周或月计算）发病数突然增多时，称爆发；大流行是指某病在短时间内迅速蔓延，其发病率显著超过该地区历年流行水平，且流行范围超过省、国，甚至洲界。

- 5、单选 我国发病率最高的食物中毒是（）。
- A. 化学性食物中毒
 - B. 细菌性食物中毒

- C. 有毒植物中毒
- D. 有毒动物中毒
- E. 霉菌毒素食物中毒

正确答案：B

参考解析：我国最为常见的食物中毒是细菌性食物中毒，其中又以沙门菌属引起最多。

6、单选 为评价某种一级预防措施控制冠心病发病的效果，最适合的研究方法是（）。

- A. 前瞻性队列研究
- B. 回顾性队列研究
- C. 临床试验
- D. 社区干预实验
- E. 横断面研究

正确答案：D

7、单选 关于职业病特点错误的是（）。

- A. 病因明确
- B. 存在剂量-反应关系
- C. 病因大多数可定量测定
- D. 病变程度均与有害因素作用强度有关
- E. 病变早期处理预后较好

正确答案：D

8、单选 男性，40岁，某印刷厂工人，因持续性腹绞痛，阵发性加剧而入院。患者自诉近五年来经常有腹绞痛发作，部位多在脐周，发作时尚能坚持工作。但近一年来，腹痛发作频繁，发作时大汗淋漓，面色苍白，在地上打滚，并伴有头痛、头昏、乏力、关节酸痛。体查：一般情况尚可，体温正常，面色苍白，牙龈有色素沉着，眼底动脉痉挛，腹部平软，肝脾未扪及，肠鸣音正常，诊断为慢性铅中毒。对职业性铅中毒的预防措施最有效的是（）。

- A. 上岗前健康检查
- B. 消除和控制生产环境中铅的浓度
- C. 合理使用防毒用具
- D. 加强健康教育
- E. 加强健康监护

正确答案：B

9、单选 关于我国肺癌发病主要趋势的描述，正确的是（）。

- A. 发病率和死亡率呈上升趋势
- B. 发病率和死亡率呈下降趋势
- C. 城乡间没有差距
- D. 东北向南、由东向西逐步上升的趋势

E. 女性高于男性

正确答案：A

10、单选 冠心病三个独立而可控的危险因素是（）。

- A. 高血压、高胆固醇症、吸烟
- B. 高血压、高胆固醇症、饮酒
- C. 高血压、静坐生活方式、吸烟
- D. 高血压、高胆固醇症、静坐生活方式
- E. 糖尿病、高胆固醇症、吸烟

正确答案：A

11、单选 进入空气中毒物浓度很高的生产场所时应使用（）。

- A. 防毒口罩
- B. 防护服
- C. 隔离式防毒面具
- D. 过滤式防毒面具
- E. 涂防护油膏

正确答案：C

12、单选 在某工地食堂用餐后半小时左右，有多名工人口唇、指甲和全身皮肤出现紫绀，并出现精神萎靡、头晕、头痛、乏力、心跳加速，有的伴有恶心、呕吐、腹胀、烦躁不安、呼吸困难。其最大可能是（）。

- A. 河豚鱼中毒
- B. 四季豆中毒
- C. 亚硝酸盐中毒
- D. 沙门菌中毒
- E. 葡萄球菌肠毒素中毒

正确答案：C

参考解析：亚硝酸盐的临床特点：潜伏期短则 10~15 分钟，长达 2 小时。临床主要症状为组织缺氧、口唇、指甲明显青紫，并有头晕、头痛、发热、心慌、呼吸急促、恶心、呕吐、腹胀、腹痛、腹泻等症状。严重者可出现皮肤青紫、心律不齐、心率变慢、昏迷、抽搐、休克，甚至呼吸循环衰竭死亡。

13、单选 关于健康监护的论述，错误的是（）。

- A. 通过健康监护评价劳动条件是否符合卫生标准
- B. 通过各种健康检查和分析掌握职工健康状况
- C. 是早期发现健康损害的重要手段
- D. 就业前和定期健康检查是健康监护的基本内容之一
- E. 目的在于及时发现健康损害，以便采取措施

正确答案：A

14、单选 某县人口 50 万，约 80%居民以河水为饮用水，该县设有一传染病科的综合医院，其污水未经处理直接排入河水中。该县 1986 年 1~11 月份伤寒发病人数达 1063 例，超过该县历史（1958~1985 年）同期发病人数的 6.9 倍。初步调查，发现患者集中于河水排污口的下游地带。这一地区居民饮用河水者的伤寒发病率为 6.5%，而饮用地下水者的伤寒发病率为 0.62%。介水传染病的流行特点不包括（）。

- A. 水源一次污染可出现暴发流行
- B. 绝大多数患者都有饮用同一水源的历史
- C. 病例分布与供水范围一致
- D. 控制水源污染可控制疾病流行
- E. 人与人之间有传染

正确答案：E

15、单选 关于食物中毒的特点，不准确的是（）。

- A. 有共同的饮食史
- B. 症状相似
- C. 发病多呈暴发
- D. 人与人之间不传染
- E. 停止食用“有毒食物”后发病有一滞后期

正确答案：E

参考解析：停止食用“有毒食物”后发病即停止，无传染性特点。

16、单选 卫生服务的需要主要取决于消费者的（）。

- A. 实际支付能力
- B. 购买愿望
- C. 购买愿望和支付能力
- D. 自身健康状况
- E. 健康状况和购买愿望

正确答案：C

17、单选 矽肺最常见和最重要的并发症是（）。

- A. 支气管炎
- B. 肺结核
- C. 肺癌
- D. 肺心病
- E. 肺气肿

正确答案：B

18、单选 铅主要蓄积在（）。

- A. 肾脏
- B. 肝脏
- C. 肺脏

D. 脾脏

E. 骨骼

正确答案：E

19、单选 听力损失指（）。

- A. 短时间暴露于强噪声，使听阈上升 10~15dB，脱离噪声接触后数分钟内即可恢复正常
- B. 较长时间暴露于强噪声，致使听阈上升超过 15~30dB，脱离后需数小时至几十小时才能恢复
- C. 长期在强噪声环境中导致听力曲线在 3000~6000Hz 范围内出现“V 型”下陷，双耳平均听力下降 26~70dB
- D. 长期接触强噪声引起听力曲线从低频到高频呈斜形逐步下降，双耳平均听力下降 >70dB
- E. 听力曲线各频段以同等程度水平下移

正确答案：C

20、单选 食物中毒的概念是指（）。

- A. 暴饮暴食造成的胃肠功能紊乱
- B. 食物被有毒物质污染，食用后引起的中毒
- C. 食用被细菌病毒污染的食品而引起的急性中毒
- D. 吃了某种食物引起的变态反应疾病
- E. 摄入了含有生物性、化学性有毒有害食品，或将有毒有害的物质当作食品摄入后所出现的非传染性的急性、亚急性疾病。

正确答案：E

21、单选 听觉疲劳指（）。

- A. 短时间暴露于强噪声，使听阈上升 10~15dB，脱离噪声接触后数分钟内即可恢复正常
- B. 较长时间暴露于强噪声，致使听阈上升超过 15~30dB，脱离后需数小时至几十小时才能恢复
- C. 长期在强噪声环境中导致听力曲线在 3000~6000Hz 范围内出现“V 型”下陷，双耳平均听力下降 26~70dB
- D. 长期接触强噪声引起听力曲线从低频到高频呈斜形逐步下降，双耳平均听力下降 >70dB
- E. 听力曲线各频段以同等程度水平下移

正确答案：B

22、单选 某冶炼厂定期安排接铅工人到职业病院进行驱铅治疗和疗养，该工作应属于（）。

- A. 一级预防
- B. 二级预防
- C. 三级预防
- D. 对症治疗
- E. 支持疗法

正确答案：B

23、单选 决定粉尘对机体作用性质的主要因素是（ ）。

- A. 粉尘的化学成分
- B. 接触浓度
- C. 接触时间
- D. 粉尘的分散度
- E. 粉尘的类型

正确答案：A

24、单选 当体内缺乏下列哪些物质时可增加镉在胃肠道的吸收（ ）。

- A. 铜、锌、铁
- B. 钙、镁、铜、锌
- C. 铁、钙、蛋白质、锌
- D. 蛋白质、脂肪、维生素
- E. 脂肪酸、蛋白质、碳水化合物

正确答案：C

25、单选 女性，32岁，某温度计厂烘表工，近4年来常感头痛、头昏、心烦、易怒、记忆力明显下降，近1年来出现手指震颤，在做精细活时尤为明显。其最可能接触的职业性有害因素是（ ）。

- A. 铅
- B. 苯
- C. 锰
- D. 汞
- E. 锌

正确答案：C

26、单选 某农药厂灌装车间发生5位工人集体中毒事件，主要临床表现为：眼痛、流泪、手部有瘙痒、烧灼等异常感觉；2例严重病例有呼吸困难、流涎、腹痛和轻度意识障碍。现场调查结果：车间无通风排毒设备，工人均未戴防护手套和口罩，中午均在食堂集体就餐。最可能的中毒原因是（ ）。

- A. 有机磷农药
- B. 氨基甲酸酯类农药
- C. 拟除虫菊酯类农药
- D. 有机氯与拟除虫菊酯混配农药
- E. 化学性食物中毒

正确答案：C

27、单选 社区卫生服务对象是（ ）。

- A. 病人
- B. 老年人
- C. 社区内的全体人群

D. 重点保健人群

正确答案：C

28、单选 某造纸厂的工人在修复已停产 1 个多月的贮浆池时，管道破裂，纸浆从管内喷出，停泵以后，工人李某顺着梯子到池内修理，突然摔倒在池内，张某认为李某是触电，切断电源后下去抢救，也摔倒在池内。经分析认为有毒物，随即用送风机送风，然后其他三人陆续进入池内，三人出现咽部发苦发辣，呼吸困难，相继摔倒在池内。抢救病人时应佩带（）。

- A. 口罩
- B. 防毒口罩
- C. 过滤式防毒面具
- D. 防护服
- E. 隔离式防毒面具

正确答案：E

29、单选 河豚毒素主要存在于河豚鱼的（）。

- A. 肌肉
- B. 脊髓
- C. 肝、卵巢
- D. 血液
- E. 皮肤

正确答案：C

30、单选 由于环境污染对健康的直接损害不包括（）。

- A. 急性中毒
- B. 机体免疫力下降
- C. 儿童佝偻病的发病率增高
- D. 变态反应
- E. 致癌作用

正确答案：C

参考解析：环境污染对健康的损害，包括特异损害（急性中毒、慢性中毒、致癌、致畸形、致突变）和非特异性损害（使人体免疫力下降）等。而儿童佝偻病是由于体内缺乏钙造成的。

31、单选 长期接触苯可引起（）。

- A. 滑囊炎
- B. 造血系统损害
- C. 神经系统的损害
- D. 呼吸系统损害
- E. 泌尿系统损害

正确答案：B

32、单选 恶性肿瘤的主要危险因素是（）。

- A. 吸烟、环境污染、病毒感染
- B. 吸烟、糖尿病、高血压
- C. 吸烟、肥胖、高血压
- D. 吸烟、高血压、高血脂
- E. 不合理饮食、肥胖、高血压

正确答案：A

33、单选 确定对某传染病接触者留验检疫或医学观察的主要依据是该传染病的（）。

- A. 临床症状期
- B. 病原携带期
- C. 传染期
- D. 恢复期
- E. 潜伏期

正确答案：E

34、单选 生物标志物分为（）。

- A. 接触性生物标志物和易感性生物标志物
- B. 易感性生物标志物和效应性生物标志物
- C. 接触性生物标志物和易感性生物标志物和效应性生物标志物
- D. 接触性生物标志物和效应性生物标志物
- E. 以上都不是

正确答案：C

35、单选 下列哪项不是社区诊断的基本内容（）。

- A. 确定社区的主要卫生问题
- B. 确定社区的主要危险因素
- C. 找出社区的高危人群
- D. 了解社区资源
- E. 社区卫生人才的培养

正确答案：E

36、单选 关于专题小组访谈，描述正确的是（）。

- A. 是一种定量研究的方法
- B. 需要的时间长、费用高
- C. 用于快速需求评估
- D. 适合讨论非常敏感的主题
- E. 不需要主持人

正确答案：C

37、单选 内毒素中毒的主要临床表现（）。

- A. 呼吸数频，面色苍白
- B. 共济失调，全身麻痹瘫痪

- C. 视物模糊，眼睑下垂，复视
- D. 呕吐，腹痛，腹泻，绿色水样便
- E. 酒醉步，自主神经功能紊乱

正确答案：C

38、单选 沙门菌属食物中毒的主要临床表现（）。

- A. 呼吸数频，面色苍白
- B. 共济失调，全身麻痹瘫痪
- C. 视物模糊，眼睑下垂，复视
- D. 呕吐，腹痛，腹泻，绿色水样便
- E. 酒醉步，自主神经功能紊乱

正确答案：D

39、单选 某男性，磨床操作工，工龄 15 年，例行检查胸片可见不规则小阴影，调离原接尘岗位 1 年后复查，小阴影密度减低，数量减少，考虑该患者为（）。

- A. 硅沉着病（矽肺）
- B. 化学性肺炎
- C. 粉尘沉着症
- D. 变态反应性肺泡炎
- E. 以上都不是

正确答案：C

40、单选 男性，40 岁，某印刷厂工人，因持续性腹绞痛，阵发性加剧而入院。患者自诉近五年来经常有腹绞痛发作，部位多在脐周，发作时尚能坚持工作。但近一年来，腹痛发作频繁，发作时大汗淋漓，面色苍白，在地上打滚，并伴有头痛、头昏、乏力、关节酸痛。体查：一般情况尚可，体温正常，面色苍白，牙龈有色素沉着，眼底动脉痉挛，腹部平软，肝脾未扪及，肠鸣音正常，诊断为慢性铅中毒。经治疗出院后应（）。

- A. 原则上调离铅作业
- B. 视情况调离铅作业
- C. 必须调离铅作业、
- D. 经治疗后可恢复原工作，不必调离铅作业
- E. 密切观察，3~6 个月复查一次

正确答案：D

41、单选 抢救经呼吸道吸入的急性中毒，首要采取的措施是（）。

- A. 清除尚未吸收的毒物
- B. 排出已吸收的毒物
- C. 使用解毒剂
- D. 对症治疗
- E. 立即脱离现场及急救

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428067016140006070>