专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024湖北省竹山县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题完整题库及答案（典优）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.癫痫持续状态的好发年龄段是

A：55岁以上

B：65岁以上

C：1岁以内及65岁以上

D：6岁以内

答案：C

2.杨某，男性，25岁，间断上腹痛2年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

A：碳酸氢钠?

B：氯化氢?

C：奥美拉唑?

D：克拉霉素?

答案：B

3.作为退热药，布洛芬的优势是

A：可诱发变态反应

B：具有解热镇痛消炎作用

C：镇痛作用较强

D：对胃肠道的不良反应较轻

答案：D

4.解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A: 1%氯化钠

B: 3%过氧化氢

C: 1%硫酸铜

D: 1%硫酸镁

答案：D

5.关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),反复性偏头痛者

A: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素B1

B: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等

C: 推荐应用地西泮(安定)片

D: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啶、舒马曲坦、佐米曲坦

答案：D

6.贮存温度在2℃以上时，温度越低．对多数药品保管越有利。降钙素鼻喷雾剂说明书标明“冷处”贮存，其贮存条件是指

A: 温度在10℃～30℃之间

B: 避光.温度不超过-5℃

C: 温度不超过20℃

D: 温度在2℃～10℃之间

答案：D

7.关于老年人患病，下列哪项叙述是错误的

A: 老年人的各种器官功能减退，机体适应能力下降，故一旦发病，病情常迅速恶化

B：老年人由于组织器官老化和生理功能减退，容易罹患多种慢性疾病

C：老年人患多种疾病，若治疗上存在矛盾时，应忽略不良反应，保证药物治疗的全面性

D：老年人的症状和体征往往表现不典型

答案：C

8.氯喹与伯氨喹合用

A：根治间日疟

B：诱发癫痫

C：加重神经肌肉接头抑制作用

D：引起心脏房室传导阻滞

答案：A

9.抗结核联合治疗方案中可出现橘红色尿的药物是()

A：左氧氟沙星

B：利福平

C：乙胺丁醇

D：吡嗪酰胺

答案：B

10.抑制细菌叶酸合成的药物是

A：头孢米诺

B：利福喷汀

C：头孢哌酮

D：磺胺嘧啶

答案：D

11.患者，女，35岁，因患有缺铁性贫血口服硫酸亚铁，该药物主要的不良反应是

A: 胃肠道反应

B: 肾毒性

C: 心脏相关风险

D: 肝毒性

答案：A

12.患者，男，50岁，血压170/90mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

A: β 受体阻滞剂+ARB

B: 利尿剂+ARB

C: α 受体阻滞剂+ACEI

D: 利尿剂+CCB

答案：D

13.（2017年真题）配制青霉素输液的适宜溶媒是（）

A: 50%葡萄糖注射液

B: 0.9%氯化钠注射液

C: 低分子右旋糖酐注射液

D: 复方氯化钠注射液

答案：B

14.以下药品中，最适宜治疗沙眼和流行性急性结膜炎的是

A: 色甘酸钠滴眼剂

B: 红霉素眼膏

C: 酞丁安滴眼剂

D: 硫酸锌滴眼剂

答案：C

15.设置专供患者阅读的《顾客药物信息详解》的是

A：《马丁代尔药物大典》

B：《中国国家处方集》

C：《美国药典药物信息》

D：《药物事实与比较》

答案：C

16.过敏性皮炎常表现为()

A：红细胞增多

B：中性粒细胞增多

C：血红蛋白减少

D：嗜酸性粒细胞增多

答案：D

17.可引起儿童良性颅压增高、囟门隆起的药物是

A：苯妥英钠

B：氯霉素

C：抗组胺药

D：维生素A

答案：D

18.首次给药在睡前上床后服用，适用于高血压伴前列腺增生，也用于难治性高血压患者降压药种类是

A：钙通道阻滞剂

B：β受体阻断剂

C：α受体阻断剂

D: ACEI和ARB

答案：C

19.“-沙星”的药名词干缩写是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: eef-

D: #NAME?

答案：D

20.患者男56岁因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊查体舌面光滑,呈牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素B12水平下降，下列药物中不会影响维生素B12吸收的是()

A: 二甲双胍

B: 对氨基水杨酸

C: 氨氯地平

D: 奥美拉唑

答案：C

21.治疗干眼症人工泪液合理的起始应用剂量是每只眼

A: 一滴，一日4次

B: 三滴，一日4次

C: 二滴，一日4次

D: 一滴，一日2次

答案：A

22.与两性霉素B合用需要严密监测血钾

A: 酮康唑

B：强心苷

C：碳酸氢钠

D：链霉素

答案：B

23.（2019年真题）用药时宜限制饮水的药物是

A：胶体果胶铋胶囊

B：利托那韦片

C：苯溴马隆胶囊

D：环丙沙星片

答案：A

24.在三级信息源中，世界上最著名的大型药物参考工具书是

A：中国药典

B：药物事实与比较

C：马丁代尔药物大典

D：美国药典药物信息

答案：C

25.毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A：弱碱中和强酸

B：二巯丙醇"驱汞"治疗

C：药用炭吸附

D：依地酸钙钠解救铅中毒

答案：C

26.患者，女，28岁，近一个月出现阴道分泌物增多，阴道检查时发现大量泡沫样分泌物，经验治疗首选的药物是()

A: 咪康唑

B: 头孢曲松钠

C: 甲硝唑

D: 青霉素钠

答案：C

27.较易导致肾损伤的药品是

A: 阿米卡星

B: 新霉素

C: 氯化钾

D: 酮康唑

答案：B

28.药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A: 驳倒的信号

B: 部分确认的信号

C: 尚不确定的信号

D: 确认的信号

答案：C

29.易产生过敏反应，如出现全身反应需要给予抗组胺药和激素进行处理的是

A: 氨氯地平

B: 顺铂

C: 多柔比星

D: 紫杉醇

答案：D

30.饮酒可使其代谢加快、药效减弱的药物是

A: 利血平

B: 苯妥英钠

C: 维生素B1、维生素B2

D: 卡马西平

答案：B

31.患者，女，28岁，处于哺乳期，因阴道分泌物增多、稀薄且带鱼腥臭味，就医后确诊为细菌性阴道病，首选用药方案是

A: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚1次.连用7日

B: 咪康唑栓，阴道给药，每晚1粒（200mg），连用7日

C: 口服甲硝唑400mg，每日2次，连服7日

D: 1：2服克林霉素300mg，每日2次，连用7日

答案：A

32.患者，48岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油1～2秒疼痛即消失。

A: 普伐他汀

B: 左旋氨氯地平

C: 哌唑嗪

D: 曲美他嗪

答案：B

33.与黄连上清丸不宜联用的药物是

A: 苯巴比妥
B: 氨茶碱
C: 氢氧化铝
D: 乳酶生
答案：D

34.以下治疗沙眼的药物中，属于处方药的是
A: 2%硝酸银
B: 红霉素眼膏
C: 硫酸锌滴眼剂
D: 酞丁安滴眼剂
答案：A

35.能使人长时间忍受肌肉疼痛的是
A: 麻醉药品
B: 蛋白同化激素
C: 肽类激素
D: 利尿剂
答案：A

36.不适合儿童的抗癫痫药为（）
A: 丙戊酸钠
B: 苯巴比妥
C: 卡马西平
D: 苯妥英钠
答案：B

37.可用于治疗夜盲症的药物是

A: 复合维生素B

B: 维生素

C: 维生素A

D: 维生素C

答案：C

38.用于糖尿病患者可出现低血糖或高血糖隐患的是

A: 氟西汀

B: 加替沙星

C: 培高利特

D: 头孢菌素

答案：B

39.质子泵抑制剂

A: 铝碳酸镁

B: 埃索美拉唑

C: 多潘立酮

D: 法莫替丁

答案：B

40.对购药患者讲授安全用药常识是

A: 指令方式

B: 协商方式

C: 教育方式

D: 主动方式

答案：D

41.（2017年真题）患者,男，72岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂200μgbid吸入沙丁胺醇气雾剂100μgprn吸入,氨氯地平片5mgqd口服及硝酸甘油片0.5mgprn舌下含服治疗。

A：摇匀呼气→深吸气同时揿压阀门→屏气约10s-漱口

B：呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10s→漱口

C：漱口→摇匀→呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10s

D：呼气→摇匀→揿压阀门并深吸气→屏气约10s→漱口

答案：A

42.下列药物中使用前无需皮试的是

A：抑肽酶注射剂

B：抗狂犬病病毒血清注射剂

C：苄星青霉素注射剂

D：紫杉醇注射剂

答案：D

43.静脉滴注过程中药液必须避光的药物是

A：青霉素

B：培氟沙星

C：万古霉素

D：两性霉素B

答案：B

44.左心衰竭最早出现的症状是

A：端坐呼吸

B：劳力性呼吸困难

C：粉红色泡沫样痰

D: 夜间阵发性呼吸困难

答案：B

45.减少尿酸排泄，引起高尿酸血症的是

A: 丙磺舒

B: 吲哚美辛

C: 氢氯噻嗪

D: 苯溴马隆

答案：C

46.用于治疗前列腺增生症的高选择性a1A受体阻断剂为

A: 特拉唑嗪

B: 索利那新

C: 坦索罗辛

D: 托特罗定

答案：C

47.患者，女，45岁，1年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgqd，甲硝唑片0.4gtid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊220mgtid。患者溃疡治愈后，因膝关节疼痛需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡复发风险，首选的预防药物是

A: 替普瑞酮

B: 奥美拉唑

C: 多潘立酮

D: 枸橼酸铋钾

答案：B

48.治疗中度痤疮宜选用的药物是

A：维A酸乳膏

B：阿昔洛韦软膏

C：氢化可的松软膏

D：复方苯甲酸酊

答案：A

49.三环类抗抑郁药中毒的临床表现是（）

A：谵妄、躁狂、幻觉

B：明显的锥体外系症状

C：心血管毒性

D：肌肉震颤、抽搐

答案：C

50.保钾利尿剂

A：依普利酮

B：阿米洛利

C：雷米普利

D：阿利吉仑

答案：B

51.（2018年真题）举重运动员使用后,可短时间内急速降低体重，因此需按兴奋剂管理的药物是（）

A：硝苯地平

B：缬沙坦

C：普萘洛尔

D：呋塞米

答案：D

52.所有病情稳定并无禁忌证的心功能不全患者一经诊断均应立即使用

A：坎地沙坦

B：地高辛

C：卡托普利

D：美托洛尔

答案：D

53.妊娠早期初始，受精后半个月以内，患者用药不当的影响是

A：可导致颅面部畸形、腭裂等

B：几乎见不到药物的致畸作用

C：女性生殖系统发育迟缓

D：中枢神经系统发育迟缓

答案：B

54.流感患者应用抗病毒药+抗生素属于

A：超剂量用药

B：非适应证用药

C：过度治疗用药

D：超适应证用药

答案：B

55.患者,女,25岁,产后2个月,哺乳期,因尿路感染需要给予抗感染治疗,首选的药物是()

A：头孢呋辛

B：阿米卡星

C：左氧氟沙星

D: 多西环素

答案：A

56.下列可增强华法林抗凝作用的药物是

A: 苯巴比妥

B: 阿司匹林

C: 雌激素

D: 维生素K

答案：B

57.肾功能重度损害时，抗菌药每日剂量分别减低至正常剂量的

A: 1/10～1/15

B: 1/5～1/10

C: 1/2～1/5

D: 2/3～1/2

答案：B

58.驾驶员工作时不宜服用的药品是

A: 维生素C?

B: 氯苯那敏?

C: 阿莫西林?

D: 阿司匹林?

答案：B

59.治疗寻常痤疮给予锌

A: 日服80mg

B: 日服0.05mg

C: 日服180mg

D: 日服30～40mg

答案：D

60.服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

A: 酒

B: 咖啡

C: 烟

D: 浓茶

答案：A

61.患儿，女，4岁半。身高110cm，体重15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病20h左右出现腹泻，约2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L（参考值4.0~10×109/L），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用?

B: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用?

C: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充?

D: 首选口服补液，必要时静脉补液?

答案：B

62.患活动性消化性溃疡，禁用的调脂药是

A: 烟酸类

B: 氯贝丁酯

C: 依折麦布

D: 辛伐他汀

答案：A

63.(抗癫痫药物的选择)，癫痫全身强直阵挛发作的一线用药是

A：卡马西平

B：加巴喷丁

C：扑米酮

D：乙琥胺

答案：A

64.服用华法林、利福平可呈现

A：橘红至红色

B：红至黑色

C：白陶土便

D：黄色

答案：A

65.不宜与小活络丹、香连片、贝母枇杷糖浆合用的药品是

A：氨茶碱

B：氯苯那敏

C：地高辛

D：可待因

答案：A

66.（2017年真题）下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法,错误的是（）

A：食管炎为典型不良反应

B：应避免同时使用两种双膦酸盐

C：口服后30分钟内应保持立位或坐位

D: 随餐服用,并大量饮水,可增加吸收、减少胃肠道刺激

答案：D

67.试验样本数常见病不少于2000例的评价阶段是

A: Ⅳ期临床试验

B: Ⅲ期临床试验

C: Ⅱ期临床试验

D: Ⅰ期临床试验

答案：A

68.患者女45岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片20mgbid，甲硝唑片0.4gbid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊0.6gbid。

A: 枸橼酸铋钾胶囊

B: 克拉霉素片

C: 甲硝唑片

D: 埃索美拉唑镁肠溶片

答案：B

69.可引起局部组织萎缩

A: 氯己定

B: 硼酸甘油

C: 地塞米松粘贴片

D: 甲硝唑含漱制剂

答案：C

70.过敏性鼻炎应首选的口服药是

A: 泮托拉唑
B: 氯雷他定
C: 赛庚啶
D: 氯苯那敏
答案：B

71.嗜碱性粒细胞正常值参考范围是
A: 0.20～0.40
B: 0～0.01
C: 0.01～0.05
D: 0.03～0.08
答案：B

72.常用缓泻药的作用机制不包括
A: 润湿性
B: 膨胀性
C: 刺激性
D: 容积性
答案：A

73.滴虫性阴道炎宜选用
A: 庆大霉素
B: 甲硝唑
C: 林可霉素
D: 制霉菌素
答案：B

74.频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是()

A：替硝唑含漱液

B：西地碘含片

C：氯己定含漱液

D：地塞米松粘贴片

答案：D

75.患者，女，48岁，因耐药菌引起的心内膜炎使用万古霉素治疗。

A：红人综合征

B：凝血功能障碍

C：呼吸窘迫症状

D：心功能抑制

答案：A

76.患者于1周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A：喹诺酮类抗菌药物有胃肠道反应，一般不用

B：老人、有基础疾病或者需要住院的CAP患者常用第二、三代头孢菌素、β-内酰胺类等

C：青壮年和无基础疾病的CAP患者，常用青霉素和第一代头孢菌素

D：CAP常见病原体为肺炎链球菌、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌和呼吸道病毒

答案：A

77.患者，女，57岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20／5mgqd

A: 门诊处方所开剂量不能超过7日用量

B: 超适应证用药

C: 处方应写商品名

D: 无适应证用药

答案：A

78.患者男,60岁,诊断为高血压伴高尿酸血症,首选的药物是()

A: 维拉帕米

B: 氯沙坦

C: 美托洛尔

D: 螺内酯

答案：B

79.某女性，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发喘憋。体检:端坐体位，BP190/110mmHg，R30次/分，HR108次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 急性左心衰竭?

B: 支气管哮喘?

C: 肺结核?

D: 肺动脉栓塞?

答案：A

80.由药师审核监测

A：医师处方差错

B：患者执行医嘱差错

C：护士执行医嘱差错

D: 药师调配处方差错

答案：A

81.用于紧急避孕的药物是

A: X睾酮

B: 罗格列酮

C: 黄体酮

D: 左炔诺孕酮

答案：D

82.（2017年真题）万古霉素0.5g加入5%葡萄糖注射液100ml中静脉滴注要求滴注时间不得少于1h，已知每毫升15滴，每分钟最多可滴注的滴数约是（）

A: 25滴

B: 7滴

C: 15滴

D: 50滴

答案：A

83.药库管理人员根据药品用量和库存情况提出购药计划，向指定的药品经营单位采购，必须持有

A: 防盗设施

B: 五专管理

C: 基数卡

D: 印鉴卡

答案：D

84.患者，男，43岁。误服过量工业碘，可中和碘，用于碘中毒的洗胃液是

A: 淀粉溶液

B: 牛奶与水等量混合

C: 活性炭混悬液

D: 3%～5%鞣酸溶液

答案：A

85.以下解救中毒措施中，正确的药物拮抗是

A: 二巯丙醇拮抗青霉胺

B: 口服氯化铵促使苯丙胺排泄

C: 依地酸钙钠可"驱铅"

D: 阿托品拮抗颠茄碱类中毒

答案：C

86.患者，女，53岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片比索洛尔的主要不良反应是

A: 横纹肌溶解症

B: 出血

C: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞

D: 高钾血症

答案：C

87.骨髓增生病

A: 血小板增多

B：红细胞沉降率减慢

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/428072103042007022