

重症医学科试题

您的姓名： [填空题] *

一、单选题

1.黑便的出血量 () [单选题] *

A、5ml

B、50~70ml (正确答案)

C、10ml

D、300~500ml

2.胃癌主要的转移途径是 () [单选题] *

A、淋巴 (正确答案)

B、血运

C、直接蔓延

D、多途径转移

3.男，62岁，进食后吞咽梗噎感2个月，人渐消瘦，临床高度怀疑食管癌，确诊的方法是 () [单选题] *

A、CT

B、食管吞钡X线检查

C、食管脱落细胞检查

D、锁骨上淋巴结活检

E、食管镜检查及组织活检 (正确答案)

4.慢性胃炎常见的病原菌是 () [单选题] *

A、幽门螺杆菌(正确答案)

B、四联球菌

C、链球菌

D、支原体

E、衣原体

5.患者，女，67岁。6个月前出现吞咽食物梗噎感，近一个月出现吞咽困难，流质饮食难以下咽，消瘦、时常焦虑。此时护士最恰当的心理护理措施是（） [单选题]

*

A、让同样疾病的患者进行正面鼓励(正确答案)

B、对该患者进行疾病相关宣教，让患者了解预后的情况

C、让患者家属进行安慰，转移患者注意力

D、患者表现属于正常现象，不用特别关注

E、保持病室安静，让患者充分休息

6.某患者因上消化道大出血伴休克紧急入院抢救，护士采取的措施中不妥的是（）

[单选题]*

A、头低足高位(正确答案)

B、暂禁食

C、建立静脉通路

D、迅速交叉配血

E、氧气吸入

7.上消化道出血患者进行纤维胃镜检查的时间一般是（） [单选题]*

A、出血后6~8小时

B、出血后10~12小时

C、出血后12~24小时

D、出血后 24~48 小时 (正确答案)

E、出血后 48~72 小时

8.患者男，56岁，因外伤瘫痪导致尿失禁，给予留置导尿，护士巡视发现患者尿液浑浊、色黄，护士应给予的措施是（） [单选题]*

A、经常清洗尿道口

B、进行膀胱冲洗 (正确答案)

C、及时更换尿管

D、观察尿量并记录

E、促进膀胱功能恢复

9.患者男，68岁。体重60kg，胃癌术后第二天，护士要帮助患者移向床头，护士的做法不妥的是（） [单选题]*

A、向患者解释取得合作

B、移动之前应固定床轮

C、将枕头横立于床头

D、搬运时患者双手放在胸腹前 (正确答案)

E、协助患者取仰卧屈膝位

10.患者男，50岁，胃大部分切除术后出现头晕，乏力，查Hb70g/L。其贫血的原因是（） [单选题]*

A、饮食中铁含量不足

B、铁损失过多

C、体内铁代谢障碍

D、铁吸收不良 (正确答案)

E、铁需要量增加

11.动脉血氧分压低于多少时应给予吸氧（） [单选题]*

A、50mmHg (正确答案)

B、80mmHg

C、100mmHg

D、120mmHg

E、150mmHg

12. 抢救器械和药物管理的“五定”不包括 () [单选题]*

A、定数量

B、定期更换 (正确答案)

C、定人保管

D、定点放置

E、定期消毒灭菌

13. 男，30岁，因呕血、黑便来医院就诊，神志清楚，面色苍白，血压80/50mmHg，考虑血容量不足，需要补充液体，应输入的溶液是 () [单选题]*

A、5% 碳酸氢钠

B、氨基酸

C、20% 甘露醇

D、中分子右旋糖酐 (正确答案)

E、浓缩白蛋白

14—16 患者，男，18岁，发热待查收入院，病人神志清楚，精神萎靡，全身消瘦。

14. 现需错误的是留取血培养标本，下列操作错误的是 () [单选题]*

A、用无菌培养瓶

B、采集量为 5~10ml

C、将血液注入培养瓶后轻轻摇动

D、胶塞经消毒后塞好

E、为了减轻病人痛苦，可在输液针头处取血(正确答案)

15.不符合标本采集原则的是（） 单选题]*

- A、严格查对医嘱
- B、严格执行无菌技术
- C、采集方法、时间、量要准确
- D、培养标本宜在使用抗生素前采集
- E、采集的标本要定期送检(正确答案)

16.在静脉穿刺时，操作错误的是（） 单选题]*

- A、严格执行查对制度
- B、选择粗、直、有弹性的血管穿刺
- C、止血带扎在穿刺点 6cm 以上
- D、消毒皮肤可选用 5% 的碘伏
- E、穿刺时针梗与皮肤呈 30~40 度角(正确答案)

17—19.患者，女性，66岁。胃癌晚期，不能进食，给予静脉高营养，静脉穿刺部位出现条索状红线，局部肿胀、发红，主诉疼痛感。

17.引起该状况的主要原因是（） 单选题]*

- A、输液速度过快
- B、输液量过大
- C、长期输入高浓度溶液(正确答案)
- D、溶液含有致热物质
- E、输液时间过长

18.处理措施不妥的是（） 单选题]*

- A、严格无菌操作

- B、50% 硫酸镁局部热敷
- C、增加患肢活动(正确答案)
- D、超短波理疗
- E、更换穿刺部位

19.患者最可能的情况是 () [单选题]*

- A、药物过敏反应
- B、急性肺水肿
- C、空气栓塞
- D、发热反应
- E、静脉炎(正确答案)

20. 既能扩张小动脉，也能扩张小静脉的血管扩张药是 () [单选题]*

- A、硝普纳(正确答案)
- B、异山梨酯
- C、多巴酚丁胺
- D、硝苯地平
- E、多巴胺

21.诊断代谢性酸中毒的主要依据是 () [单选题]*

- A、呼吸深快，二氧化碳结合力下降(正确答案)
- B、呼吸浅慢，二氧化碳结合力下降
- C、呼吸深慢，二氧化碳结合力升高
- D、呼吸困难，二氧化碳结合力升高
- E、呼吸困难，二氧化碳结合力下降

22. () 应作为重症患者持续镇痛的一线药物 [单选题]*

A、吗啡(正确答案)

B、瑞芬太尼

C、杜冷丁

D、芬太尼

E、舒芬太尼

23. 控制重症患者的血糖水平，可明显降低感染与器官功能障碍的发生率，无论采取何种形式的营养支持，均应配合强化胰岛素治疗策略，以提高营养支持的安全性、有效性，推荐血糖浓度维持在（）左右，并积极预防低血糖的发生。 [单选题]

*

A、6mmol/L

B、10mmol/L

C、8mmol/L(正确答案)

D、11mmol/L

E、14mmol/L

24. 下列哪种药物是处理严重酸中毒时低血压的最好选择（） [单选题]*

A、去甲肾上腺素

B、肾上腺素

C、去氧肾上腺素

D、血管加压素(正确答案)

25. 血管扩张药用于急性心衰早期阶段，（）不属于血管扩张药 [单选题]*

A、硝酸甘油

B、硝普纳

C、萘西立肽

D、乌拉地尔

E、左西孟旦 (正确答案)

26. 止血带普遍用于四肢矫形外科中，止血带的压力一般高于收缩压（） [单选题]

*

A、60mmHg

B、80mmHg

C、100mmHg (正确答案)

D、40mmHg

E、90mmHg

27. 目前认为血浆降钙素原浓度高于（）可作为诊断呼吸机相关性肺炎和开始使用抗菌药物治疗的指标 [单选题] *

A、0.1mg/L

B、0.2mg/L

C、0.4mg/L

D、0.25mg/L (正确答案)

E、0.55mg/L

28. 引起急性继发性化脓性腹膜炎最常见的病因是（） [单选题] *

A、溃疡性结肠炎

B、急性胆囊炎

C、急性胃炎

D、急性肠炎

E、急性阑尾炎 (正确答案)

29. 妊娠合并糖尿病患者分娩后24小时胰岛素的用量是（） [单选题] *

A、维持原用量不变

B、增加原用量的二分之一

- C、增加原用量的三分之一
- D、减至原用量的二分之一 (正确答案)
- E、减至原用量的三分之一

30.正常血性恶露的成分是 () [单选题] *

- A、血液 (正确答案)
- B、细菌
- C、白细胞
- D、表皮细胞
- E、宫腔渗出液

31.经鼻导管吸氧能达到最大吸入氧浓度为 () [单选题] *

- A、0.30
- B、0.35
- C、0.40
- D、0.45 (正确答案)
- E、8-10天

32.经皮肝穿刺胆道造影前注射维生素 K 的主要目的是 () [单选题] *

- A、防止胆绞痛
- B、防止胆汁淤
- C、预防出血 (正确答案)
- D、预防感染
- E、预防腹膜炎

33.肝功能减退、肾上腺皮质功能减退会出现 () [单选题] *

- A、肝臭

- B、蜘蛛痣
- C、顽固性腹水
- D、扑翼样震颤
- E、皮肤色素沉着 (正确答案)

34.重度妊高症患者易发生 () [单选题]*

- A、早产
- B、胎盘早剥 (正确答案)
- C、羊水过多
- D、肝功能障碍
- E、子宫破裂

35.格列吡嗪的服药时间是 () [单选题]*

- A、餐前半小时 (正确答案)
- B、进餐时或餐后
- C、第一口饭同时嚼服
- D、空腹
- E、餐后半小时

36.多器官功能障碍综合症最常累及的器官是 () [单选题]*

- A、心脏
- B、肝
- C、肺 (正确答案)
- D、肾
- E、脑

37.安装人工起搏器的患者沙袋压迫时间是 () [单选题]*

- A、2-4h
- B、4-6h
- C、6-12h(正确答案)
- D、12-24h
- E、24-72h

38.口底、颌下及颈部蜂窝织炎的最严重后果是（） [单选题]*

- A、全身性感染
- B、发炎
- C、呼吸困难、窒息(正确答案)
- D、吞咽困难
- E、化脓性海绵状静脉窦炎

39.选择抗生素最理想的依据是（） [单选题]*

- A、脓液的性质
- B、细菌的种类
- C、细菌药敏试验(正确答案)
- D、感染的严重程度
- E、药物的抗菌谱

40.二重感染是指（） [单选题]*

- A、多种细菌引起的感染
- B、多种致病微生物引起的感染
- C、多种特殊厌氧菌引起的感染
- D、机体抵抗力下降引起反复的细菌感染
- E、抗生素应用过程中耐药菌株引起的感染(正确答案)

41.破伤风的潜伏期一般是（） [单选题]*

- A、2-8日
- B、4-6日
- C、6-12日 (正确答案)
- D、15-30日
- E、1-2月

42.急性化脓性腱鞘炎若不及时治疗,易发生() [单选题]*

- A、菌血症
- B、脓血症
- C、掌中间隙感染
- D、鱼际间隙感染
- E、肌腱缺血、坏死 (正确答案)

33.急性感染一般是指病程在多长时间以内() [单选题]*

- A、一周
- B、两周
- C、一个月
- D、三周 (正确答案)
- E、两个月

44.女性,30岁,下肢急性蜂窝织炎伴全身感染症状,需要抽血作血培养和抗生素敏感试验,最佳采血时间应是() [单选题]*

- A、寒颤时 (正确答案)
- B、高热时
- C、发热间歇期
- D、静脉滴注抗生素时
- E、抗生素使用后

45.一般人群预防破伤风最可靠的方法是（） [单选题]*

- A、注射人体破伤风免疫球蛋白
- B、注射破伤风抗毒素
- C、注射破伤风类毒素(正确答案)
- D、受伤后注射甲硝唑
- E、受伤后注射青霉素

46.引起继发性腹膜炎的最常见致病菌是（） [单选题]*

- A、肺炎球菌
- B、变形杆菌
- C、大肠杆菌(正确答案)
- D、厌氧类杆菌
- E、链球菌

47.急性化脓性腹膜炎早期出现呕吐的原因是（） [单选题]*

- A、膈肌受刺激
- B、中枢性呕吐
- C、胃肠道痉挛
- D、反射性呕吐(正确答案)
- E、麻痹性肠梗

48.引起急性胰腺炎的主要病理机制为（） [单选题]*

- A、组织细胞破坏
- B、消化酶缺乏
- C、胰腺的自我消化(正确答案)
- D、消化酶生成过多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428124024063006137>