

中医学 (军队文职)练习(一)

(考试时间90分钟,总分100分)

题号	一	总分
得分		

- 考生要认真核对条形码上打印的姓名、座位号是否与本人准考证上一致
- 答题过程中，要保持答卷纸或答题卡清洁。
- 考试结束信号发出后，立即停笔，在监考员依序收齐答卷、试卷、草稿纸后，根据监考员指令依次退出考场。

得分	评卷人

一、客观选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、患者每逢经期头痛剧烈如针刺半年，伴小腹疼痛拒按，经色黯红有块，舌黯或有瘀点，脉弦涩。其治疗首选方
- A、失笑散合四物汤
- B、桃红四物汤
- C、大黄蟅虫丸
- D、血府逐瘀汤
- E、通窍活血汤
- () 2、患者，男，38岁。患急性子痈2天，恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，疼痛引及子系（精索），舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热下注，气血壅滞，经络阻隔为患。治宜清热解毒，利湿消肿，应首选
- A、透脓散
- B、滋阴除湿汤
- C、萆薢化毒汤
- D、柴胡疏肝散
- E、枸橘汤加減
- () 3、头发突然发生斑块状脱落的慢性皮肤病，称为
- A、头癣
- B、蜈蚣疔
- C、肥疮
- D、白秃疮
- E、油风
- () 4、患儿，男，2岁。流涕，喷嚏，咳嗽1天，次日高热，于体温骤升时突然发生惊厥。查：体温

40℃，咽喉红赤，苔薄黄，指纹浮紫于气关。其证候是

- A、风热感冒证
- B、邪陷心肝证
- C、风热动风证
- D、气营两燔证
- E、湿热疫毒证

() 5、癫狂的关键病机是

- A、痰气郁而化火
- B、痰火上扰，神明失主
- C、痰气郁结，蒙蔽神机
- D、郁火宣泄而痰气留结
- E、脏气不平，阴阳失调，脑之神机逆乱

() 6、甲状腺肿物表面光滑，可随吞咽上下移动，按之不痛，生长缓慢。中医称之为()

- A、失荣
- B、肉瘤
- C、石瘰
- D、肾岩翻花
- E、肉瘰

() 7、中药保留灌肠，药液一般应注意保留

- A、10分钟以上
- B、15分钟以上
- C、20分钟以上
- D、25分钟以上
- E、30分钟以上

() 8、患者。女。27岁。已婚。孕7个月。面目四肢浮肿。皮薄光亮，按之凹陷，气短懒言，纳少便溏。舌质胖嫩。边有齿痕，舌苔白腻，脉缓滑。治疗应首选

- A、真武汤
- B、苓桂术甘汤
- C、白术散(《全生指迷方》)
- D、天仙藤散
- E、四苓散

() 9、下列关于虚喘的各项叙述中，错误的是()

- A、呼吸短促难续

B、气怯声低，深吸为快

C、多有痰鸣咳嗽

D、脉象微弱或浮大中空

E、病势徐缓，时轻时重，遇劳则甚

() 10、患者，女，29岁，已婚。因分娩时受寒，产后小腹疼痛，拒按。恶露量少、行而不畅、色暗、有块。

四肢不温。面色青白。脉沉紧。治疗应首选

A、温经汤(《妇人大全良方》)

B、肠宁汤

C、温胞饮

D、生化汤

E、川楝汤

() 11、患者49岁，月经紊乱，经色鲜红；头晕目眩，耳鸣，头部面颊阵发性烘热，汗出，五心烦热，腰膝酸疼，足跟疼痛，尿少色黄；舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是()

A、六味地黄丸

B、肾气丸

C、左归丸

D、二仙汤合二至丸

E、左归丸合二至丸

() 12、患者女，45岁。泌尿系B超发现右肾占位性病变，右侧腰痛，腰腹坠胀不适，尿血，尿急，尿频，尿痛，发热，消瘦，纳差，舌红，苔黄腻，脉濡数。治疗本病首选的治则是

A、活血化瘀，理气散结

B、清热利湿，解毒通淋

C、活血化瘀，清热解毒

D、清热利湿，化瘀解毒

E、清热利胆，泻火解毒

() 13、患者，男，56岁。自觉近期口干唇燥，不思饮食，大便燥结，甚则干呕，呃逆，面颧红赤，唇红，午后潮热，盗汗，口干，舌质光红少津，脉细数无力。此时的证候诊断是()

A、脾阳虚

B、心血虚

C、脾气虚

D、脾胃阴虚

E、脾血虚

() 14、经行风疹块风热证的治法是()

- A、养血祛风
- B、祛风化痰
- C、滋阴祛风
- D、活血祛风
- E、疏风清热

() 15、小儿出生时正常胸围是()

- A、32cm
- B、34cm
- C、36cm
- D、38cm
- E、42cm

() 16、属于中风恢复期治法的是

- A、涤痰醒神
- B、搜风化痰
- C、豁痰化瘀
- D、辛热开破
- E、平肝潜阳

() 17、治疗湿热痢首选的方剂是

- A、白头翁汤
- B、芍药汤
- C、沙参麦冬汤
- D、保和丸
- E、驻车丸

() 18、水肿涉及的病位主要是()

- A、肺脾肾
- B、脾肝肾
- C、心脾肾
- D、脾肾
- E、肺脾

() 19、热淋的主症特点是()

- A、小便赤热，尿时灼痛

- B、小便窘急不能卒出，尿道刺痛，痛引少腹
- C、少腹满闷胀痛，小便艰涩疼痛，尿后余沥不尽
- D、尿道热涩疼痛，尿色如米泔水
- E、小便量少，排出不畅，点滴而短少

() 20、患者，男性，67岁。项后结块红肿溃烂3周。患者3周前项后初发结块，有粟粒样脓头，相继融合溃烂。经切开扩创后，肿势渐退，腐肉渐净，新肉已生。但3天来，脓水转稀薄色灰，新肉生长停滞，状如镜面，光白板亮；全身虚热不退，形神委顿，纳食日减，腹痛便泄，自汗肢冷，气息低促。舌质淡红，苔薄白或无苔，脉虚大无力。其病机是()

- A、走黄
- B、内陷
- C、火陷
- D、干陷
- E、虚陷

() 21、下列哪项不是癫狂证的主症

- A、语无伦次
- B、躁妄打骂
- C、喜怒无常
- D、流涎抽搐
- E、神志痴呆

() 22、丁某，男，65岁。咳喘多年，入冬加重，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，形瘦神惫，面青唇紫，舌淡苔白而润滑，脉微细。其证机概要为()

- A、肺气亏虚，气失所主
- B、肺病及肾，肺肾俱虚，气失摄纳
- C、肺气欲绝，心肾阳衰
- D、肝郁气逆，上冲犯肺，肺气不降
- E、上盛下虚

() 23、某患者，颈后疮形高肿，色红，多个脓头，焮热剧痛。伴发热，口渴，尿赤，舌红苔黄，脉数有力。治则应为

- A、清热利湿，和营消肿
- B、散风清热，化痰消肿
- C、清热解毒，和营消肿
- D、清热泻火，和营托毒
- E、清热解毒

() 24、崩漏的治疗，应本着的原则

- A、治崩三法
- B、急则治其标，缓则治其本
- C、辨证论治
- D、补气摄血
- E、或补肾，或扶脾，或疏肝

() 25、晚期肾癌典型的三联症是()

- A、血尿、尿频、尿急
- B、血尿、腰部疼痛、上腹或腰部肿块
- C、血尿、腰腹绞痛、排尿中断
- D、尿频、尿急、尿痛
- E、血尿、排尿不畅、排尿射程短

() 26、积证初、中、末三个阶段的治疗原则分别是()

- A、理气、活血、补肝肾
- B、消散、消补兼施、养正除积
- C、化痰、祛瘀、扶正
- D、活血、祛瘀、补脾肾
- E、活血、祛瘀、养血

() 27、痛经肾气亏损证的治法是

- A、温肾助阳，调经止痛
- B、补肾益精，养血止痛
- C、滋阴益肾，调经止痛
- D、补肾益气，养血止痛
- E、补肾益气，活血止痛

() 28、肺癆患者，症见咳嗽、咳痰、咯血、胸痛，兼有乏力、纳少、腹胀便溏。其病变部位是

- A、肺、脾
- B、肺、肾
- C、心、肝
- D、脾、肾
- E、肺、肝

() 29、注意力缺陷多动障碍的治疗原则

- A、调和阴阳
- B、滋养肝肾

C、养心安神

D、清热泻火

E、健脾益气

() 30、对于花斑癣，以下哪项说法不正确

A、常发于多汗体质青年

B、皮损好发于颈项、躯干

C、不会融合成片

D、好发于多汗部位

E、皮损为界清的圆形或不规则的无炎症性斑块

() 31、患儿，4岁，患百日咳后期，痉咳缓解，咳而无力，精神萎靡，食欲不振，形体明显消瘦，舌质淡，苔薄白。治疗首选方剂为

A、沙参麦冬汤

B、人参五味子汤

C、清燥救肺汤

D、玉屏风散

E、人参健脾丸

() 32、若妊娠晚期，孕妇脉弦滑劲急，当警惕发生

A、子晕、子痫

B、子烦

C、胎死不下

D、难产

E、子悬

() 33、产后乳汁甚少，质稀薄，食少神疲、面色无华，其辨证是

A、血虚证

B、脾虚证

C、肾虚证

D、肝肾亏虚证

E、气血虚弱证

() 34、治疗阴挺气虚证，应首选的方剂是()

A、举元煎

B、大补元煎

C、补中益气汤

D、归脾汤

E、人参归脾汤

() 35、治疗聚证食滞痰阻证，首选的方剂是

A、逍遥散

B、六磨汤

C、枳实导滞丸

D、膈下逐瘀汤合六君子汤

E、血府逐瘀汤

() 36、下列哪项不是引起呕吐的主要原因

A、外邪侵袭

B、湿邪困脾

C、饮食不节

D、情志失调

E、病后体虚

() 37、带下色黄，量多，质黏稠，其辨证是

A、血热证

B、热毒证

C、脾虚证

D、肾虚证

E、湿热证

() 38、患者经期，烦躁易怒，头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红，舌红，苔黄，脉弦数。其治法是()

A、补血养心，安神定志

B、清肝泄热，解郁安神

C、清热化痰，宁心安神

D、祛痰通络，安神定志

E、化瘀活血，平痉安神

() 39、下列关于肝与月经关系的描述，错误的是

A、肝血下注冲脉

B、司血海之定期蓄溢

C、肝为气血之根

D、参与月经周期的调节

E、参与经量的调节

() 40、下列除哪项外，均是气机郁滞呃逆的主症

A、呃逆连声，胸胁胀闷

B、常因情志不畅而诱发或加重

C、暖气纳减，肠鸣矢气

D、得热则减，遇寒愈甚

E、舌苔薄，脉弦

() 41、一妇人暴崩下血，继而淋漓不止已月余，血色淡黯质稀；面色晦黯，肢冷畏寒，腰膝酸软，小便清长，夜尿多；眼眶黯，舌质淡黯，苔白，脉沉细无力。证属

A、脾虚崩漏

B、肾阴虚崩漏

C、肾阳虚崩漏

D、血瘀崩漏

E、脾肾阳虚崩漏

() 42、患者女，43岁。左侧肛旁反复破溃、渗液1年，伴疼痛，查体：肛门左侧皮肤可见开口、渗液，肛查截石位6点距齿状线约3cm处可触及凹陷性硬结。治疗应首选

A、注射疗法

B、结扎疗法

C、塞药法

D、挂线疗法

E、切开疗法

() 43、患儿，2岁。舌边溃疡3天。溃疡色赤疼痛，饮食困难，烦躁不安，小便短赤，舌尖红，苔薄黄，指纹紫。其治法是

A、疏风清热，泻火解毒

B、清心凉血，泻火解毒

C、清热凉血，泻火解毒

D、滋阴降火，引火归原

E、清心泻脾，凉血解毒

() 44、虚喘的特点是

A、呼吸深长有余，呼出为快，声低气怯

B、呼吸深长有余，呼出为快，声高气粗

C、呼吸深长有余，深吸为快，声低气怯

D、呼吸短促难续，深吸为快，声低气怯

E、呼吸短促难续，呼出为快，声低气怯

() 45、下列关于月经初潮年龄的描述，错误的是

A、一般为13~15岁

B、平均14岁

C、可早至11~12岁

D、迟至16岁

E、最迟不超过18岁

() 46、夏季热暑伤肺胃证的治法是()

A、养阴清热，生津除烦

B、辛凉解表，清暑化湿

C、温补肾阳，清心护阴

D、清暑益气，养阴生津

E、清暑解表，行气和中

() 47、肺痿虚寒证的特点是

A、咳吐涎沫，咽干，下利泄泻，形寒肢凉

B、咳吐涎沫，短气，呼多吸少，动辄尤甚

C、咳吐黏稠涎沫，口渴咽燥，午后潮热，皮毛干枯

D、咳吐涎沫，神疲体弱，气短懒言，唇面青紫

E、咳吐清稀涎沫，形寒，小便频数或遗尿

() 48、患者女，63岁。有淋证病史30年。现症：少尿，全身浮肿，面白唇暗，四肢厥冷，口中尿臭，神志昏蒙，循衣摸床，舌卷缩，淡胖，苔白腻或灰黑，脉沉细欲绝。此病的证候诊断是

A、脾肾阳虚，湿浊内蕴证

B、脾肾阳虚，水气凌心证

C、肝肾阴虚，肝风内动证

D、肾阳衰微，心阳欲脱证

E、肾阳衰微，邪陷心包证

() 49、患者，女，21岁，未婚，乳房肿块破溃反复发作7个月，现病变处形成瘻管，有粉渣样物排出。应考虑()

A、乳痈

B、粉刺性乳痈

C、乳岩

D、乳核

E、乳癆

() 50、肛漏手术成败的关键在于

- A、切除瘻管管壁
- B、避免损伤内括约肌
- C、正确找到内口并切开或切除
- D、将外口及瘻管切除
- E、以上都不是

参考答案

一、客观选择题

1、E

【解析】经行头痛血瘀证

主要证候：每逢经前、经期头痛剧烈，痛如锥刺，经色紫黯有块；伴小腹疼痛拒按，胸闷不舒；舌黯或尖边有瘀点，脉细涩或弦涩。

治法：化瘀通络。

方药：通窍活血汤。

2、E

【解析】子痛湿热下注证：多见于成年人。睾丸或附睾肿大疼痛，阴囊皮肤红肿，焮热疼痛，少腹抽痛，局部触痛明显，脓肿形成时，按之应指，伴恶寒发热。苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿，解毒消肿。

方药：枸橘汤或龙胆泻肝汤加减。疼痛剧烈者，加延胡索、金铃子。

3、E

【解析】油风是一种头发突然发生斑块状脱落的慢性皮肤病。因头发脱落之处头皮光亮而得名，又称鬼舐头、鬼剃头。

4、C

【解析】急惊风风热动风证

证候：起病急骤，发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛，随即出现烦躁、神昏、惊风，舌苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热，息风定惊。

代表方剂：银翘散。

5、E

6、E

7、E

【解析】直肠导入：将药物制成栓剂纳入肛内，或浓煎后保留灌肠，达到润肠通腑、清热解毒、凉血活血、消癥散结等目的。本法可使药物在直肠吸收，增加盆腔血循环中的药物浓度，有利于盆腔、胞中癥积、慢性盆腔炎、盆腔淤血综合征，以及产后发热、大便秘结等病证的治疗。若为中药保留灌肠，可用尿管或小口径管或一次性灌肠袋，插入肛中14cm左右，将温度适中的药液100ml徐徐灌入，保留30分钟以上；临睡前注入，保留至次晨疗效更佳。月经期、阴道出血时及妊娠期需慎用。

8、C

【解析】由题干孕7个月，面目四肢浮肿，辨病为子肿；由面目四肢浮肿，皮薄光亮，按之凹陷，气短懒言，纳少便溏，舌质胖嫩，边有齿痕，舌苔白腻，脉缓滑，辨证为脾虚证。方选白术散（《全生指迷方》）。故选c。考点：子肿的辨证论治

9、C

10、D

【解析】由题干分娩时受寒，产后小腹疼痛，辨病为产后身痛；由小腹疼痛，拒按，恶露量少、行而不畅、色暗、有块，四肢不温，面色青白，脉沉紧，辨证为瘀滞子宫证。方选生化汤。故选D。考点：产后腹痛辨证论治

11、E

12、B

13、D

14、E

15、A

16、B

【解析】1. 恢复期及后遗症期，多为虚实兼夹，当扶正祛邪，标本兼顾，平肝息风，化痰祛瘀，与滋养肝肾，益气养血并用。

2. 针对痫痰难化的治法是辛热开破。痫病的核心病机是痰浊闭阻，气机逆乱，故治疗多以涤痰、行痰、豁痰为大法。

17、B

18、A

19、A

20、E

21、D

【解析】癫证以精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，语无伦次，静而多喜为特征。狂证以精神亢奋，躁不安，喧扰不宁，骂詈毁物，动而多怒为特征。

22、B

23、D

【解析】患者为有头疽初期，火毒凝结证。治宜清热泻火，和营托毒，方用黄连解毒汤合仙方活命饮加减。

24、B

【解析】崩漏的治疗原则是，“急则治其标，缓则治其本”。

25、B

26、B

27、B

28、A

【解析】肺癆常见咳嗽、咳痰、咯血、胸痛症状，病变主要脏器为肺。若兼有乏力、纳少、腹胀、便溏，则病及脾。

29、A

【解析】注意力缺陷多动障碍，以调和阴阳为治疗原则。心肾不足者，治以补益心肾；肾虚肝亢者，治以滋肾平肝；心脾气虚者，治以补益心脾。病程中见有痰浊、痰火、瘀血等兼证，则佐以化痰、清热、祛瘀等治法。

30、C

【解析】花斑癣：本病常发于多汗体质青年，可在家庭中互相传染。皮损好发于颈项、躯干，尤其是多汗部位及四肢近心端，为大小不一、边界清楚的圆形或不规则的无炎症性斑块，色淡褐、灰褐至深褐色，或轻度色素减退，或附少许糠秕状细鳞屑，常融合成片。有轻微痒感，常夏发冬愈，复发率高。

31、B

【解析】顿咳气阴耗伤证（恢复期）

证候：痉咳缓解，咳嗽逐渐减轻，仍有干咳无痰，或痰少而稠，声音嘶哑，伴低热，午后颧红，烦躁，夜寐不宁，盗汗，口干，舌红，苔少或无苔，脉细数。或表现为咳声无力，痰白清稀，神倦乏力，气短懒言，纳差食少，自汗或盗汗，大便不实，舌淡，苔薄白，脉细弱。历时2~4周。

治法：养阴润肺，健脾益气。

代表方剂：肺阴亏虚者用沙参麦冬汤，肺脾气虚证用人参五味子汤。

32、A

【解析】若妊娠晚期，脉弦滑劲急多为阴虚肝旺、肝风内动之象，当警惕发生子晕、子痫等。

33、E

【解析】乳汁甚少、质稀薄，食少神疲、面色无华者，多属气血虚弱。

34、C

35、B

36、B

【解析】外感六淫、内伤饮食、情志不调、病后体虚。

37、E

【解析】带下色黄，量多质黏稠，多为湿热。

38、B

39、C

【解析】在月经的产生中，肝血下注冲脉，司血海之定期蓄溢，参与月经周期、经期及经量的调节。

@##

40、D

【解析】呃逆之气机郁滞证

证候主症：呃逆连声，常因情志不畅而诱发或加重，胸胁满闷，脘腹胀满，暖气纳减，肠鸣矢气，苔薄白，脉弦。

41、C

【解析】崩漏肾阳虚证

主要证候：经乱无期，出血量多或淋漓不尽，或停经数月后又暴下不止，血色淡红或淡黯质稀；面色晦黯，肢冷畏寒，腰膝酸软，小便清长，夜尿多；眼眶黯，舌淡黯，苔白润，脉沉细无力。

治法：温肾益气，固冲止血。

方药：右归丸加党参、黄芪、田七。

42、D

【解析】肛漏的挂线疗法适用于距肛门4cm以内，有内、外口的低位肛漏；亦作为复杂性肛漏切开疗法或切除疗法的辅助方法；切开疗法适用于低位肛漏。

43、B

44、D

45、E

【解析】妇女一生中第1次月经来潮，称为初潮。初潮年龄一般为13~15岁，平均14岁，即“二七”之年。可早至11~12岁，迟至16岁。

46、D

47、E

【解析】肺痿之虚寒证

证候主症：咯吐涎沫，其质清稀量多，不渴，短气不足以息，头眩，神疲乏力，食少，形寒，小便数，或遗尿，舌质淡，脉虚弱。

48、E

49、B

50、C

【解析】手术成败的关键，在于正确地找到内口，并将内口切开或切除，否则创口就不能愈合，即使暂时愈合，日久又会复发。

中医学 (军队文职)练习(二)

(考试时间90分钟,总分100分)

题号	一	总分
得分		

- 考生要认真核对条形码上打印的姓名、座位号是否与本人准考证上一致
- 答题过程中，要保持答卷纸或答题卡清洁。
- 考试结束信号发出后，立即停笔，在监考员依序收齐答卷、试卷、草稿纸后，根据监考员指令依次退出考场。

得分	评卷人

一、客观选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、皮脂腺中皮脂郁积而形成的囊肿，称为
- A、脂瘤
- B、肉瘤
- C、血管瘤
- D、气瘤
- E、筋瘤
- () 2、赵某，男，56岁。反复脘闷2年，脘腹痞闷，嘈杂，饥不欲食，恶心嗳气，口燥咽干，大便秘结，舌红少苔，脉细数。其证候诊断是()
- A、饮食内停证
- B、湿热阻胃证
- C、痰湿中阻证
- D、肝胃不和证
- E、胃阴不足证
- () 3、下列各项，有关口疮的预防与调护，错误的是()
- A、保持口腔清洁，注意饮食卫生，餐具应经常消毒
- B、应经常给初生儿、小婴儿清洁口腔，以保持其口腔清洁
- C、选用金银花、野菊花、板蓝根、大青叶、甘草煎汤，频频漱口
- D、注意口腔外周皮肤卫生，颈项处可围上清洁毛巾，口中涎水流出及时擦干
- E、饮食宜清淡，忌辛辣刺激、粗硬及过咸食品，忌饮食过烫
- () 4、下列各项，有关夜啼的预防与调护，不正确的是
- A、要注意防寒保暖，但勿使衣被过暖

- B、孕妇及乳母不可过食寒凉及辛辣热性食物，勿受惊吓
- C、饥饿、过饱、闷热、寒冷、虫咬、尿布浸渍、衣被刺激等不会引起夜啼
- D、婴儿啼哭不止，要注意寻找原因，以尽早明确诊断
- E、不要将婴儿抱在怀中睡眠，不通宵开启灯具，养成良好的睡眠习惯

() 5、治疗肝癌气滞血瘀证，首选的方剂是()

- A、复元活血汤
- B、血府逐瘀汤
- C、少腹逐瘀汤
- D、通窍活血汤
- E、膈下逐瘀汤

() 6、慢性前列腺炎的病机()

- A、肾虚、湿热、瘀滞
- B、湿热、瘀滞、血热
- C、肾虚、瘀滞、痰浊
- D、肾虚、血热、瘀滞
- E、肝郁、湿热、肾虚

() 7、疏肝解郁法的代表方剂是

- A、乌药汤
- B、丹栀逍遥散
- C、左归丸
- D、杞菊地黄丸
- E、六味地黄丸

() 8、患者少腹部隐痛1周，痛连腰骶，低热起伏，劳累时加重，带下量多，色黄，质黏稠，胸闷纳呆，口干不欲饮，大便秘结，小便黄赤；舌体胖大，色红，苔黄腻，脉弦数或滑数。治疗应首选的方剂是()

- A、银甲丸
- B、仙方活命饮
- C、大黄牡丹汤
- D、五味消毒饮
- E、桂枝茯苓丸

() 9、堕胎、小产连续发生三次以上者，称

- A、胎动不安
- B、暗产

C、滑胎

D、胎漏

E、先兆流产

() 10、患者男，12岁。颈部结块，形如鸡卵，皮色不变，灼热疼痛，边界清楚，伴风温外感症状。治法应为

A、清热利湿，和营消肿

B、清热利湿，和营托毒

C、散风清热，化痰消肿

D、清热解毒，和营消肿

E、清热解毒，活血化瘀

() 11、胃痛的主要病变脏腑在胃，与哪些脏腑关系最密切

A、肝肾

B、肝脾

C、胆肾

D、脾肾

E、心肺

() 12、轻度硬肿症的硬肿范围是

A、<10%

B、<20%

C、20%~30%

D、20%~50%

E、>50%

() 13、按公式计算，5个月婴儿正常体重是()

A、5kg

B、6.5kg

C、6.8kg

D、7kg

E、7.2kg

() 14、下列各项，属妊娠恶阻发病机理的是()

A、肝失条达，气机郁滞

B、冲气上逆，胃失和降

C、脾胃虚弱，肝气偏旺

D、重伤津液，胃阴不足

E、痰湿内停，阻滞胃脘

() 15、下列各项中，不符合虚劳诊断依据的是()

A、多见形神衰败、身体羸瘦、食少厌食等虚证症状

B、兼有其他病证的主要症状

C、病程长，症状可呈进行性加重

D、具有引起虚劳的致病因素

E、应着重排除其他病证中的虚证

() 16、治疗鼻衄热邪犯肺证的最佳选方是

A、银翘散

B、沙参麦冬汤

C、玉女煎

D、桑菊饮

E、白虎汤

() 17、患者女，51岁。无痛性便血2周，纤维结肠镜检查示肛管无异常肿物，距肛门约7cm直肠黏膜后壁可见赘生物，色红，边界清，有蒂。考虑诊断为

A、内痔

B、混合痔

C、息肉痔

D、脱肛

E、锁肛痔

() 18、下列各项，属着痹特点的是

A、疼痛游走不定

B、痛势较剧，痛有定处

C、关节酸痛、重着、漫肿

D、关节肿胀局限，见皮下结节

E、关节肿胀僵硬，疼痛不移

() 19、下列各项，属子满主症的是

A、两脚浮肿，按之凹陷，小便短少

B、两脚肿胀，随按随起，小便如常

C、自膝至脚肿，皮色不变，小便如常

D、腹大异常，通身浮肿，小便短少

E、头面遍身浮肿，皮薄而光亮，小便短少

() 20、胎怯诊断的客观指标是

A、出生体重低于2000g

B、出生体重低于2500g

C、出生身长不足46cm

D、胎龄不满37周

E、出生身长不足50cm

() 21、湿热中阻型胃痛治宜

A、柴胡疏肝散加减

B、清中汤加减

C、四君子汤

D、保和丸

E、黄芪建中汤

() 22、脱疽湿热毒盛证的主要表现为

A、患趾（指）酸胀疼痛加重，趺阳脉搏动消失

B、患肢麻木、发凉，色苍白，足背动脉搏动减弱

C、患趾紫暗，浸淫蔓延，溃破腐烂，舌质红，苔黄腻

D、患趾紫暗，遇冷变色，变为苍白、紫暗、潮红等颜色

E、患趾溃烂、色苍白，创面久不愈合，舌淡胖，脉细无力

() 23、产后身痛风寒证的最佳选方是

A、参苏饮

B、附子理中汤

C、独活寄生汤

D、身痛逐瘀汤

E、人参败毒散

() 24、关于一次切开挂线法治疗肛痛的适应证，错误的是

A、肛门旁皮下脓肿

B、坐骨直肠间隙脓肿

C、骨盆直肠间隙脓肿

D、直肠后间隙脓肿

E、马蹄形脓肿

() 25、患儿，3岁。吃瓜子时误吸入气管引起窒息。其病因是

- A、乳食因素
- B、先天因素
- C、情志因素
- D、意外因素
- E、其他因素

() 26、肾虚型月经过少的首选方是

- A、归肾丸
- B、滋血汤
- C、六味地黄丸
- D、保阴煎
- E、右归丸

() 27、下列各项，属经腹输卵管结扎术适应证的是()

- A、患有严重全身疾病不宜生育而行治疗性绝育术
- B、急、慢性盆腔感染
- C、24小时内有两次间隔4小时的体温在37.5℃或以上者
- D、全身情况不良不能耐受手术者
- E、严重的精神官能症者

() 28、患者妊娠30周，头晕目眩，视物模糊，耳鸣失眠，心中烦闷，颜面潮红，口干咽燥，手足心热，舌红，少苔，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A、苓桂术甘汤
- B、通窍活血汤
- C、羚角钩藤汤
- D、半夏白术天麻汤
- E、杞菊地黄丸

() 29、林某，女性，57岁。发热半天，微恶风，汗少，肢体疼痛，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻流浊涕，口中黏腻，胸闷脘痞，泛恶，大便溏，小便短赤，舌苔薄黄而腻，脉濡数。其最可能的中医诊断是

- A、常人感冒之风寒束表证
- B、常人感冒之暑湿伤表证
- C、常人感冒之风热犯表证
- D、虚体感冒之气虚感冒证
- E、虚体感冒之阴虚感冒证

() 30、患者，女，29岁，已婚。近1年月经后期量少，现已停经4个月，伴五心烦热，潮热颧红，

舌红少苔，脉细数。尿妊娠试验阴性。其治法是

- A、养阴清热调经
- B、理气活血通经
- C、豁痰活血通经
- D、益气养血调经
- E、补肾养肝调经

() 31、下列各项，属痛经寒凝血瘀证临床表现的是()

- A、小腹冷痛拒按
- B、小腹冷痛，按之痛减
- C、月经量多，质黏稠
- D、腰膝酸软，失眠多梦
- E、舌质红，苔黄腻

() 32、患者，女，40岁。双乳肿块界限不清，经前乳房胀痛，伴有月经不调，腰酸乏力，舌质淡红，苔白，脉细。治疗应首选

- A、左归丸
- B、开郁散
- C、逍遥贝蒺散
- D、二仙汤合四物汤
- E、六味地黄汤

() 33、下列各项中，关于感冒转归预后叙述错误的是

- A、在感冒病程中，可以出现寒热等不同证候之间的转化错杂
- B、感冒病程较短而易愈
- C、反复感冒易伤正气
- D、少数可因感冒诱发其他宿疾而致病情恶化
- E、老人、婴幼儿及体弱感冒患者以及时行感冒重症，不会发生传变

() 34、下列各项中，与哮病关系密切的脏器是

- A、肺、心
- B、心、肾
- C、脾、肾
- D、心、肝
- E、肝、肾

() 35、治疗慢性盆腔炎气虚血瘀证，应首选的方剂是()

- A、小腹逐瘀汤

- B、当归芍药散
 - C、理冲汤
 - D、逐瘀止血汤
 - E、固冲汤
- () 36、小儿生长发育最快的时期是
- A、新生儿期
 - B、婴儿期
 - C、幼儿期
 - D、学龄前期
 - E、学龄期
- () 37、闭经痰湿阻滞证的治法是()
- A、健脾燥湿化痰，活血调经
 - B、燥湿祛痰，行气通经
 - C、健脾祛湿，活血调经
 - D、燥湿祛痰，健脾止带
 - E、燥湿健脾，消食导滞
- () 38、多发性抽搐症的发病与哪几脏关系最为密切
- A、心肝肺肾
 - B、肺肝脾肾
 - C、肝心脾肾
 - D、肺心脾肾
 - E、心肺肾
- () 39、患者发热，热势不高，常在劳累后加剧，身倦乏力，气短懒言，自汗，易于感冒，食少便溏，舌质淡，苔白薄，脉细弱。辨证应属
- A、阴虚发热证
 - B、气虚发热证
 - C、血虚发热证
 - D、血瘀发热证
 - E、气郁发热证
- () 40、患者带下量多，色黄如脓，有臭气，外阴瘙痒，小腹作痛，口苦口腻，舌红，苔黄腻，脉滑数。其证候是
- A、脾虚肝郁证

- B、寒湿内停证
 - C、湿毒蕴结证
 - D、阴虚夹湿证
 - E、湿热下注证
- () 41、患者停经43天，阴道少量出血10天，下腹疼痛2天，双合诊可触及一侧附件有软性包块，有压痛，尿妊娠试验为阳性，脉弦滑。其治法是()
- A、活血祛瘀消癥
 - B、立即手术治疗
 - C、活血化瘀，消癥杀胚
 - D、活血祛瘀，佐以益气
 - E、益气固脱，活血祛瘀
- () 42、以上各项，属阴道功能的是
- A、排出月经、孕育胎儿
 - B、排出月经的通道
 - C、娩出胎儿的产门
 - D、防御外邪入侵的第一道门户
 - E、排出恶露之出口
- () 43、患儿，5个月。昨日添加蛋黄后出现腹胀腹泻，纳乳减少。正确的做法是
- A、暂停添加辅食
 - B、继续添加辅食
 - C、改为人工喂养
 - D、改为混合喂养
 - E、停止母乳喂养
- () 44、寒邪内阻腹痛的治法是
- A、散寒温里，理气止痛
 - B、消食导滞，理气止痛
 - C、疏肝解郁，理气止痛
 - D、温中补虚，缓急止痛
 - E、泄热通腑，行气导滞
- () 45、患者，男，38岁。婚后7年未育，性欲减退，阳痿早泄，伴腰酸腿软，疲软无力，小便清长，舌质淡，苔薄白，脉沉细，除辨证属肾阳虚衰证外，还需“辨精用药”，据患者精子数少、成活率低、活动力差的情况，应在金匱肾气丸合五子衍宗丸的主方基础上加用()
- A、蒲公英、红藤、黄柏

B、泽泻、丹皮、麦冬

C、当归、生地、土茯苓

D、仙灵脾、巴戟天、菟丝子

E、丹参、王不留行、地龙

() 46、狂证痰热瘀结证的代表方是

A、生铁落饮

B、癫狂梦醒汤

C、顺气导痰汤

D、二阴煎合琥珀养心丹

E、天王补心丹

() 47、患者经期错后，量少，色淡，质黏，头晕体胖，心悸气短，脘闷恶心，带下量多，舌淡胖，苔白腻，脉滑。其证候是()

A、气滞证

B、实寒证

C、痰湿证

D、血瘀证

E、虚寒证

() 48、患者女，28岁。右侧小腿及右足被开水烫伤2天，查体可见创面痛觉迟钝，有水疱，基底部苍白，间有红色斑点、潮湿。其烧伤深度为

A、Ⅰ度烧伤

B、深Ⅱ度烧伤

C、浅Ⅱ度烧伤

D、Ⅲ度烧伤

E、深Ⅲ度烧伤

() 49、“外科三焦辨证”中，上部辨证包括的部位是()

A、头面、胸腹、上肢

B、头面、胸背、上肢

C、头面、胸胁、上肢

D、头面、颈项、上肢

E、头面、胸胁、上肢

() 50、适用于疮疡阳证的是

A、冲和膏

B、玉露膏

- C、阳和膏
- D、回阳玉龙膏
- E、生肌玉红膏

参考答案

一、客观选择题

1、A

2、E

3、B

4、C

【解析】夜啼预防与调护：

1. 要注意防寒保暖，但勿使衣被过暖。

2. 孕妇及乳母不可过食寒凉及辛辣热性食物，勿受惊吓。

3. 不要将婴儿抱在怀中睡眠，不通宵开启灯具，养成良好的睡眠习惯。

4. 婴儿啼哭不止，要注意寻找原因，若能除外饥饿、过饱、闷热、寒冷、虫咬、尿布浸渍、衣被刺激等，则要进一步做系统检查，以尽早明确诊断。

5、A

6、A

7、A

【解析】疏肝解郁代表方如柴胡疏肝散、逍遥散、乌药汤。

8、A

9、C

【解析】凡堕胎或小产连续发生3次或3次以上者，称为“滑胎”，亦称“数堕胎”、“屡孕屡堕”。

10、C

11、B

【解析】胃痛的病变部位在胃，但与肝、脾的关系极为密切。

12、B

13、B

14、B

15、B

16、D

【解析】鼻衄之热邪犯肺证

证候主症：鼻燥衄血，口干咽燥，或兼有身热，恶风，头痛，咳嗽，痰少等症，舌质红，苔薄，脉

数。

治法：清泄肺热，凉血止血。

代表方：桑菊饮加减。

17、C

18、C

【解析】着痹

证候主症：肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛，肿胀散漫，关节活动不利，肌肤麻木不仁，舌质淡，舌苔白腻，脉濡缓。

19、D

【解析】妊娠5~6个月后出现腹大异常，胸膈满闷，甚则遍身俱肿，喘息不得卧者，称“子满”。又称“胎水肿满”。

20、B

21、B

【解析】胃痛之湿热中阻证

证候主症：胃脘疼痛，痛势急迫，脘闷灼热，口干口苦，口渴而不欲饮，纳呆恶心，小便色黄，大便不畅，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清化湿热，理气和胃。

代表方：清中汤加减。

22、C

【解析】脱疽湿热毒盛证

证候：患肢剧痛，日轻夜重，局部肿胀，皮肤紫暗，浸淫蔓延，溃破腐烂，肉色不鲜；身热口干，便秘溲赤；舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿，解毒活血。

代表方：四妙勇安汤加减。

23、C

【解析】产后身痛风寒证

主要证候：产后肢体关节疼痛，屈伸不利，或痛无定处，或冷痛剧烈，宛如针刺，得热则舒，或关节肿胀，麻木，重着，伴恶寒怕风；舌淡苔薄白，脉濡细。

治法：养血祛风，散寒除湿。

方药：独活寄生汤或趁痛散、防风汤。

24、A

【解析】一次切开挂线法治疗肛痛的适应证包括：肛隐窝感染而致坐骨直肠间隙脓肿，骨盆直肠间隙脓肿，肛门直肠后间隙脓肿及马蹄形脓肿等。

25、D

【解析】意外因素：小儿没有或者缺少生活自理能力，没有或者缺乏对周围环境安全或危险状况的判断能力，因而容易受到意外伤害。例如：误触水火的烫伤，跌仆损伤的外伤，误食毒物的中毒，误吸异物的窒息等。

26、A

【解析】月经过少肾虚证

主要证候：经量素少或渐少，色黯淡，质稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，足跟痛，或小腹冷，或夜尿多；舌淡，脉沉弱或沉迟。

治法：补肾益精，养血调经。

方药：归肾丸或当归地黄饮。

27、A

28、E

【解析】题干描述的是子晕阴虚肝旺证的主要证候，故其治法为健脾化湿，平肝潜阳，首选治疗方剂为杞菊地黄丸。

29、B

30、A

【解析】近1年月经后期量少，现已停经4个月，尿妊娠试验阴性——由月经后期发展而成的闭经。五心烦热，潮热颧红，舌红少苔，脉细数——阴虚内热表现。营阴亏耗，虚火上炎，火逼水涸，阴血燥竭，故而闭经。所以，此为闭经之阴虚血燥证。治宜养阴清热调经。方用加减一阴煎加丹参、黄精、女贞子、制香附。

31、A

32、D

【解析】乳癖多见于青中年妇女，常伴有月经失调、流产史。常同时或相继在两侧乳房内发生多个大小不一的肿块，其形态不规则，或圆或扁，质韧，分散于整个乳房，或局限在乳房的一处。肿块与周围组织分界不清，与皮肤和筋膜无粘连，推之移动。乳癖是以乳房有形状大小不一的肿块，疼痛，与月经周期相关为主要表现的乳腺组织的良性增生性疾病。本证属冲任失调，应以调摄冲任为主，方用二仙汤合用四物汤。故选D。考点：乳癖

33、E

34、C

【解析】哮喘的病位在肺，与脾、肾密切相关。

35、C

36、B

【解析】婴儿期这一时期生长发育迅速，处于乳类喂养并逐渐添加辅食的阶段，机体发育快，营养需求高。

37、A

38、C

【解析】抽动障碍病位主要在肝，与心、脾、肾密切相关。

39、B

【解析】内伤发热之气虚发热证

证候主症：发热，热势或低或高，常在劳累后发作或加剧，倦怠乏力，气短懒言，自汗，易于感冒，食少便溏，舌质淡，苔白薄，脉细弱。

40、E

41、C

42、B

【解析】1. 子宫的主要功能是产生、排出月经；孕育、分娩胎儿。

2. 阴道是防御外邪入侵的关口，是排出月经、分泌带下的通道，是阴阳交合的器官，又是娩出胎儿的路径，故亦称产道。

43、A

44、A

【解析】腹痛之寒邪内阻证

证候主症：腹痛拘急，遇寒痛甚，得温痛减，口淡不渴，形寒肢冷，小便清长，大便清稀或秘结，舌质淡，苔白腻，脉沉紧。

治法：散寒温里，理气止痛。

45、D

46、B

【解析】狂证之痰热瘀结证

证候主症：癫狂日久不愈，面色晦滞而秽，情绪躁扰不安，多言不序，恼怒不休，甚至登高而歌，弃衣而走，妄见妄闻，妄思离奇，头痛，心悸而烦，舌质紫暗，有瘀斑，少苔或薄黄苔干，脉弦细或细涩。

证机概要：气郁痰结，血气凝滞，瘀热互结，神窍被塞。

治法：豁痰化瘀，调畅气血。

代表方：癫狂梦醒汤加减。

47、C

48、B

49、D

50、B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/435124202222011143>