

2021-2022 护师类之护师（初级）通关题库(附带答案)

单选题（共 80 题）

1、患者男，45岁。因车祸外伤骨折，行内固定手术，术后3天，伤口处出现大小不等的水疱，轻压可有捻发音，并有稀薄、恶臭的血性分泌物流出，初步考虑是

- A. 局部化脓感染
- B. 气性坏疽
- C. 破伤风
- D. 败血症
- E. 菌血症

【答案】 B

2、患者，男，30岁。夜间发作性上腹烧灼痛2月余，进食后迅速缓解，昨起排柏油样便2次，今晨起床时晕倒而就诊。体检T 37℃，P 120次/分，R 24次/分，BP 10.7/6.6kPa (80/60mmHg)，神志恍惚，皮肤苍白，四肢厥冷。考虑出血原因是（ ）。

- A. 胃底静脉曲张
- B. 应激性溃疡
- C. 十二指肠球部溃疡
- D. 胃小弯溃疡
- E. 胃癌

【答案】 C

3、尿比重低而固定的特征性表现见于

- A. 急性肾小球肾炎

B. 肾病综合征

C. 尿毒症

D. 慢性肾盂肾炎

E. 肝肾综合征

【答案】 C

4、某孕妇，25岁。孕1产0，孕8周，早孕出现较重的呕吐。皮肤黏膜苍白，毛发干燥无光泽，活动无力，易头晕。实验室检查：血红蛋白70g/L，血细胞比容0.15，血清铁60 μ mol/L。下列孕期健康宣教内容，错误的是（ ）。

A. 给予心理支持，减少心理应激

B. 重点评估胎儿宫内生长发育状况

C. 如果服用铁剂时胃肠道反应较轻，则不需同服维生素C

D. 重点监测胎心率变化

E. 应列为高危妊娠，加强母儿监护

【答案】 C

5、下列不符合甲状腺功能亢进患者治疗要点的是

A. 常用的抗甲状腺类药物为咪唑类和硫脲类

B. 白细胞计数<3*10⁹/L

C. 并发甲状腺危象发热的患者使用阿司匹林降温

D. 甲状腺危象患者抑制甲状腺激素合成及T₄、T₃的释放

E. 妊娠中晚期的患者紧急手术

【答案】 C

6、急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的梗阻因素是

A. 胆道蛔虫

B. 胆管结石

C. 胆道肿瘤

D. 胆管狭窄

E. 胆管痉挛

【答案】 B

7、穿隔离衣时，消毒后清洁的手不可以接触隔离衣的（ ）。

A. 领口外面

B. 领口里面

C. 外面

D. 内面

E. 衣袖里面

【答案】 C

8、阴道宫颈细胞学检查的禁忌证为

A. 输卵管肿瘤

B. 宫颈炎症

C. 月经期

D. 宫颈肿瘤

E. 卵巢功能异常

【答案】 C

9、某孕妇，30岁。孕36周。来院做常规妇科复查，必查的项目是（ ）。

A. 骨盆外测量

B. 内诊检查

C. 测宫底高度

D. 胸部 X 线检查

E. 血 HCG

【答案】 C

10、各类休克共同的病理生理改变是（ ）。

A. 酸碱平衡失调

B. 组织细胞坏死

C. 外周血管阻力升高

D. 有效循环血量锐减

E. 心排出量减少

【答案】 D

11、患者男，50岁。半年来经常发生肾绞痛、血尿，拟作静脉肾盂造影。造影前准备错误的是

A. 常规肠道准备

B. 当天禁用早餐

C. 鼓励饮水

D. 检查前排尽尿液

E. 做碘过敏试验

【答案】 C

12、目前Ⅰ期、Ⅱ期乳腺癌常用的手术方式是

- A. 乳腺癌根治术
- B. 乳腺癌扩大根治术
- C. 乳腺癌改良根治术
- D. 全乳房切除术
- E. 保留乳房的乳腺癌切除术

【答案】 C

13、患者，男，43岁。一氧化碳中毒入院。一氧化碳中毒时，常最先受损的脏器是

- A. 脑
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 血液系统

【答案】 A

14、下列血气分析结果符合Ⅱ型呼吸衰竭的是

- A. PaO₂↑
- B. PaO₂↓
- C. PaCO₂↑
- D. PaCO₂↓
- E. PaO₂↑, PaCO₂↑

【答案】 D

15、急性肾小球肾炎患儿血沉恢复的时间一般是

- A. 1~2 周
- B. 2~3 周
- C. 5~6 周
- D. 2~3 个月
- E. 3~4 个月

【答案】 D

16、患儿，7岁，有服不洁食物史，高热7小时，呕吐3次，惊厥2次，入院。体温40.3℃，面色苍白，四肢厥冷，脉搏细速，脑膜刺激征(-)，今日未排大便，6小时无尿。

- A. 体温过高
- B. 排便异常
- C. 体液不足
- D. 知识缺乏（家长）
- E. 排尿异常

【答案】 B

17、胆道系统疾病首选的检查方法是

- A. 口服胆囊造影
- B. 静脉胆囊造影
- C. X线平片
- D. B超
- E. 经皮肝穿胆道造影

【答案】 D

18、在猩红热患儿的皮疹特点中，下列哪项不正确

- A. 多在发热的第 2 天出现
- B. 在全身皮肤弥漫性充血潮红的基础上，广泛分布均匀密集的红色细小皮疹
- C. 无脱皮和脱屑
- D. 于 24 小时内布满全身
- E. 最先发生于耳后、颈部和上胸部

【答案】 C

19、正常新生儿的外观特点有

- A. 胎毛多
- B. 四肢屈曲
- C. 乳晕不清
- D. 女婴大阴唇不能盖住小阴唇
- E. 男婴睾丸未降

【答案】 B

20、患者，男性，35 岁。因利器损伤胸部导致血胸，胸腔穿刺抽出不凝血，是因为（ ）。

- A. 出血量太大
- B. 弥散性血管内凝血
- C. 凝血因子减少
- D. 心、肺、膈肌活动去纤维蛋白作用

E. 胸腔内渗出液的稀释作用

【答案】 D

21、手足搐搦症患儿最危险的症状是

- A. 惊厥
- B. 手足搐搦
- C. 喉痉挛
- D. 夜惊
- E. 烦躁

【答案】 C

22、因口服药物引起急性中毒的病人，意识清醒时应首选

- A. 口服催吐洗胃法
- B. 漏斗胃管洗胃法
- C. 注洗器胃管洗胃法
- D. 自动洗胃机洗胃法
- E. 药物导泻清除法

【答案】 A

23、外文缩写“SOS”译成中文的正确含义是（ ）。

- A. 隔日一次
- B. 必要时（限用一次，12小时内有效）
- C. 需要时（限用一次，24小时内有效）
- D. 必要时（长期）

E. 每晚一次

【答案】 B

24、依沙吖啶（利凡诺）引产适用于

- A. 妊娠 7 周以内
- B. 妊娠 6~10 周
- C. 妊娠 11~14 周
- D. 妊娠 15~24 周
- E. 妊娠 15~28 周

【答案】 D

25、吸入糖皮质激素可抑制气道变应性炎症，降低气道高反应性，其不良反应有

- A. 口干和皮疹
- B. 口咽部真菌感染
- C. 腹绞痛和腹泻
- D. 耳鸣和高血压
- E. 红斑和视物模糊

【答案】 B

26、阴道分泌物悬滴检查目的在于

- A. 了解卵巢功能
- B. 了解月经周期
- C. 了解有无排卵

D. 查滴虫与真菌

E. 检查阴道 pH

【答案】 D

27、产妇死亡的第一位原因是

A. 妊娠期高血压疾病

B. 妊娠合并心脏病

C. 产后出血

D. 羊水栓塞

E. 产褥感染

【答案】 C

28、判断心力衰竭患儿使用洋地黄后是否有效的指标不包括

A. 心率减慢

B. 呼吸改善

C. 肝缩小

D. 尿量减少

E. 尿量增加

【答案】 D

29、护士指导正常孕妇产前检查的时间正确的是（ ）。

A. 孕第 1 周进行全面产科检查

B. 孕 12~20 周每周检查一次

C. 孕 21~28 周每 3 周检查一次

D. 孕 28 周后每 2 周检查一次

E. 孕 36 周后入院待产

【答案】 D

30、护士在静脉注射氨茶碱速度过快时，患者可能会出现下列哪种问题

A. 呼吸减慢

B. 心律失常、血压下降

C. 尿量减少

D. 胃肠道不适

E. 皮疹

【答案】 B

31、患者，女性，23岁，海边游玩时不慎落水，第1目击者将其救出后并实施心肺复苏，4分钟后被送至急诊，医生拟给患者注射肾上腺素，首选的给药途径是

A. 心内

B. 静脉

C. 肌注

D. 皮内

E. 直肠内

【答案】 B

32、关于人的基本需要的叙述，不正确的是（ ）。

A. 祈祷、烧香拜佛属于宗教性需要

B. 呼吸、排泄、睡眠属于生理性需要

- C. 朋友交往属于爱与归属的需要
- D. 喜欢在熟悉的环境中生活属于安全的需要
- E. 学习、探究事物真相属于自我实现的需要

【答案】 A

33、X 线检查见肺内云絮状阴影，提示可能的疾病是

- A. 气胸
- B. 肺炎
- C. 肺气肿
- D. 肺癌
- E. 支气管扩张

【答案】 B

34、区别良、恶性葡萄胎的主要依据是

- A. 阴道出血出现的迟早
- B. 有无早孕反应
- C. 体内 HCG 的含量
- D. 葡萄胎病变有无超出子宫范围
- E. 有无转移灶

【答案】 D

35、患者，女，70岁。有高血压病史25年。突然出现剧烈头痛伴左侧上下肢瘫痪。诊断为“脑出血”。此时正确的护理措施是（ ）。

- A. 12 小时后给予鼻饲流质饮食

- B. 去枕平卧位
- C. 发病 48 小时内避免搬动
- D. 补充血容量
- E. 头部热敷

【答案】 C

36、患者男性，50岁。有过放射线接触史，近2周发热，全身皮肤黏膜出血。
血红蛋白 60g/L，红细胞 $2.0 \times 10^12/L$

- A. B 超
- B. CT 检查
- C. 放射性核素骨扫描
- D. 骨穿检查
- E. 再次复查血常规

【答案】 D

37、孕妇，25岁，孕10周，医生查体时典型的体征是

- A. 尿急
- B. 子宫出现黑加征
- C. 呕吐
- D. 乳晕变黑
- E.嗜睡

【答案】 B

38、严重的多根多处肋骨骨折，紧急处理措施是

- A. 气管插管辅助呼吸
- B. 镇痛
- C. 胸腔闭式引流
- D. 加压包扎固定软化的胸壁
- E. 气管切开

【答案】 D

39、治疗休克的基本措施是（ ）。

- A. 治疗原发病
- B. 补充血容量
- C. 应用血管活性药物
- D. 纠正代谢紊乱
- E. 增强心功能

【答案】 B

40、患儿，6个月。患支气管肺炎，半天来突然烦躁不安，喘憋加重，口周青紫。体检：呼吸68次/分，心率180次/分，心音低钝，两肺细湿啰音增多，叩诊无异常，肝肋下3.5cm，最可能发生（ ）。

- A. 急性心力衰竭
- B. 脓胸
- C. 脓气胸
- D. 肺大疱
- E. 肺不张

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/436021114240010043>