北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科找答案》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：肱骨髁上骨折损伤肱动脉未予早期处理，后期将出现（　）。A.Volkman畸形

B.并指畸形

C.爪形手畸形

D.垂腕畸形

E.槌状指畸形

2、单项选择题：下述有关颈髓脊髓休克的论述错误的是（　）。A.脊髓突然失去高位中枢的调节，进入暂时的无反应状态

B.脊髓休克期内损伤平面以下呈弛缓性瘫

C.反射恢复后屈肌反射往往增强

D.反射恢复的顺序是由近及远，由高至低

E.脊髓休克期的长短与年龄有关，小儿较成人短

3、单项选择题：骨科的物理学检查、X线检查和下列哪项检查被一起称为”三结合”检查（　）。A.病理检查

B.实验室检查

C.关节镜检查

D.电生理检查

E.神经系统检查

4、单项选择题：一女性患者因胫骨上端骨肿瘤行胫骨上端骨切除术后拟行膝关节置换治疗，选择哪种假体为好（　）。A.髁限制型人工膝关节

B.绞链式人工膝关节

C.绞链旋转式人工膝关节

D.球臼式人工膝关节

E.后稳定型人工膝关节

5、单项选择题：下列叙述中错误的是（　）。A.锁骨骨折最常发生在儿童

B.儿童骨骼韧性强，骨膜厚而坚韧，不易发生粉碎性骨折

C.儿童时期关节囊强度明显高于干骺端骨骺的强度，因而很少发生肘关节脱位

D.儿童肢体外伤时进行对侧相应部位X线片检查是可取的，因可能有先天畸形和不规则骨骺板的存在会引起混淆

E.斜颈的原因是颈椎先天性畸形

6、单项选择题：10岁男孩，摔伤4小时，体检：右肘呈半屈曲位畸形，肿胀严重，触痛明显。桡动脉搏动细弱。最佳处理方法为（　）。A.血管造影

B.肌电图检查

C.手法复位，屈肘位石膏固定

D.切开复位，探查神经血管

E.以上都不是

7、单项选择题：臂丛神经的组成为（　）。A.颈17神经

B.颈4～7神经

C.颈5～8神经

D.颈4～胸Ⅰ神经

E.颈5～胸1神经

8、单项选择题：股骨颈骨折后发生股骨头缺血坏死，最主要的原因是（　）。A.来自圆韧带内小凹动脉供血中断

B.来自干骺端的滋养动脉供血中断

C.来自旋股内侧动脉供血中断

D.来自旋股外侧动脉供血中断

E.来自旋髂浅动脉供血中断

9、单项选择题：男性，30岁，交通事故被压伤，伤后2小时被抬入院，严重下肢挤压伤合并骨折和严重低血压，此时首要处理应该是（　）。A.注射止痛剂

B.输血和补液

C.骨折固定

D.应用血管收缩药，以提高血压

E.吸氧

10、单项选择题：男，12岁。左下肢无力，有时跌倒，已7年。体检：左股四头肌稍有收缩，右侧卧位，不能引起伸膝活动，此股四头肌的肌力为（　）。A.2级

B.1级

C.0级

D.3级

E.4级

11、单项选择题：男性青年，外伤导致胫腓骨上1/3处开放性粉碎性骨折。行彻底清创，术中摘除游离骨块后伤肢行长期牵引及固定，但6个月骨折仍然不愈合，最大可能的原因是（　）。A.骨折处血液循环差

B.伤肢固定不确实

C.彻底清创时摘除过多碎骨块

D.功能锻炼不够

E.未及时行切开复位及内固定

12、单项选择题：下述哪项检查最能确诊膝陈旧性前交叉韧带完全断裂（　）。A.膝关节X线片

B.关节造影

C.CT

D.Lachman试验

E.抽屉试验

13、单项选择题：股骨下1/3被砸伤患者，局部肿胀、疼痛、畸形，首先应进行的检查是（　）。A.包括

胫骨上 1/3 在内的膝关节正侧位 X 线片

B. 包括膝关节在内的股骨下 1/3 正侧位 X 线片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/436113033021010123