

得分	评卷人

一、客观选择题（共50题，每题2分，共计100分）

（ ）1、口外矫形力上颌可接受的力值是

- A、300~400g
- B、400~500g
- C、600~700g
- D、800~1100g
- E、500~600g

【答案】D

（ ）2、有关牙周膜面积的说法错误的是（ ）

- A、深牙周袋会明显减少牙周膜面积
- B、衡量是否为良好基牙的标准
- C、牙槽骨吸收达磨牙根分叉时，牙周膜面积大量丧失
- D、恒定性强
- E、单根牙以牙颈部区最大

【答案】D

（ ）3、临床上哪项是衡量一个牙是否为良好基牙的重要指标（ ）

- A、牙槽骨的密度
- B、牙根数目
- C、牙根分叉度
- D、牙周膜面积
- E、牙根长度

【答案】D

（ ）4、人类表皮由内向外分为五层，一般认为表皮损伤不超过哪一层即不形成疤痕组织

- A、棘层
- B、粒层
- C、透明层
- D、基层
- E、角质层

【答案】D

- () 5、主动安乐死是指()
- A、对濒死病人给予适当的维持治疗使其安然死亡
 - B、放弃抢救濒死者生命的措施任其死亡
 - C、患者自己结束痛苦的生命
 - D、家属结束患者痛苦的生命
 - E、对治愈无望的患者，利用人工干预的医学方法加速其死亡

【答案】D

- () 6、与全口义齿无关的解剖标志是()
- A、腭小凹
 - B、前颤动线
 - C、后颤动线
 - D、翼上颌切迹
 - E、磨牙后垫

【答案】B

- () 7、覆盖义齿制作时应注意()
- A、基托组织面与覆盖基牙间，与长冠、短冠金属顶盖间以及双重顶盖间应留有1mm间隙
 - B、组织倒凹的处理
 - C、利用磁体
 - D、基托增力设计
 - E、以上都正确

【答案】E

- () 8、最早明确提出保守医密和反对堕胎这两条医德规范的是()
- A、希波克拉底《希波克拉底誓言》
 - B、孙思邈《备急千金要方》
 - C、宋国宾《医业伦理学》
 - D、《黄帝内经》
 - E、帕茨瓦尔《医学伦理学》

【答案】A

- () 9、病人对经治医生不满意时，可以重新选择医生属于
- A、病人的权利

- B、病人的义务
- C、病人和医生共同的义务
- D、医生的义务
- E、医生的权利

【答案】A

() 10、唇颊沟加深术最常见的方法是

- A、游离皮瓣
- B、皮肤游离移植
- C、口底组织瓣转移
- D、唇组织瓣转移
- E、颊组织瓣转移

【答案】D

() 11、Begg技术使用微力，成功地解决了口内支抗问题而不需要口外支抗，这是利用了

- A、转矩
- B、差动力原理
- C、缺陷保持器
- D、倾斜移动
- E、序列拔牙法

【答案】B

() 12、降颌肌群包括 ()

- A、二腹肌后腹
- B、二腹肌前腹、二腹肌后腹、颏舌肌
- C、下颌舌骨肌、颏舌肌、二腹肌前腹
- D、下颌舌骨肌、颏舌肌、二腹肌后腹
- E、二腹肌前腹

【答案】C

() 13、患者，男，54岁，右下后牙反复肿痛，牙龈上发生小脓包6个多月，平时遇冷热水敏感，近日劳累后丝丝拉拉疼，蹿至左太阳穴处。检查：右下5龋深及髓，无探痛，叩异样感，颊龈近根尖处有一瘻管口，Ⅰ度松动。右下6无龋，叩(+)，远中牙周袋深约9mm，近根尖牙龈红肿，热测引起痛，放射至颞部。

对主诉最佳治疗方案是 ()

- A、拔除

- B、充填
- C、根管治疗+牙周系统治疗
- D、塑化治疗+牙周系统治疗
- E、牙周系统治疗

【答案】C

() 14、关于牙冠的论述哪个是正确的 ()

- A、牙齿显露于口腔的部分称为牙冠
- B、牙发挥咀嚼功能的部分称为牙冠
- C、由牙釉质覆盖的部分称为牙冠
- D、牙龈缘以上的部分称为牙冠
- E、以上都不正确

【答案】C

() 15、防止食物嵌塞及恢复咬合作用的确卡环是

- A、圈卡
- B、延伸卡环
- C、回力卡环
- D、对半卡环
- E、联合卡环

【答案】E

() 16、区域性淋巴结转移率最低的是

- A、鳞状细胞癌
- B、基底细胞癌
- C、未分化癌
- D、腺上皮癌
- E、淋巴上皮癌

【答案】B

() 17、十四岁男性患者，进行性开口困难7年，面部明显不对称。5岁时曾发生颈部对冲性损伤。

该病最可能的诊断是 ()

- A、咀嚼肌痉挛
- B、破伤风后遗症

- C、癔症性开口困难
- D、颞下颌关节紊乱综合征
- E、颞下颌关节强直

【答案】E

() 18、口腔生态系包括

- A、宿主与微生物
- B、厌氧菌与需氧菌
- C、细菌与病毒
- D、衣原体与原虫
- E、病毒与真菌

【答案】A

() 19、按龋坏程度可将龋病分为 ()

- A、牙釉质龋、牙本质龋和牙骨质龋
- B、窝沟龋、平滑面龋
- C、浅龋、中龋、深龋
- D、干性龋、湿性龋
- E、急性龋、慢性龋、静止性龋

【答案】C

() 20、男性，28岁。右侧颊部巨大蔓状血管瘤。最佳治疗方案是 ()

- A、放射治疗
- B、栓塞后手术切除
- C、手术切除
- D、低温治疗
- E、硬化剂注射

【答案】B

() 21、桥体的龈面材料最好适用

- A、金属
- B、热凝塑料
- C、树脂
- D、自凝塑料
- E、烤瓷

【答案】E

() 22、对全口义齿的固位和支持有利的粘膜形态是 ()

- A、薄
- B、薄、干燥
- C、厚、韧
- D、B和D
- E、厚、松软

【答案】C

() 23、牙冠部近釉牙本质界，钙质球间未钙化的基质是

- A、髓周牙本质
- B、修复性牙本质
- C、前期牙本质
- D、托姆斯颗粒层
- E、球间牙本质

【答案】E

() 24、水痘带状疱疹病毒在成年人、老年人可引起 ()

- A、疱疹性咽峡炎
- B、水痘
- C、手-足-口病
- D、B+D
- E、带状疱疹

【答案】E

() 25、导管结石好发于

- A、浆液腺
- B、黏液腺
- C、颌下腺
- D、腮腺
- E、舌下腺

【答案】C

() 26、表浅的黏膜下脓肿切开引流时，常用1%~2%地卡因行

- A、表面麻醉

- B、氯胺酮+局部浸润麻醉
- C、浸润麻醉
- D、针刺麻醉+局部浸润麻醉
- E、阻滞麻醉

【答案】A

() 27、缓冲型圆锥型套筒冠固位体内冠轴面与外冠的间隙一般为 ()

- A、0.02mm
- B、0.03mm
- C、0.2mm
- D、0.3mm
- E、0.4mm

【答案】B

() 28、下颌神经的分支不包括 ()

- A、咬肌神经
- B、翼外肌神经
- C、颞深神经
- D、蝶腭神经
- E、颊神经

【答案】D

() 29、下列牙列缺损，哪一个属于肯氏第一类第一亚类 ()

- A、右侧上颌第一、二磨牙、左侧上颌中切牙、侧切牙、尖牙、第一、二磨牙
- B、右侧上颌尖牙、第一、二、三磨牙、左侧上颌第二前磨牙、第二、三磨牙
- C、右侧上颌中切牙、侧切牙、尖牙、第一、二、三磨牙、左侧上颌第二前磨牙、第一、二磨牙
- D、右侧上颌中切牙、第二前磨牙、第一、二、三磨牙、左侧上颌中切牙、第一、二、三磨牙
- E、右侧上颌第一、二前磨牙、第二、三磨牙

【答案】D

() 30、圈形卡环臂通常包绕基牙的

- A、3个轴面和3个轴角
- B、1个轴面和1个轴角
- C、2个轴面和2个轴角
- D、4个轴面和3个轴角

E、4个轴面和4个轴角

【答案】D

() 31、牙菌斑内的细菌胞膜成分中，与炎症反应关系最密切的是 ()

- A、粘性多肽
- B、菌毛
- C、内毒素
- D、脂磷壁酸
- E、荚膜

【答案】C

() 32、护士注册的有效期为

- A、一年
- B、三年
- C、二年
- D、五年
- E、四年

【答案】C

() 33、牙菌斑是指 ()

- A、软而未钙化的牙面沉积物
- B、牙面上矿化的细菌性群体
- C、龈缘处软而粘的沉积物
- D、牙面上一种细菌性生物膜
- E、牙面上细菌性群体

【答案】D

() 34、翼静脉丛与颅内相交通是通过

- A、眼静脉、卵圆孔网、颈内静脉
- B、眼静脉、卵圆孔网、破裂孔导血管
- C、上颌静脉、卵圆孔网、破裂孔导血管
- D、眼静脉、上颌静脉、卵圆孔网
- E、颈内静脉、卵圆孔网、破孔导血管

【答案】B

() 35、牙髓失活法最严重的并发症是

- A、封药后疼痛
- B、均不正确
- C、急性牙髓炎
- D、急性根尖炎
- E、化学性骨坏死

【答案】E

() 36、不属于表情肌的是 ()

- A、眼轮匝肌
- B、颞肌
- C、额肌
- D、颊肌
- E、咬肌

【答案】E

() 37、备洞时，下列哪些措施容易造成对牙髓的损害 ()

- A、间断操作
- B、不向髓腔方向施压
- C、连续操作
- D、用锋利的器械
- E、用水冷却

【答案】C

() 38、钉道的位置距釉牙本质界至少为

- A、10~15mm
- B、15~20mm
- C、大于2mm
- D、5~10mm
- E、以上均不正确

【答案】D

() 39、主要用于颌面部、颈部较大手术的术后引流的为

- A、管状引流
- B、纱条引流
- C、加压引流

D、负压引流

E、片状引流

【答案】D

- () 40、一患有双侧完全性唇腭裂的患儿，否认家族中有类似病史，临床表现提示可能患有某种全身发育畸形综合征。

由于存在心脏Ⅱ级收缩期杂音，故在体检时又进行了更为全面的检查，但哪一项是不必要的

A、全消化道造影

B、染色体核型

C、超声心动图

D、智商、神经系统发育

E、肾功能及泌尿系统影像学

【答案】A

- () 41、患者，女，58岁，左耳前发现核桃大小肿物1年，渐进性长大，偶发疼痛，向耳颞部放散，触肿物扁平，质硬，动度差，与周围组织似有粘连，界限不十分清楚。左侧闭眼明显较对侧迟钝。

该患者如行手术治疗，应选择

A、腮腺浅叶及肿物切除术加面神经解剖术

B、腮腺及肿物加面神经局部扩大切除术

C、腮腺及肿物加面神经局部扩大切除术加患侧根治性颈清扫术

D、腮腺肿物剝出术

E、腮腺及肿物加面神经局部扩大切除术加同期面神经移植术

【答案】B

- () 42、婴儿的吮吸功能异常，下颌被降颌肌群向后下牵引，可发展成为

A、舌习惯

B、佝偻病

C、下凳颌后缩畸形

D、维生素A缺乏

E、吮指习惯

【答案】C

- () 43、下述卡环中固位、稳定和支持作用都较好的是 ()

A、Ⅱ型卡环

- B、Ⅲ型卡环
- C、双臂卡环
- D、Ⅰ型卡环
- E、以上说法都正确

【答案】D

() 44、前牙外伤的根管选用的消毒剂为

- A、木馏油
- B、碘仿糊剂
- C、抗生素+激素
- D、甲醛甲酚
- E、樟脑酚

【答案】E

() 45、宿主的防御反应与牙周病，错误的是 ()

- A、病变持续进行时，宿主的防御反应导致组织的破坏
- B、中性粒细胞产生的溶酶体酶对牙周组织有损伤作用
- C、体液和细胞免疫产生的效应物质对牙周组织有损伤作用
- D、炎症早期，宿主的防御反应以保护性机制为主
- E、宿主的防御反应对牙周组织均是破坏性的

【答案】E

() 46、有垂直的叩痛，通常是什么病的诊断依据 ()

- A、牙髓炎
- B、根尖周炎
- C、深龋
- D、过度磨耗
- E、以上疾病均可出现垂直叩痛

【答案】B

() 47、拔牙创内血凝块有成纤维细胞生长，血块开始发生机化的时间是 ()

- A、3天以后
- B、1天以后
- C、2天以后
- D、1个月以后

E、1周以后

【答案】B

() 48、一患者被他人拳击伤及上中切牙，自觉患牙伸长和松动并有咬合痛，检查见上中切牙无明显移位，叩(+)~(++)，松Ⅱ度。

若根尖片表明右上中切牙已经存在明显移位情况，未见牙折，应采用的治疗方法是

- A、局麻下将患牙复位，再与邻牙固定
- B、拔除右上中切牙，将左上中切牙与邻牙固定
- C、在现有位置上固定患牙
- D、不作特殊处理
- E、上中切牙复位固定，再行上中切牙根管治疗

【答案】A

() 49、意外露髓的牙髓组织经盖髓治疗后继发性牙本质形成封闭露髓孔一般在术后几个月左右完成 ()

- A、4
- B、5
- C、3
- D、2
- E、1

【答案】D

() 50、诊断根尖周囊肿最重要的诊断依据为 ()

- A、牙髓无活力
- B、根尖周透射区周边有白线围绕
- C、囊液中见到胆固醇结晶
- D、根管内有浅黄透明囊液
- E、包括以上各项

【答案】B

得分	评卷人

一、客观选择题（共50题，每题2分，共计100分）

（ ）1、悬空式桥体应离开牙槽嵴不低于 （ ）

- A、4.0mm
- B、1.0mm
- C、3.0mm
- D、5.0mm
- E、2.0mm

【答案】C

（ ）2、患者，女性，50岁，牙周治疗后右上后牙咬合疼痛1天，自感该牙有松动、伸长。检查：见右下7颊侧牙龈充血水肿，呈椭圆形肿胀突起，叩痛(++)，松动Ⅰ度，牙周探诊6mm，X线片示根分叉区暗影。

此时不宜采取的治疗手段是 （ ）

- A、牙周冲洗上药
- B、彻底的龈下刮治
- C、调磨早接触点
- D、牙髓牙周联合治疗
- E、口服抗生素

【答案】D

（ ）3、患者16岁，女性，左下后牙遇冷水痛2周，平时无不适；查左下6咬合面深龋，叩诊(-)。冷测引起一过性敏感，下列诊断中有哪一项可除外 （ ）

- A、龈乳头炎
- B、慢性牙髓炎
- C、深龋
- D、急性牙髓炎
- E、可复性牙髓炎

【答案】D

（ ）4、倒凹集中在左侧，义齿应

- A、垂直就位

- B、右侧先就位
- C、从前向后就位
- D、从后向前就位
- E、左侧先就位

【答案】E

- () 5、关于种植义齿下列说法正确的是 ()
- A、圆柱形种植体较圆锥形、带螺纹较光滑种植体其骨界面应力值较小
 - B、骨界面应力与种植体长度呈负相关关系
 - C、应力易集中在种植体颈部和种植体末端相应的界面骨组织区
 - D、螺纹状较柱状种植体更能抵抗微动，利于界面间的早期骨结合
 - E、以上都正确

【答案】B

- () 6、牙周病的致病菌，哪项是不正确的 ()
- A、局限型青少年牙周炎的菌斑量显著增加
 - B、快速进展性牙周炎的非附着菌斑量增加
 - C、快速进展性牙周炎非附着菌斑以革兰阴性厌氧杆菌为主
 - D、慢性牙周炎非附着菌斑的量增加
 - E、慢性牙周炎非附着菌斑以革兰阴性厌氧杆菌为主

【答案】A

- () 7、恒牙列中，患龋频率最高的是 ()
- A、下前牙
 - B、上颌第二磨牙
 - C、下颌第一磨牙
 - D、下颌第二磨牙
 - E、上颌第一磨牙

【答案】C

- () 8、面神经颊支 ()
- A、位于耳屏间切迹与鼻翼上缘的连线
 - B、一般与腮腺导管平行
 - C、来自颞面干
 - D、出腮腺前缘行于咬肌筋膜深面

E、损伤时口角歪斜

【答案】B

() 9、口腔内的混合唾液中，水约占

A、99.8%

B、99.4%

C、99%

D、98.4%

E、99.9%

【答案】B

() 10、以下关于后堤区的描述，错误的是()

A、后缘位于后颤动线之前

B、前缘位于前颤动线

C、后堤区平均宽8mm

D、黏膜弹性较差

E、后堤区有利于边缘封闭

【答案】D

() 11、若上侧切牙缺牙间隙小，而尖牙牙根长大，且牙体切角缺损，下颌对颌牙为局部义齿，此时最好的设计是()

A、活动义齿

B、种植义齿

C、粘结桥

D、双端固定桥

E、单端固定桥

【答案】E

() 12、病人张口困难，X线摄片示间隙消失，髁状突和关节凹融合成致密团块，可能是

A、颞下颌关节外强直

B、关节盘穿孔破裂

C、颞下颌关节内骨性强直

D、骨性颌间瘢痕挛缩

E、破伤风关节紧闭

【答案】C

() 13、下颌颌骨前后方向生长的是

() 13、下颌颌骨前部牙肉肿胀的是

- A、颌下腺囊肿
- B、舌下腺囊肿
- C、根尖囊肿
- D、萌出囊肿
- E、角化囊肿

【答案】E

() 14、手术治疗中一般病人知情权不包括

- A、有同意的合法权利
- B、有做出决定的认知力
- C、有权自主选择
- D、有家属代为决定的权利
- E、有明确决定的理解力

【答案】D

() 15、在方丝弓矫治器应用过程中，排齐和整平牙列时最常用的方丝为

- A、0.016英寸的不锈钢圆丝
- B、镍钛方丝
- C、0.018英寸的不锈钢圆丝
- D、镍钛圆丝
- E、0.018×0.025英寸的不锈钢丝

【答案】D

() 16、体现对精神病患者病情保密原则的是()

- A、对疑似精神病患者应进行详细的检查，防止误诊误治
- B、详细向精神病患者家属解释有关的治疗方案
- C、为防止精神病患者出现过激行为，严格限制其自由是必要的
- D、尊重精神病患者的人格，对其恢复期应进行心理辅导
- E、精神病患者的病情不宜公开

【答案】E

() 17、正畸治疗中牙根吸收多少称为明显的根吸收

- A、1~2mm
- B、小于0.5mm

C、0.5~1mm

D、大于3mm

E、大于6mm

【答案】D

() 18、患者，男性，24岁。主诉：牙龈疼痛伴出血3天。检查：牙龈缘充血、水肿，龈乳头变平，探诊易出血，有腐败性口臭。此患者最可能的诊断是 ()

A、边缘性龈炎

B、牙间乳头炎

C、青少年牙周炎

D、急性坏死性龈炎

E、牙龈纤维瘤病

【答案】D

() 19、前牙残根，拔除后可见根尖附着一团组织，镜下见淋巴细胞、浆细胞浸润，臧纤维细胞和血管内皮细胞增生为特征，并可见泡沫细胞和不规则上皮岛。

该病的成因应为

A、牙周创伤

B、病毒感染

C、血行感染

D、急性感染

E、根尖周组织受到轻微的刺激

【答案】E

() 20、关于嵌体基牙预备的基本要求，下列描述正确的是

A、不能制作辅助同位形

B、洞型应做倒凹固位

C、洞缘无斜面

D、邻面可作片切形

E、以上均错误

【答案】D

() 21、颌骨骨折常见的临床体征是 ()

A、骨折段活动异常

B、张口受限

- C、咬合关系错乱
- D、骨擦感
- E、以上都是

【答案】E

- () 22、下面哪项不是良性肿瘤的特征 ()
- A、一般不发生转移
 - B、一般对机体无影响
 - C、细胞分化好，细胞形态和结构与正常相似
 - D、一般生长较慢
 - E、多呈浸润性生长

【答案】E

- () 23、关于主承托区的描述正确的是 ()
- A、能承担咀嚼压力
 - B、包括上下颌后部牙槽嵴顶的区域
 - C、表面有高度角化的复层鳞状上皮
 - D、上皮下有致密的结缔组织
 - E、以上均对

【答案】E

- () 24、患者因右下后牙遇甜食痛求诊。检查：右下6远中面龋，探敏感，冷热测同对照牙。右下7颊面色素沉着，可卡住探针，冷测同对照牙。诊断为 ()
- A、右下7浅龋，右下6深龋
 - B、右下7中龋，右下6深龋
 - C、以上诊断均不正确
 - D、右下7浅龋，右下6中龋
 - E、右下67中龋

【答案】D

- () 25、通常会出现口腔病损的是哪一类天疱疮 ()
- A、大疱型类天疱疮
 - B、红斑型天疱疮
 - C、寻常型天疱疮
 - D、增殖型天疱疮

E、落叶型天疱疮

【答案】C

() 26、舌前2 / 3和舌后1 / 3的分界是

- A、盲孔
- B、界沟
- C、轮廓乳头
- D、十状乳头
- E、舌扁桃体

【答案】B

() 27、利多卡因用于局部麻醉，一次最大剂量为 ()

- A、800~1000mg
- B、60~100mg
- C、300~400mg
- D、100~150mg
- E、200~300mg

【答案】C

() 28、固位体类型有 ()

- A、冠外固位体
- B、冠内固位体
- C、根内固位体
- D、ABC
- E、以上都不是

【答案】D

() 29、牙齿磨耗取决于 ()

- A、食物种类
- B、咀嚼习惯
- C、牙齿硬度
- D、年龄增长
- E、以上都有

【答案】E

() 30、儿童颌骨骨折治疗原则错误的是 ()

- A、必须恢复伤前的咬合关系
- B、固定时间较成人短
- C、如要手术治疗，术中应避免损伤牙胚
- D、尽可能采用保守治疗
- E、尽早复位

【答案】A

- () 31、男，50岁，半年前发现左耳垂后下有扁平较硬的肿块，约5分硬币大小，界限不明确。偶感钝痛，全身无其他不适。近日发现肿块表面皮肤变色，呈暗红色，昨日破溃后有脓液流出，其中可见针尖大小淡黑色颗粒。该病人最可能的诊断是 ()
- A、急性化脓性腮腺炎
 - B、慢性复发性腮腺炎
 - C、腮腺结核
 - D、腮腺放线菌病
 - E、腮腺区嗜伊红肉芽肿

【答案】D

- () 32、在高氟区生活可造成氟牙症的年龄为
- A、31岁以后
 - B、23~30岁
 - C、16~22岁
 - D、8~15岁
 - E、0~7岁

【答案】E

- () 33、出自汉代张仲景《伤寒杂病论》的内容是()
- A、“启我爱医术，复爱世间人，愿绝名利心，尽力为病人。”
 - B、“我愿尽余之能力及判断力所及，遵守为病家谋利益之信条。”
 - C、“先知儒理，然后方知医理……。”
 - D、“医本活人，学之不精，反为夭折。”
 - E、“留神医药，精通方术……以善其生。”

【答案】E

- () 34、社会舆论是医德评价的重要方式之一，下列除哪一项之外，都是可取的()
- A、有些医务人员采取用药、休假迁就患者不合理的要求，以取悦患者来获取好的医德社会舆论
 - B、医德社会舆论中必须是多数人有共同看法，少数人看法形不成社会舆论

C、医德社会舆论有二部分，一部分是有领导、有组织地就医疗卫生某思想观点的讨论，另一部分是自发形成的某一看法

D、医德方面的社会舆论就是世人对医疗卫生工作评论，它必须有一定人群数量，对某一问题有明确看法

E、医德社会舆论的抑扬、褒贬是一种无形的精神力量，在道德评价中起着十分特殊的作用

【答案】A

() 35、女，刃岁，口干2年，双腮腺反复肿胀，临床检查唾液流率降低。

腮腺造影应选择什么造影剂

A、60%碘化油

B、20%碘化油

C、60%泛影葡胺

D、40%碘化油

E、40%泛影葡胺

【答案】C

() 36、根尖周病是指 ()

A、牙周组织的慢性退变性疾病

B、牙周组织向根尖方向退缩的病变

C、牙齿支持组织发生的病变

D、整个牙周组织的炎症病变

E、牙齿根尖部及其周围的组织发生的病变

【答案】E

() 37、无龋者为 ()

A、30岁中年男性

B、出生4个月婴儿

C、6岁儿童

D、16岁少年

E、出生8个月婴儿

【答案】B

() 38、下列处理医际关系的原则不正确的是()

A、彼此平等、相互尊重

B、彼此独立、相互支持和帮助

- C、彼此信任、相互协作和监督
- D、相互学习、共同提高和发挥优势
- E、彼此协作、力争最大的经济效益

【答案】E

() 39、制作义齿前，应用观测器的目的下面哪一种说法不正确 ()

- A、确定义齿各部件的共同就位道
- B、画出牙冠外形高点线
- C、画出各基牙以及与义齿有关的余留牙和牙槽嵴粘膜上的观测线
- D、画出导线
- E、观测分析基牙和组织倒凹的大小

【答案】B

() 40、腭裂手术两侧松弛切口内填塞的碘仿纱条抽除时间为术后

- A、4~6天
- B、3~4天
- C、15天以后
- D、2天
- E、7~12天

【答案】E

() 41、斯-约综合征除口腔粘膜损害，还伴有 ()

- A、正常皮肤出现大小不等的水疱
- B、眼干、关节疼
- C、皮肤靶形红斑，多见于四肢
- D、眼结膜疱、溃疡，球睑结膜黏连
- E、引流区淋巴结肿大、肺部阴影

【答案】D

() 42、医患关系遵循的最重要的道德原则是

- A、医患监督关系
- B、医患团结关系
- C、医患平等关系
- D、医患友爱关系
- E、医患互助关系

【答案】C

- () 43、下列有关颌骨骨髓炎的描述，不正确的是
- A、慢性感染中可见骨细胞消失，骨陷窝空虚，呈无结构死骨
 - B、感染的初期，骨髓腔内血管扩张充血，大量中性粒细胞浸润，组织溶解形成脓肿
 - C、致密性骨炎骨髓腔窄小，腔内有纤维组织及少量淋巴细胞浸润
 - D、慢性骨髓炎，若伴增生性骨膜炎时，可见反应性新骨形成
 - E、临床上以单纯金黄色葡萄球菌感染多见

【答案】E

- () 44、关于复合树脂，下列说法叙述错误的为
- A、小颗粒型复合树脂有光洁的表面和良好的色泽稳定性，广泛用于前牙
 - B、复合树脂的线胀系数大于天然牙
 - C、体积收缩导致复合树脂与牙体之间形成边缘裂缝是复合树脂的一大缺陷
 - D、填料含量多、粒度大的比填料含量少、粒度小的复合树脂的机械强度高
 - E、在树脂基质相同的情况下，填料越多，复合树脂的线胀系数越小

【答案】A

- () 45、食物是引起龋病的因素以下观点哪项错 ()
- A、蔗糖必须通过细菌作用才能致龋
 - B、吃糖量比吃糖次数对于龋的发生更重要
 - C、食物磷含量与龋发生有关
 - D、食物物理性状与龋病发生密切相关
 - E、食物在牙面滞留会引起龋

【答案】B

- () 46、第二序列弯曲是指
- A、内收弯
 - B、转矩
 - C、在矫治弓丝上作水平向的一些弯曲
 - D、外展弯
 - E、矫治弓丝在垂直向的弯曲

【答案】E

- () 47、患者，女性，23岁，1天前因外伤出现下前牙松动，触痛，无自发痛及夜间痛。检查：左下1松动Ⅱ度，叩(+)，左下2、右下1松动Ⅰ度，龈上结石Ⅰ度。首先应采取的治疗措施是 ()

- A、牙髓治疗左下1
- B、拔除松动患牙左下1
- C、全身和局部使用抗生素
- D、松牙固定下前牙
- E、牙周基础治疗左下1、左下2、右下1

【答案】D

- () 48、患者，女性，48岁，因左侧面颊部皮肤及舌部粘膜起疱3天，伴剧痛来诊，检查：左侧面部皮肤及左侧舌背、颊粘膜可见密集成片的水疱、溃疡，周围皮肤粘膜充血。该病拟诊断为带状疱疹。

本病可发生的严重并发症为 ()

- A、脑炎
- B、肺炎
- C、面瘫
- D、结膜炎
- E、角膜炎

【答案】A

- () 49、下颌游离缺失的局部义齿，其基托后缘应位于

- A、磨牙后垫后缘
- B、磨牙后垫前缘
- C、末端人工牙远中
- D、磨牙后垫1 / 3~1 / 2处
- E、以上均可

【答案】D

- () 50、在模型上调整邻接关系时错误的说法是 ()

- A、用较厚的复写纸
- B、反复少量
- C、缓慢研磨
- D、冠在代型上彻底就位
- E、冠的近远中与邻牙接触

【答案】A

往年356口腔修复学样卷(三)

得分	评卷人

一、客观选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、如果预见到人体试验有可能对受试者造成较严重的伤害，采取的正当措施应该是
- A、分辨是精神伤害还是身体伤害，如果是精神伤害，可以在加强监护的基础上继续进行
- B、按照试验主管部门的意见进行
- C、不再考虑其他任何情况，立即停止试验
- D、请专家论证，如果确信造成较严重伤害的概率小于50%，可以谨慎地进行
- E、在确证放弃试验经济损失不大的情况下，可以放弃试验

【答案】C

- () 2、一位诊断为慢性牙周炎的牙周病患者，已于2个月前完成牙周基础治疗，现需选择最佳手术方法。

袋深5~6mm，X线片：牙槽骨吸收不规则应选择

- A、引导性组织再生术
- B、牙周翻瓣术+骨成形术
- C、根向复位瓣术
- D、牙龈切除术
- E、改良Widman术+骨成形术

【答案】B

- () 3、龋蚀显示液染色的龋坏组织是 ()

- A、软化无细菌感染的牙本质
- B、软化牙釉质
- C、感染的软化牙本质
- D、感染及非感染的软化牙本质
- E、以上均是

【答案】E

- () 4、患者，女性，40岁，半年来觉下前牙龈增生，影响美观，偶刷牙出血。检查：见下前牙唇侧牙龈轻度增生，质地有弹性，色近正常，探及少量龈上及龈下结石。

若行“龈上、下洁治术”2周后，增生的牙龈有明显消退、则诊断最可能是 ()

- A、慢性龈乳头炎

- B、浆细胞性龈炎
- C、增生性龈炎
- D、药物性牙龈增生
- E、牙龈纤维瘤病

【答案】C

() 5、制作嵌体的合金哪种最好

- A、金合金
- B、钛合金
- C、铜合金
- D、镍铬合金
- E、钴铬合金

【答案】A

() 6、某患者，前伸髁导斜度为 24° ，其侧方髁导斜度为

- A、 15°
- B、 24°
- C、 10°
- D、 20°
- E、 12°

【答案】A

() 7、男，38岁，进食时左颌下腺肿大1年，检查见左颌下腺稍肿大，无压痛。

颌下腺炎性病变造影应投照片位

- A、侧位片及功能片
- B、后前斜位片
- C、后前位片
- D、侧位片
- E、侧位片及后前位片

【答案】A

() 8、面神经颊支损伤的临床表现为

- A、舌偏向患侧
- B、额部皱纹消失
- C、眼睑闭合不全

D、鼻唇沟变浅

E、下唇歪斜

【答案】D

() 9、下列原因同可摘局部义齿戴入后的基牙疼痛无关的是 ()

A、基牙龋坏或牙周病

B、牙颈部过敏、楔状缺损

C、咬合面磨耗或支托预备过深

D、卡环体或基托过紧

E、基板边缘过长

【答案】E

() 10、上颌结节属于

A、后堤区

B、副承托区

C、缓冲区

D、边缘封闭区

E、主承托区

【答案】C

() 11、全口义齿基托大气压力的大小与下列哪项因素关系最大 ()

A、咀嚼肌

B、面型

C、基托边缘封闭性

D、基托磨光面是否光滑

E、人工牙排列

【答案】C

() 12、唇裂的发生是由于

A、上颌突与侧鼻突未联合

B、球状突与上颌突未联合

C、上颌突与下颌突未联合

D、两球状突未联合

E、侧鼻突与中鼻突未联合

【答案】B

() 13、舌癌好发部位是 ()

- A、舌背
- B、舌腹
- C、舌尖
- D、舌侧缘
- E、舌根

【答案】D

() 14、引起根尖周炎的物理因素为 ()

- A、根充超填
- B、根管器械超出根尖孔
- C、急性外伤
- D、咬合创伤
- E、包括以上各项

【答案】E

() 15、固定桥修复中，根据桥体龈面与牙槽嵴的关系不同，可把桥体与牙槽嵴的接触方式分为 ()

- A、悬空式桥体和单侧接触式桥体
- B、接触式桥体和船底式桥体
- C、悬空式桥体和接触式桥体
- D、船底式桥体和单侧接触式桥体
- E、悬空式桥体和船底式桥体

【答案】C

() 16、一因车祸受重伤的男子被送去医院急救，因没带押金，医生拒绝为病人办理住院手续，当病人家属拿来钱时，已错过了抢救最佳时机，病人死亡。本案例违背了病人权利的哪一点

- A、享有保密和隐私权
- B、享有参与治疗权
- C、享有基本的医疗权
- D、享有自主权
- E、享有知情同意权

【答案】C

() 17、患者1年前，运动时上前牙碰伤，当时有咬物疼痛，无其他不适，未治疗。以后发现牙冠变色，其原因可能为 ()

- A、色素沉着
- B、牙本质变性
- C、牙髓变性
- D、牙髓坏死
- E、以上都不是

【答案】D

() 18、颈淋巴触诊时病人的体位为

- A、坐位，两眼平视
- B、坐位，头低向前方和受检侧
- C、坐位，头略仰起
- D、平卧，头偏向健侧
- E、自由体位，肌肉放松

【答案】B

() 19、有关全身疾病与牙周炎，哪项是错误的 ()

- A、白血病患者可先于本病被诊断前到口腔科就诊
- B、艾滋病患者可患坏死性牙龈炎和牙周炎
- C、糖尿病型牙周炎与菌斑有关
- D、全身疾病可引起牙周病
- E、青春前期牙周炎常伴有全身疾患

【答案】D

() 20、以下属于牙源性上皮性肿瘤的为

- A、牙源性钙化上皮瘤、造釉细胞瘤、牙源性透明细胞瘤
- B、牙源性鳞状细胞瘤、牙源性腺样瘤、牙源性纤维瘤
- C、牙源性钙化上皮瘤、牙源性腺样瘤、牙源性纤维瘤
- D、牙源性钙化上皮瘤、造釉细胞瘤、牙源性纤维瘤
- E、牙瘤、造釉细胞瘤、牙源性透明细胞瘤

【答案】A

() 21、口底-囊性肿块，切片检查囊壁衬里为鳞状上皮，囊壁结缔组织中有少量慢性炎症细胞浸润，壁外可见少量散在黏液腺泡，应诊断为

- A、皮样囊肿
- B、黏液囊肿

- C、表皮样囊肿
- D、舌下囊肿
- E、淋巴水瘤

【答案】C

() 22、牙周炎的辅助诊断方法不包括 ()

- A、X线数字减影技术仪
- B、牙动度
- C、病理检查
- D、压力敏感探针
- E、微生物检查

【答案】C

() 23、可摘局部义齿的基牙数通常是指 ()

- A、没有基牙
- B、至少有两个或两个以上的基牙
- C、有一个或两个基牙
- D、必须有三个以上的基牙
- E、有两个或两个以下的基牙

【答案】B

() 24、唾液功能有 ()

- A、润滑和保护
- B、抗微生物
- C、缓冲作用
- D、机械清洁
- E、以上都是

【答案】E

() 25、全口义齿义齿固位力来源不包括 ()

- A、大气压力
- B、摩擦力
- C、附着力
- D、表面张力
- E、内聚力

【答案】B

- () 26、有关牙周袋的概念，错误的是 ()
- A、牙周袋包括假性牙周袋和真性牙周袋
 - B、牙周袋是病理性加深的龈沟
 - C、假性牙周袋因牙龈肿胀或增生所致
 - D、真性牙周袋是指 $\geq 6\text{mm}$ 的牙周袋
 - E、临床上的牙周袋既有龈缘向冠方延伸，也有沟底向根方延伸龈有无增生或肿胀

【答案】D

- () 27、关于磁性附着体在全口覆盖义齿中应用的描述，错误的是 ()
- A、增强下颌全口义齿的固位力，尤其是牙槽嵴吸收严重，常规修复方法效果差，口内又有少数余留牙或牙根者
 - B、提高咀嚼效率
 - C、显著缩短患者对义齿的适应时间
 - D、对共同就位道的要求高
 - E、可不使用或不暴露金属卡环，达到美观效果

【答案】D

- () 28、对放射线不敏感的肿瘤是 ()
- A、鳞状细胞癌
 - B、恶性淋巴瘤
 - C、腮腺腺癌
 - D、牙龈癌
 - E、上颌窦癌

【答案】C

- () 29、体现知情同意原则的是 ()
- A、受试者对人体实验过程及其后果应有一定的了解，其意愿和选择应当受到重视
 - B、第一株中国人胚胎干细胞系建系成功，使中国人成为少数几个拥有人胚胎干细胞的国家。该研究使一些不治之症如白血病等完全可以根治
 - C、耐心细致的宣传解释仍无法满足死者亲属的要求，这时尸检人员应放弃尸检
 - D、患者有权选择接受或拒绝医生制定的治疗方案
 - E、确定的医学科学研究的课题要与国家经济发展的实际和医学技术的实力相符合

【答案】D

- () 30、不属于糖尿病型牙周病的特征的为

- A、易发生牙周脓肿
- B、中性粒细胞趋化功能异常
- C、病变发展较快
- D、易有牙髓并发病变
- E、牙周手术愈合较差

【答案】D

() 31、女性，55岁。右耳垂下无痛性肿块逐渐缓慢长大6年。触诊肿块界线清楚，活动，约4cm×5cm大小，表面呈结节状，中等硬度，与皮肤无黏连。

最有意义的辅助检查是 ()

- A、唾液分泌量检查
- B、细针吸取细胞活检
- C、唾液成分化验
- D、唾液涂片检查
- E、切除活检

【答案】B

() 32、属于恒牙正常萌出顺序是

- A、上颌：6→1→3→4→2→5→7
- B、上颌：6→1→2→3→4→5→7
- C、上颌：6→1→2→4→5→3→7
- D、下颌：6→1→2→3→5→4→7
- E、以上都对

【答案】C

() 33、牙周外科手术常用的是 ()

- A、移骨术
- B、牙槽骨成形术
- C、牙槽骨切除术
- D、植骨术
- E、以上均不对

【答案】B

() 34、测量工作长度的方法中，哪一种方法是错误的 ()

- A、电测法

- B、X线片诊断法
- C、患者感觉法
- D、X线片测量法
- E、术者手感法

【答案】C

() 35、颈淋巴转移率最高，且早期转移的肿瘤是 ()

- A、牙龈癌
- B、颊癌
- C、舌癌
- D、上颌窦癌
- E、唇癌

【答案】C

() 36、关于颞下颌关节紊乱患者的正畸治疗，下列说法不正确的是

- A、常常以活动矫治器进行治疗
- B、对于关节弹响的处理方法，常以正畸手段前移下颌1~3mm
- C、对此类患者的治疗一定要达到完美的牙齿排列与咬合关系
- D、避免设计以下颌为支抗的矫形力
- E、慎用颌间牵引力

【答案】C

() 37、下列哪一项不会影响人工牙冠与基托的结合 ()

- A、人工牙冠与基托的充填时间相隔太久单体挥发
- B、填塞塑料时加压不足
- C、人工牙冠与基托之间有玻璃纸未去除
- D、人工牙冠与基托材料不是同一厂家所生产
- E、在关闭型盒前，在人工牙冠与基托之间加入单体溶胀

【答案】D

() 38、有关固定桥垂直向运动方式的错误说法是 ()

- A、多数基牙牙周膜纤维受到牵张力
- B、桥体跨度越大，对基牙牙周的损坏会越大
- C、复合固定桥的中间基牙受垂直向力时，会向牙槽内下沉，易使固位体与基牙脱离
- D、双端固定桥后基牙受垂直向加载时，会以根中1/3为支点发生旋转

E、均匀受力时，最利于固定桥的固位

【答案】D

() 39、常在替牙期用舌尖舔松动的乳牙，萌出的恒牙等，因而形成的习惯为

- A、舌习惯
- B、佝偻病
- C、下骯颌后缩畸形
- D、维生素A缺乏
- E、吮指习惯

【答案】A

() 40、固定一可摘联合义齿的适应证不包括 ()

- A、多个前牙缺失且牙槽嵴吸收较多者
- B、1或2个磨牙游离缺失者
- C、后牙缺失，一端或两端基牙有牙髓病变，经根管治疗后，若对其预后不能十分肯定者
- D、后牙缺失，两端基牙倾斜度较大，难以获得共同就位道者
- E、多个前牙缺失且牙槽嵴正常者

【答案】E

() 41、符合医学研究献身医学原则()

- A、1969年至1981年的12年间，年轻的心脏病研究者约翰·达西博士共编造假论文100篇以上
- B、由个人完成发明创造的时代，已经同爱迪生一去不复返了
- C、尸体解剖有利于医学的发展和总结医疗经验
- D、居里夫人把氯化镭包在自己的前臂上观察镭对人的皮肤的烧伤状况，表现了崇高的道德
- E、仅从个人兴趣或追逐个人利益出发选择研究课题是不道德的

【答案】D

() 42、萌出囊肿的发生是由于

- A、炎症刺激未萌牙冠部缩余釉上皮而致
- B、缩余釉上皮与牙釉质表面之间液体积聚而致
- C、成釉器星网状退变，液体潴留
- D、未萌牙或萌出牙附近口腔黏膜异常增生种植而致
- E、以上均是

【答案】B

() 43、下齿槽神经阻滞麻醉时发生面瘫的原因是

- A、注射入血管内
- B、注射点过前
- C、注射点过低
- D、注射点过后
- E、注射点过高

【答案】D

() 44、医学伦理学的实践性表现在()

- A、“普同一等”、“一视同仁”是古今中外医学共有的伦理观念
- B、医学伦理学的内容深刻反映时代的经济、社会要求和医学科学的发展和进步
- C、古代医者把尊重和保护病人的健康和生命作为自己的行为准则
- D、医学伦理学的思想内容是医学实践和科学进步提出的客观要求
- E、古代的医德规范今天仍然有规范医者的价值

【答案】D

() 45、下颌第一磨牙缺失，下颌第二磨牙松动Ⅱ°，以下颌第二前磨牙、第二磨牙为基牙，活动义齿修复，就位方向为

- A、垂直向
- B、旋转
- C、侧向
- D、由后向前
- E、由前向后

【答案】D

() 46、新生儿，左侧完全性唇、腭裂。

腭裂修复术后，语音功能恢复正常的必要条件是 ()

- A、牙列完整，咬合关系良好
- B、软腭活动度好
- C、咽后壁上派氏嵴明显
- D、腭垂外形正常
- E、发音时能形成良好的腭咽闭合

【答案】E

() 47、颌骨囊肿可见

- A、牙槽骨有虫蚀性吸收破坏，牙周腔隙增宽

- B、下颌角见骨质疏松脱钙，并有骨增生
- C、下颌骨体有大小不等的多房阴影
- D、下颌骨体有骨质破坏，并有死骨形成
- E、下颌骨内有单房透明阴影，四周有白色骨质线

【答案】E

- () 48、一位3岁患儿因急性菌痢住进医院，经治疗本已好转，即将出院。其父母觉得小儿虚弱，要求输血。碍于情面，医生同意了。可护士为了快点交班，提议给予静脉推注输血。当时病儿哭闹，医护齐动手给他输血，在输血过程中病儿突发心跳骤停死亡。此案例中医护人员的伦理过错是()
- A、无知，无原则，违背了有利患者的原则
 - B、无知，无原则，违背了人道主义原则
 - C、曲解家属自主权，违反操作规程，违背了有利患者的原则
 - D、曲解家属自主权，违反操作规程，违背了不伤害患者的原则
 - E、曲解家属自主权，违反操作规程，违背了人道主义原则

【答案】D

- () 49、汽油吹管火焰由内向外可分混合焰、燃烧焰、还原焰和氧化焰四层，其中温度最高的是()
- A、混合焰
 - B、燃烧焰
 - C、还原焰
 - D、氧化焰
 - E、燃烧焰和氧化焰

【答案】C

- () 50、不符合功能性矫治器原理的是
- A、人工施加的机械力
 - B、利用肌肉力影响牙齿和骨骼
 - C、吞咽时上下唇紧密闭合
 - D、选择性改变牙齿的萌出道
 - E、功能性矫治器对肌肉、牙槽和颌骨起不同的作用

【答案】A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/436113202142010120>