

结直肠科理论知识考核

一、判断题

1、吸烟、哮喘、肥胖和肺气肿是术后患者容易发生肺不张的重要因素。 [判断题] *

对✓

错

2、化疗药物系统给药包括口服、静脉注射、皮下注射及肌肉注射。 [判断题] *

对✓

错

3、在我国食管癌的病理以腺癌多见。 [判断题] *

对

错✓

4、肝癌术后患者应鼓励早下床活动，早进食。 [判断题] *

对✓

错

5、由于腹腔淋巴结与胸导管直接交通，故胃癌可转移至右锁骨上淋巴结。 [判断题] *

对

错✓

6、胰体尾癌患者突出的首发症状有腰背酸痛、腹痛、黄疸、上腹饱胀。 [判断题] *

对

错✓

7、现在的研究认为，结直肠癌的发病率与脂肪和红肉的摄入呈正相关。 [判断题] *

对✓

错

8、曲妥珠单抗是第一个针对 HER-2 阴性转移性乳腺癌患者进行癌基因靶向治疗的药物。 [判断题] *

对

错✓

9、牙龈癌肿瘤侵犯面神经，可出现下唇麻木。 [判断题] *

对

错✓

10、急性淋巴细胞白血病病人，若诊断时脑脊液正常， 无需行鞘内药物注射。 [判断题] *

对

错✓

11、神经母细胞瘤起源于交感神经节或双侧肾上腺。 [判断题] *

对✓

错

12、硝酸甘油为高血压急症治疗的首选药物。 [判断题] *

对

错✓

13、两种胰岛素合用时应先抽吸长效胰岛素再抽吸普通胰岛素。 [判断题] *

对

错✓

14、未开封的胰岛素放置冰箱 4~8℃冷藏保存，已开封的在常温下可使用 28 天。 [判断题] *

对✓

错

15、口腔黏膜炎厌氧菌感染应选择苏打水、制霉菌素溶液、氟康唑漱口。 [判断题] *

对

错✓

16、肠外营养液（PN）宜由医护人员在层流室或超净台内进行配置。 [判断题] *

对

错✓

17、护理文书书写应客观、真实、准确、及时、完整。 [判断题] *

对

错✓

18、一级护理：根据患者的病情，测量生命体征，随时观察患者病情变化，做好护理记录。 [判断题]

*

对✓

错

19、国内外现有研究对奥密克戎变异株认识：传播能力更强，传播速度更快，感染剂量更低，致病力减弱，具有更强的免疫逃逸能力。 [判断题] *

对✓

错

20、密切接触者“7+3”的管理方式指：7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测，“7+3”核酸检测频次为：集中隔离第1、2、3、5、7天，居家检测的第3天。 [判断题] *

对✓

错

二、单选题

1、患者下床活动时，胸腔引流瓶的位置应（ ）且保持平稳，保证长管没入液面下。[单选题] *

A.低于膝盖✓

B.低于腰部

C.低于大腿

D.夹闭引流管

2、最常伴发亚急性小脑变性的恶性肿瘤（ ）[单选题] *

A.卵巢癌✓

B.肺癌

C.小细胞肺癌

D.霍奇金病

3、甲地孕酮治疗恶病质常见的不良反应不包括：（ ）[单选题] *

A.静脉血栓

B.焦虑✓

C.外周水肿

D.肾上腺功能不足

4、（ ）压疮损伤到达真皮层[单选题] *

A.不可分期

B.Ⅰ期

C.Ⅱ期✓

D.Ⅲ期

5、下列哪项是世界卫生组织三级口腔黏膜炎的症状（ ）[单选题] *

A.口腔黏膜充血水肿、轻度疼痛

B.口腔黏膜充血水肿、点状溃疡

C.口腔黏膜充血水肿、片状溃疡，上覆白膜，疼痛加剧✓

D.口腔黏膜大面积溃疡，剧痛，张口困难

6、以下说法错误的是（ ）[单选题] *

A.发热是感染患者最容易识别的症状

B.肺部是感染的好发部位

C.体温变化是粒细胞减少患者发生感染的主要体征

D.引起肿瘤患者感染的主要病原菌主要来源于肺部✓

7、不属于阿片类药物副反应的是：（ ）[单选题] *

A.便秘

B.精神依赖✓

C.恶心呕吐

D.嗜睡

8、护士在发给心衰患者地高辛之前，应先数心率，若心率少于多少次则不能给药（ ）[单选题] *

A.100 次 / min

B.90 次 / min

C.80 次 / min

D.70 次 / min

E.60 次 / min✓

9、频发室性期前收缩是指期前收缩的次数每分钟至少出现（ ）[单选题] *

A.3 次以上

B.5 次以上✓

C.8 次以上

D.10 次以上

E.15 次以上

10、室性早搏的心电图表现下列哪项错误（ ）[单选题] *

A.提前发生的 QRS 波群

B.QRS 波前无 P 波✓

C.QRS 波形态异常

D.T 波与主波方向相反

E.有完全性代偿间歇

11、房颤发生后易引起哪种合并症（ ）[单选题] *

A.严重心力衰竭

B.心源性休克

C.体循环动脉栓塞✓

D.神志模糊, 抽搐

E.肺栓塞

12、胰岛素使用时应除外哪一项（ ）[单选题] *

A.餐前 15 ~ 30min 注射

B.皮下注射

C.计量准确

D.每次更换注射部位

E.肌肉注射✓

13、糖尿病病人血糖已经控制后，进食水果适宜的是（ ）[单选题] *

A.餐前半小时

B.两餐间✓

C.餐后半小时

D.任何时间均不宜进食水果

E.随餐食用

14、糖尿病病人出现周围神经病变时，表现为（ ）[单选题] *

A.对称性肢端感觉异常✓

B.排汗异常

C.体位性低血压

D.腹泻或便秘

E.眩晕、乏力

15、下列哪项不是低血糖反应的表现（ ）[单选题] *

A.饥饿感

B.高热✓

C.心悸

D.软弱、出汗

E.面色苍白

16、高血压病分期标准，最主要的依据是（ ）[单选题] *

A.病程长短

B.血压增高程度

C.症状轻重

D.心、脑、肾损伤及功能代偿情况✓

E.血压能否降至正常

17、高血压脑病指的是（ ）[单选题] *

A.血压过高引起的头痛✓

B.脑血管破裂出血

C.脑血栓形成

D.普遍而剧烈的脑血管痉挛引起脑水肿 E.肢体偏瘫，失语不可恢复

18、1999 年 WHO 建议根据血压增高的水平可进一步将高血压分为 1、2、3 级，其中 2 级高血压的标准为（ ）[单选题] *

A.收缩压 140 ~ 149 mmHg，舒张压 <90 mmHg

B.收缩压 140 ~ 159 mmHg，舒张压 90 ~ 99 mmHg

C.收缩压 140 ~ 149 mmHg，舒张压 90 ~ 94 mmHg

D.收缩压 160 ~ 179 mmHg，舒张压 100 ~ 109 mmHg✓

E.收缩压 140 ~ 149 mmHg，舒张压 90 ~ 99 mmHg

19、枕骨大孔疝最多见于哪个部位的肿瘤（ ）[单选题] *

A.额叶肿瘤

B.顶叶肿瘤

C.颞叶肿瘤

D.小脑肿瘤✓

20、不能用于诊断垂体瘤的临床表现为（ ）[单选题] *

- A.头痛
- B.视野缺损
- C.内分泌紊乱
- D.耳聋、耳鸣✓

21、长期口服二甲双胍的患者，行介入治疗前，需停药二甲双胍（ ）以上，方可行术前对比剂过敏试验

（即：碘过敏试验）。[单选题] *

- A.12h
- B.24h
- C.48h✓
- D.72h

22、恶性骨肿瘤最主要的确诊依据是（ ）[单选题] *

- A.临床表现有明显的体征
- B.影像学检查
- C.化验检查
- D.病理组织学检查✓

23、儿童骨肉瘤最常见的原发部位是（ ）[单选题] *

- A.股骨远端✓
- B.胫骨近端
- C.肱骨远端
- D.骨盆

24、化疗引起的延缓性恶心、呕吐发生时间为（ ）[单选题] *

- A.化疗 6h 以后

B.化疗 8h 以后

C.化疗 12h 后

D.化疗 24h 后✓

25、下列血制品中制备后保存期只有 24h 的是 () [单选题] *

A.浓缩红细胞

B.照射血小板

C.新鲜冰冻血浆

D.洗涤红细胞✓

26、输血过程中病人出现腰背疼痛、腹痛、胸前压迫感、呼吸困难、发绀、血红蛋白尿等症状，考虑发生的输血反应为 () [单选题] *

A.过敏反应

B.溶血反应✓

C.输血相关性移植物抗宿主病

D.输血相关的急性肺损伤

27、() 通过抑制拓扑异构酶 I 的活性而阻止 DNA 的复制，作用于 S 期[单选题] *

A.伊立替康✓

B.长春新碱

C.鬼臼乙叉甙

D.阿糖胞苷

28、下列容易引起消化道溃疡、水钠潴留、库兴氏综合征的药物是 () [单选题] *

A.卡莫司汀

B.长春新碱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/436142042033010044>