

2025 年助理医师资格证考试之口腔助理医师自我检测试卷 A 卷附答案

单选题（共 180 题）

1、面对威胁性的应激源，通过各种适当的心理和行为对策消除或缓解个体的紧张状态，称为

- A. 应对
- B. 解脱
- C. 激励
- D. 回避
- E. 超脱

【答案】 A

2、根据《医疗事故处理条例》规定，关于医疗事故技术鉴定专家组产生的说法错误的是

- A. 参加医疗事故技术鉴定的专家是医疗事故争议当事人的须回避
- B. 参加医疗事故技术鉴定的专家与医疗事故争议有利害关系的须回避
- C. 专家库的专家应担任相应专业高级技术职务三年以上
- D. 专家库的专家只能是本行政区域的
- E. 专家库的专家应具有良好的业务素质 and 职业品德

【答案】 D

3、患者男性，36 岁。右侧下颌区无痛性肿胀逐渐加重八月，无疼痛及麻木感。检查见面部不对称，右侧下颌区膨隆，范围累及

- A. 颌骨骨肉瘤
- B. 颌骨骨髓炎

- C. 成釉细胞瘤
- D. 颌骨中心性癌
- E. 角化囊肿

【答案】 C

4、基础治疗后患牙牙周袋 5mm，应做

- A. 牙龈切除术
- B. 翻瓣术
- C. 洁治术
- D. 刮治术
- E. 根面平整术

【答案】 B

5、某妇女下腹部疼痛，阴道有大量黄色、无血、无气味的分泌物，1 周前曾做过经阴道结扎术。检查时，从阴道后穹隆穿刺，得 20ml 带血、恶臭的脓性物，厌氧培养出革兰阴性杆菌。请问该化脓感染的病原体可能是下列哪项

- A. 大肠埃希菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 变形杆菌
- D. 脆弱类杆菌 4
- E. 肉毒梭菌

【答案】 D

6、正常龈沟的深度是

- A. $\leq 0.5\text{mm}$

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

B. $\leq 1\text{mm}$

C. $\leq 2\text{mm}$

D. $2\sim 3\text{mm}$

E. $\leq 3\text{mm}$

【答案】 D

7、支托具有以下作用，除了

A. 支持作用

B. 作间接固位体

C. 防止食物嵌塞

D. 固位作用

E. 恢复咬合接触

【答案】 D

8、某女性患者，36岁，右上后牙持续胀痛周，伴右侧头痛。口腔检查可见右侧后牙无龋坏和充填物，右上后牙叩痛(+~++)，晨起头痛重，伴有鼻塞和流脓鼻涕症状。

A. 急性牙髓炎

B. 三叉神经痛

C. 急性上颌窦炎

D. 急性中耳炎

E. 急性根尖炎

【答案】 C

9、患者，56 岁。无牙颌，义齿戴用 7 年，自觉咀嚼不力，面显苍老。其原因是

- A. 垂直距离过高
- B. 垂直距离过低
- C. 咬合不平衡
- D. 下颌前伸
- E. 义齿固位差

【答案】 B

10、深龋的垫底材料不应选用

- A. 氢氧化钙制剂
- B. 磷酸锌黏固粉
- C. 聚羧酸锌黏固粉
- D. 玻璃离子水门汀
- E. 氧化锌丁香油黏固粉

【答案】 B

11、牙面可见白色不透明区不规则分布，不超过唇面的 25%，按 Dean 氟牙症分类记分为

- A. 0.5
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

【答案】 B

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

12、对逆行性牙髓炎的患者进行探诊检查时，对诊断最有帮助的是

- A. 发现釉突
- B. 牙周袋溢脓
- C. 深牙周袋
- D. 有龈下牙石
- E. 探诊后出血

【答案】 C

13、蛋白质变性

- A. 饥饿
- B. 熟食比生食易消化
- C. 肠梗阻
- D. 氮负平衡
- E. 高脂血症

【答案】 B

14、按照牙体形态特点及功能特性，人类牙体可以分为

- A. 上颌牙体与下颌牙体
- B. 前牙和后牙
- C. 正常牙体与多生牙
- D. 切牙、尖牙、前磨牙、磨牙
- E. 乳牙与恒牙

【答案】 D

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

15、下面哪个因素不属于颌位关系记录的内容

- A. 唇侧丰满度
- B.
- C. 垂直颌位关系
- D. 前伸髁道斜度
- E. 水平颌位关系

【答案】 D

16、一青年患者经去骨、劈开拔除右下近中阻生智牙。4 天后出现持续性剧痛，并向耳颞部放散，检查见拔牙窝空虚，牙槽骨壁表面有灰白色假膜覆盖。最可能的诊断是

- A. 牙槽突骨折
- B. 拔牙后正常反应
- C. 干槽症
- D. 邻牙在拔牙时受到损伤
- E. 邻牙急性根尖炎

【答案】 C

17、下列哪种疾病属于癌前期病变

- A. 白皱褶病
- B. 白色角化症
- C. 均质型白斑
- D. 结核性溃疡
- E. 白色水肿

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

【答案】 C

18、下列药物可导致牙龈增生，除了

- A. 环孢菌素
- B. 苯妥英钠
- C. 异山梨酯
- D. 维拉帕米
- E. 硝苯地平

【答案】 C

19、舌杆的厚度一般为

- A. 0.5mm
- B. 1mm
- C. 2～3mm
- D. 3.5～4mm
- E. >4mm

【答案】 C

20、关于专题小组访谈，描述正确的是

- A. 不需要主持人
- B. 需要的时间长、费用高
- C. 用于快速需求评估
- D. 适合讨论非常敏感的主题
- E. 是一种定量研究的方法

【答案】 C

21、某著名专家是医疗事故技术鉴定专家库成员，在一起医疗事故鉴定案中，被随机抽取为专家鉴定组成员。但该专家以书面形式向医学会申请回避。能被医学会批准回避的理由是

- A. 系当事人近亲属
- B. 家中有事
- C. 单位不同意请假
- D. 因公出差
- E. 本人不愿意

【答案】 A

22、采用单纯外固定法治疗下颌骨体部骨折时，通常的颌间固定时间为

- A. 2～3 周
- B. 3 周
- C. 4 周
- D. 8 周
- E. 10 周

【答案】 C

23、男性，35 岁。右上第一磨牙牙髓治疗后劈裂，拔牙过程中牙冠碎裂至龈下，牙根与周围骨质粘连。

- A. 牙挺取根
- B. 牙钳拔除
- C. 分根后拔除

D. 翻瓣去骨拔除

E. 涡轮钻拔除

【答案】 C

24、水氟浓度的最适宜值是

A. 0.8mg/L

B. 0.9mg/L

C. 1.0mg/L

D. 1.1mg/L

E. 1.2mg/L

【答案】 C

25、描述性口腔流行病学最常用的方法是

A. 横断面调查

B. 纵向调查

C. 历史资料分析

D. 社区干预试验

E. 群组研究

【答案】 A

26、某患儿，6岁，先天性唇腭裂术后，伴牙槽突裂，什么时间修复牙槽裂最适宜

A. 6岁

B. 7~8岁

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

- C. 9~11 岁
- D. 12~14 岁
- E. 16 岁以后

【答案】 C

27、女性，35 岁。

- A.
- B. 正畸关闭
- C. 先光敏树脂关闭
- D. 可摘局部义齿修复缺牙及牙间隙
- E.

【答案】 B

28、造血系统疾病患者，拔牙时下列哪项是错误的

- A. 贫血患者，血红蛋白在 60g/L 以上，可考虑拔牙
- B. 急性白血病为拔牙禁忌证
- C. 血友病拔牙，应补充凝血因子
- D. 原发性血小板减少性紫癜急性型不可拔牙
- E. 慢性白血病拔牙时应与专科医生合作

【答案】 A

29、腭裂术后的饮食要求为

- A. 术后半流食
- B. 术后流食，1 周后改半流食

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

- C. 术后流食 1~2 周，半流食 1 周，2~3 周后可进普食
- D. 术后 2 周可进普食
- E. 术后 1 周禁食，静脉补给能量

【答案】 C

30、用实验方法对记忆进行研究，揭示了遗忘规律的学者为

- A. 美国心理学家华生
- B. 德国心理学家冯特
- C. 德国心理学家艾宾浩斯
- D. 美国心理学家斯金纳
- E. 俄国生理学家巴甫洛夫

【答案】 C

31、Kennedy Ⅱ类牙列缺失者，当余留牙情况较差时，通常设计为

- A. 牙支持式
- B. 黏膜支持式
- C. 混合支持式
- D. 牙支持式或混合支持式
- E. 牙支持式或黏膜支持式

【答案】 B

32、既抑制胃酸分泌又抗幽门螺杆菌的药物是

- A. 雷尼替丁
- B. 甲硝唑

君子忧道不忧贫。——孔丘

- C. 阿托品
- D. 奥美拉唑
- E. 西咪替丁

【答案】 D

33、医生白某因挪用公款用于个人经营，被判有期徒刑 1 年

- A. 暂停执业活动 2 年
- B. 在监管部门规定范围内执业
- C. 服刑期满可再执业
- D. 终止医师执业活动
- E. 其执业可以不受限制

【答案】 D

34、后退接触位形成的主要机制是

- A. 颞下颌关节韧带的可让性
- B. 髁状突在关节窝中的位置
- C. 咬合关系
- D. 升颌肌的牵张反射
- E. 覆牙合与覆盖

【答案】 A

35、牙髓细胞指的是

- A. 成牙本质细胞
- B. 成纤维细胞

- C. 未分化间充质细胞
- D. 淋巴细胞
- E. 树突状细胞

【答案】 B

36、某男性患者，55 岁。经涎腺专家门诊以“右多形性腺瘤”收入院。以下所述与此诊断无关的是

- A. 患者有 20 年大量吸烟史
- B. 肿物增大缓慢
- C. 右侧腮腺表面均可触及结节状、质硬肿物
- D. 肿物活动度较好
- E. 该肿瘤女性发病率高于男性

【答案】 A

37、氯丙嗪有镇吐作用，可用于多种原因所致呕吐，但须除外下列哪项

- A. 胃肠炎
- B. 顽固性呃逆
- C. 晕动病
- D. 恶性肿瘤
- E. 放射病

【答案】 C

38、最能体现保护患者隐私准则的是

- A. 医师为患者选用疗效相当但价格低廉的药物

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

- B. 医师为患者提供完全、真实的信息，供其选择表态
- C. 医师使用艾滋病患者病情资料时，应作隐去姓名等处理
- D. 医师诊断时应考虑患者的各方面因素
- E. 医师治疗时应努力使患者受益

【答案】 C

39、患者根据侵权责任法第 61 条要求查阅复制病历资料时，医疗机构：

- A. 可以提供
- B. 可以不提供
- C. 应当不提供
- D. 应当提供

【答案】 D

40、痛觉感受器为（ ）。

- A. Meckel 环形小体
- B. 克劳斯终球
- C. 鲁菲尼小体
- D. 游离神经末梢
- E. Meissner 触觉小体

【答案】 D

41、洗必泰抗菌作用机制不包括

- A. 使唾液糖蛋白对牙面的吸附能力减弱，抑制获得性膜和菌斑的形成
- B. 减少了唾液中能吸附到牙面上的细菌数

- C. 改变菌斑细菌的内聚力，控制细菌的聚集和对牙面的吸附
- D. 可抑制细菌产酸，减少龋病的发生
- E. 与牙面釉质结合，阻碍唾液细菌对牙面的吸附

【答案】 D

42、苯海拉明不具备的药理作用是

- A. 镇静
- B. 止吐
- C. 抗过敏
- D. 减少胃酸分泌
- E. 催眠

【答案】 D

43、进行口腔健康促进的全民途径是

- A. 乳牙龋充填
- B. 控烟、戒酒
- C. 对有深窝沟的儿童进行窝沟封闭防龋
- D. 自来水氟化防龋
- E. 老年人牙齿脱敏

【答案】 D

44、不属于年轻恒牙牙髓特点的有

- A. 组织疏松
- B. 血运丰富

- C. 防御修复能力强
- D. 渗出作用强
- E. 增生现象显著

【答案】 D

45、新生儿，右侧完全性唇、腭裂。

- A. 唇裂修复术
- B. 腭裂修复术
- C. 牙槽突裂植骨术
- D. 新生儿正畸
- E. 颌骨正畸术

【答案】 A

46、甲硝唑最常见的不良反应是

- A. 腹痛
- B. 呕吐
- C. 口腔金属味
- D. 腹泻
- E. 厌食

【答案】 C

47、国家实行特殊管理的药品不包括

- A. 麻醉药品
- B. 放射性药品

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

- C. 疫苗
- D. 医疗用毒性药品
- E. 精神药品

【答案】 C

48、上皮根鞘连续性破坏形成（ ）。

- A. 福代斯斑
- B. 牙源性囊肿
- C. 上皮剩余
- D. 侧支根管
- E. 牙颈部牙本质敏感症

【答案】 D

49、就病因角度而言，龋病也可称为牙体硬组织的

- A. 病毒感染性疾病
- B. 细菌感染性疾病
- C. 真菌感染性疾病
- D. 支原体感染性疾病
- E. 衣原体感染性疾病

【答案】 B

50、患儿，男性，2岁，感冒发热2天后，口腔溃疡3天，求治。检查：全口牙龈红肿，上腭及舌背黏膜可见成簇的针头大小的透明水疱，部分已破溃为浅表溃疡。

- A. 鹅口疮

- B. 疱疹性龈口炎
- C. 口炎型口疮
- D. 带状疱疹
- E. 急性坏死性龈口炎

【答案】 B

51、上皮异常增生常见于（ ）。

- A. 白斑
- B. 口腔扁平苔藓
- C. 天疱疮
- D. 含牙囊肿
- E. 牙源性角化囊肿

【答案】 A

52、颌骨囊肿 X 线表现为

- A. 下颌骨体有大小不等的多房阴影
- B. 下颌骨内有单房阴影，四周有白色骨质线
- C. 颌骨内虫蚀状骨质破坏区，牙周骨质可有破坏
- D. 下颌角见骨质疏松脱钙，并有骨增生
- E. 下颌骨体有骨质破坏，并有死骨形成

【答案】 B

53、48 岁，白带多，接触出血半年。妇科检查：宫颈糜烂状，阴道外观正常，子宫正常大小、双侧附件区无明显增厚。首选确诊检查是

- A. 宫颈锥切术
- B. 宫颈和宫颈管活检
- C. 宫颈涂片检查
- D. 阴道镜检
- E. 宫颈荧光检查

【答案】 B

54、患者，男，发现右下颌下区肿物 3 个月。临床检查：右下颌下区表面皮肤正常，可触及肿物，质软、无压痛，低头时肿物稍有增大，口内检查亦未见异常。手术中见囊肿内流出黏稠而略带黄色蛋清样液体。

- A. B 超检查
- B. 舌下腺造影
- C. 下颌下腺造影
- D. 囊肿穿刺检查
- E. CT 检查

【答案】 D

55、上颌义齿边界解剖标志包括

- A. 上颌前庭黏膜反折皱襞
- B. 腭小凹后 2mm
- C. 翼上颌切迹
- D. 以上都对
- E. 以上都不对

【答案】 D

56、世界卫生组织规定的龋病患病水平的衡量标准是

- A. 人群龋病的患病率
- B. 5 岁儿童的无龋率
- C. 12 岁儿童的龋均
- D. 12 岁儿童的龋面均
- E. 中老年人的根龋指数

【答案】 C

57、患者，女，7 岁，因颈正中部肿物来院求治。查体见肿物位于舌骨下部，质软，界清，与表面皮肤及周围组织无粘连。肿物可以随吞咽动作而上、下活动。穿刺液为微浑浊的黄色黏稠液。最有可能的诊断是

- A. 鳃裂囊肿
- B. 囊性水瘤
- C. 神经鞘瘤
- D. 甲状舌管囊肿
- E. 皮样囊肿

【答案】 D

58、龋齿按病变程度的分类为

- A. 开放龋和隐匿龋
- B. 浅龋、中龋和深龋
- C. 原发性龋和继发性龋
- D.
- E. 急性、慢性和静止性龋

【答案】 B

59、将蛋白质溶液的 pH 调节到其等电点时

- A. 可使蛋白质稳定性增加
- B. 可使蛋白质表面的净电荷不变
- C. 可使蛋白质表面的净电荷增加
- D. 可使蛋白质稳定性降低，易于析出
- E. 对蛋白质表面水化膜无影响

【答案】 D

60、多根牙牙周膜面积以何处最大

- A. 根分叉处
- B. 根中 1/3 处
- C. 根上 1/3 处
- D. 根尖 1/3 处
- E. 以上都不是

【答案】 A

61、患者，女，29 岁，来门诊咨询比较适合自己的刷牙方法，医生为她推荐一种有效的清除牙龈缘附近及龈沟内菌斑的刷牙方法

- A. 平刷牙法
- B. 旋转刷牙法
- C. 巴斯刷牙法
- D. 改良的 Stillman 刷牙法
- E. Fones 刷牙法

【答案】 C

62、患者，女性，56岁。头痛，头晕2个月，并有时心悸，经检查：血压24/14.6kPa，并有窦性心动过速，最好选用哪种治疗方案

- A. 氢氯噻嗪+普萘洛尔
- B. 氢氯噻嗪+可乐定
- C. 硝苯地平+肼屈嗪
- D. 硝苯地平+哌唑嗪
- E. 卡托普利+肼屈嗪

【答案】 A

63、不属于影响环境污染物对健康损害的因素是

- A. 联合作用
- B. 作用时间
- C. 气象条件
- D. 剂量
- E. 个体感受性差异

【答案】 C

64、舌损伤缝合时下列哪项不符合要求

- A. 进针要深些
- B. 采用小针细线缝合
- C. 距创缘稍远进针
- D. 最好加用褥式缝合

E. 尽量保持舌的长度

【答案】 B

65、某农药厂灌装车间发生 5 位工人集体中毒事件，主要临床表现为：眼痛、流泪、手部有瘙痒、烧灼等异常感觉；2 例严重病例有呼吸困难、流涎、腹痛和轻度意识障碍。现场调查结果：车间无通风排毒设备，工人均未戴防护手套和口罩，中午均在食堂集体就餐。

A. 有机磷农药

B. 氨基甲酸酯类农药

C. 拟除虫菊酯类农药

D. 有机氯与拟除虫菊酯混配农药

E. 化学性食物中毒

【答案】 C

66、牙石形成的时间

A. 1～2 小时

B. 12 小时左右

C. 7 天

D. 12 天左右

E. 10～30 天

【答案】 D

67、全口义齿排牙时，后牙与 堤平面接触的牙尖是

A. 54|45 颊舌尖，6|6 近中舌尖

B. 45|45 颊舌尖，6|6 近中舌尖

- C. 54|45 颊尖，6|6 近中颊尖
- D. 4|4 颊尖，5|5 颊舌尖，6|6 近中舌尖
- E. 4|4 颊尖，5|5 颊尖，6|6 近中舌尖

【答案】 D

68、下列不属于窝洞抗力形的是

- A. 盒状洞形
- B. 窝洞的外形
- C. 倒凹
- D. 阶梯
- E. 洞深

【答案】 C

69、以下不利于钙吸收的因素是

- A. 草酸
- B. 乳酸
- C. 氨基酸
- D. 1，25-(OH)
- E. 蛋白质

【答案】 A

70、年轻恒牙冠髓切断术常用药物是

- A. 氢氧化钙糊剂
- B. 氧化锌丁香油糊剂

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

- C. 戊二醛
- D. 甲醛甲酚
- E. 碘仿

【答案】 A

71、符合桩冠的适应证是

- A. 根管壁侧穿
- B. 已作根管治疗，瘘管口未闭
- C. 作固定义齿基牙的残冠残根
- D. 前牙斜折达根中 1 / 3 者
- E. 根管弯曲细小

【答案】 C

72、患者，女性，43 岁，主诉左上后牙自发痛 2 天，喝冷水可缓解。现怀疑左上第一磨牙急性牙髓炎，进行温度测试时，应先检查

- A. 左上第一磨牙
- B. 右上第一磨牙
- C. 左上第二磨牙
- D. 左上第一前磨牙
- E. 左下第一磨牙

【答案】 B

73、新生儿“鹅口疮”实质上是

- A. 新生儿创伤性溃疡

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

- B. 复发性口腔溃疡
- C. 单纯疱疹病毒感染
- D. 白色念珠菌感染
- E. 球菌性口炎

【答案】 D

74、目前评价营养状况最普遍和最重要的方法是

- A. 上臂肌围
- B. 体重
- C. 身高和体重
- D. 体重质数
- E. 皮皱厚度

【答案】 D

75、女，25岁。扁桃体炎，注射青霉素后1分钟，呼吸急促、紫绀。心率130次/分钟，血压65/40mmHg。抢救药物是

- A. 肾上腺素+地塞米松
- B. 去甲肾上腺素+地塞米松
- C. 异丙肾上腺素+地塞米松
- D. 山莨菪碱+地塞米松
- E. 阿托品+地塞米松

【答案】 A

76、关于糖原合成的错误说法是

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

- A. 从 G-1-P 合成糖原要消耗高能磷酸键
- B. 由 α -1, 4-葡萄糖苷酶催化形成分支
- C. 葡萄糖的供体是 UDPG
- D. 葡萄糖基加到糖链末端葡萄糖的
- E. 糖原合成过程中有焦磷酸生成

【答案】 B

77、活动修复至少应在拔牙后多长时间时行

- A. 1 周
- B. 1 个月
- C. 3 个月
- D. 3~4 个月
- E. 5~6 个月

【答案】 C

78、下列关于蛋白质三级结构的叙述，错误的是

- A. 亲水基团在分子表面，疏水基团朝向分子内部
- B. 它是蛋白质的最小共价单位
- C. 它是在二级结构基础上再进行卷曲、折叠、盘绕而构成的
- D. 整个分子比较松散
- E. 三级结构中可能既包含 α -螺旋构象，也包含 β -折叠结构

【答案】 D

79、患儿，10 岁。上颌前牙碰伤两小时。查：

- A. 间接盖髓术
- B. 直接盖髓术
- C. 根管治疗
- D. 光固化修复
- E. 活髓切断术

【答案】 D

80、某患者右下阻生智齿反复肿痛 1 年余。1 周来右面下部出现肿胀伴开口受限。X 线片示 48 近中阻生，下颌升支弥漫性密度增高，升支外侧皮质无明显破坏，但密质骨外侧有骨质增生。可能的诊断为

- A. 牙源性中央性颌骨骨髓炎
- B. 牙源性边缘性颌骨骨髓炎
- C. 骨纤维异常增生症
- D. 颌骨结核
- E. 成骨肉瘤

【答案】 B

81、患者，16 岁。颌下舌骨前见 3cm×3cm 肿块，界限清，呈圆球形，与周围组织无粘连，可活动，质地柔韧似面团样感觉，无触痛，自颌下扪压肿物不缩小而向舌下突起，吞咽时肿物不上下移动。最可能的诊断是

- A. 甲状舌管囊肿
- B. 海绵状血管瘤
- C. 舌异位甲状腺
- D. 皮样囊肿
- E. 脂肪瘤

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

【答案】 D

82、患者，男，63岁。18、17、16、15缺失。为了减小义齿游离鞍基水平向的移动，不正确的设计是

- A. 扩大鞍基面积
- B. 选用牙尖斜度大的人工牙
- C. 缺失区对侧应用设计间接固位体
- D. 末端基牙设计 RPI 卡环组，减小基牙扭力
- E. 应用双侧联合设计

【答案】 B

83、最有助于检查牙隐裂的检查方法是

- A. 视诊
- B. 探诊
- C. 叩诊
- D. 碘酒染色法
- E. X线片

【答案】 D

84、食物的切割是如何实现的

- A. 牙齿所有牙合面接触
- B. 后牙颊尖接触
- C. 前牙对刃咬合
- D. 前牙切咬运动

E. 前牙正中咬合

【答案】 D

85、吞咽活动为位于延髓网状结构内的吞咽中枢所控制，由一具有调节吞咽活动且相互联络的神经细胞群所构成。当刺激软腭、会厌、咽后壁后，神经冲动传至延髓网状结构内的吞咽中枢。是哪一组神经核的轴突组成的神经支配与吞咽有关的肌肉完成吞咽

- A. 三叉神经运动核+疑核+迷走神经背核
- B. 三叉神经运动核+疑核+舌下神经核
- C. 三叉神经运动核+面神经核+舌下神经核
- D. 三叉神经运动核+面神经核+疑核+舌下神经核
- E. 面神经核+疑核+舌下神经核+迷走神经背核

【答案】 D

86、右下游离缺失最后一个牙往近中倾斜放什么卡环？（ ）

- A. 回力卡环
- B. RPI 卡环
- C. 圈形卡环
- D. 联合卡环
- E. 延长卡环

【答案】 C

87、一牧区青年，20 岁。饮食以肉类为主，平日反复牙龈出血、鼻出血、皮下出血。

- A. 硫酸亚铁制剂，口服

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

- B. 维生素 B，肌内注射
- C. 维生素 K，肌内注射
- D. 维生素 C 制剂 200~400mg/d
- E. 柠檬酸铁与叶酸同时补充

【答案】 D

88、以下不属于中效消毒剂的是

- A. 超声波
- B. 碘类消毒剂
- C. 臭氧
- D. 醇类消毒剂
- E. 酚类消毒剂

【答案】 C

89、牙面可见白色不透明区不规则分布，不超过唇面的 25%，按 Dean 氟牙症分类记分为（ ）。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

【答案】 B

90、合成脂肪酸时，其原料乙酰 CoA 是由

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/436150215234011031>