

2024 年贵州省《执业药师之西药学专业二》 考试必背 200 题题库大全（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是（）

- A: 普适泰
- B: 特拉唑嗪
- C: 十一酸睾酮
- D: 非那雄胺

答案：A

2. 下列药物中，属于抗乙型肝炎病毒的药物是（）

- A: 喷昔洛韦
- B: 阿德福韦酯
- C: 奥司他韦
- D: 齐多夫定

答案：B

3. （2017 年真题）夜盲症可以使用的治疗药物是（）

- A: 维生素 D
- B: 维生素 A
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 B1

答案：B

4. 与碳酸氢钠等碱性药物并用，能引起尿液及粪便变色的是

A: 聚乙二醇 4000

B: 乳果糖

C: 酚酞

D: 开塞露

答案：C

5. 外用的增色素药分为 4 类，不包括

A: 煤焦油类

B: 肾上腺皮质激素类

C: 重金属元素及其化合物

D: 补骨脂素及其衍生物

答案：A

6. 属于钙通道阻滞剂，静脉注射用于终止阵发性室上性心动过速的是
()

A: 普鲁卡因胺

B: 维拉帕米

C: 利多卡因

D: 苯妥英钠

答案：B

7. 不属于减鼻充血药的是 ()

A: 羟甲唑啉

B: 麻黄碱

C: 色甘酸钠

D: 伪麻黄碱

答案：C

8. 氟他胺适用于治疗()。

- A: 晚期前列腺癌
- B: 急性淋巴细胞白血病
- C: 晚期睾丸肿瘤
- D: 绒毛膜上皮癌

答案：A

9. 支原体、衣原体引起的肺炎宜选用()

- A: 阿奇霉素
- B: 氟康唑
- C: 克林霉素
- D: 万古霉素

答案：A

10. 可拮抗维生素 B6 或增加维生素 B6 经肾脏排泄，引起贫血或周围神经炎的是

- A: 糖皮质激素
- B: 雌激素
- C: 异烟肼
- D: 丙磺舒

答案：C

11. 淋巴细胞白血病采用

- A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- B: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- C: 糖皮质激素大剂量冲击疗法
- D: 糖皮质激素小剂量代替疗法

答案：A

12. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

- A: 特拉唑嗪
- B: 坦洛辛
- C: 酚苄明
- D: 乙酰唑胺

答案：B

13. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

- A: 他莫昔芬
- B: 依西美坦
- C: 来曲唑
- D: 氟维司群

答案：A

14. 主要抑制排卵的短效口服避孕药是()

- A: 复方炔诺酮
- B: 炔诺酮
- C: 丙酸睾酮
- D: 苯丙酸诺龙

答案：A

15. 属于嘌呤类抗代谢类药物的是()

- A: 长春瑞滨
- B: 吉西他滨
- C: 巯嘌呤

D: 甲氨蝶呤

答案: C

16. 所有诊断为冠心病的患者均应长期服用阿司匹林，剂量为每日

A: 10~25mg

B: 75~150mg

C: 150~300mg

D: 25~50mg

答案: B

17. 以多酶或辅酶形式参与体内新陈代谢及重要的生化反应的是

A: 维生素

B: 果糖

C: 葡萄糖

D: 脂肪乳

答案: A

18. (2016 年真题) 服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血，需同时联合使用的药品是

A: 依诺肝素

B: 维生素 B1

C: 维生素 B2

D: 维生素 B12

答案: D

19. 下列哪种疼痛不用吗啡治疗

A: 癌性剧痛

B: 神经压迫性疼痛

C: 急性锐痛

D: 胆绞痛及肾绞痛

答案: B

20. 利福平可促进雌激素的代谢或减少其肠肝循环，降低口服避孕药的作用，导致月经不规则，月经间期出血和计划外妊娠。所以，患者服用利福平时，应改用其他避孕方法。

A: 药理作用拮抗

B: 后者血药浓度下降，药效降低

C: 不良反应叠加

D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案: B

21. (2018 年真题) 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是 ()

A: 茶碱

B: 孟鲁司特

C: 噻托溴铵

D: 沙美特罗

答案: D

22. 抑制平滑肌 Ca^{2+} 进入血管平滑肌细胞内，能明显舒张血管的降压药是 ()

A: 美托洛尔

B: 氢氯噻嗪

C: 硝苯地平

D: 利血平

答案: C

23. 可引起前庭功能失调（眩晕）的抗菌药物是

- A: 甲硝唑
- B: 米诺环素
- C: 哌拉西林
- D: 左氧氟沙星

答案：B

24. 下述种类的利尿药中，利尿作用最强的是

- A: 噻嗪类利尿剂
- B: 留钾利尿剂
- C: 袂利尿剂
- D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：C

25. 可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是

- A: 克林霉素
- B: 阿达帕林
- C: 异维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案：C

26. 属于第二代喹诺酮类药物的是

- A: 萘啶酸
- B: 诺氟沙星
- C: 吡哌酸
- D: 莫西沙星

答案：C

27. 可用维生素 B6 防治的异烟肼的不良反是

- A: 过敏反应
- B: 肝损伤
- C: 胃肠道反应
- D: 周围神经炎

答案：D

28. 阻断白三烯受体，起效缓慢，作用较弱，仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是（）

- A: 孟鲁司特
- B: 沙美特罗
- C: 氟替卡松
- D: 茶碱

答案：A

29. 属于长效 B₂ 受体激动剂的平喘

- A: 多索茶碱
- B: 沙丁胺醇
- C: 布地奈德
- D: 沙美特罗

答案：D

30. 稳定型和不稳定型心绞痛都可选用

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 地尔硫
- D: 维拉帕米

答案：D

31. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 增加 25%
- B: 减少 50%
- C: 减少 25%
- D: 增加 10%

答案：B

32. 属于金属配合物类的抗肿瘤药是

- A: 顺铂
- B: 氮芥
- C: 长春碱
- D: 阿糖胞苷

答案：A

33. (2016 年真题) 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是

- A: CYP2E1
- B: CYP2D6
- C: CYP2C19
- D: CYP2B6

答案：C

34. 克拉霉素与环孢素合用()

- A: 后者血药浓度下降，药效降低
- B: 药理作用拮抗
- C: 不良反应叠加

D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：D

35. 有关阿莫西林特点的说法正确的是()

A: 耐酸、耐酶

B: 口服吸收差，生物利用度小

C: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

D: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

答案：C

36. 糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

A: 硫酸镁

B: 甘油

C: 聚乙二醇 4000

D: 乳果糖

答案：B

37. 属于胆固醇吸收抑制剂的是()。

A: 阿托伐他汀

B: 非诺贝特

C: 阿昔莫司

D: 依折麦布

答案：D

38. 下列药物中不属于降压药的是()

A: 阿利克仑

B: 利血平

C: 左旋多巴

D: 胍屈嗪

答案: C

39. 硝酸酯类药物扩张血管是通过

A: 促进前列环素的生成

B: 直接作用于血管平滑肌

C: 产生一氧化氮，使细胞内环磷酸鸟苷升高

D: 阻滞 Ca^{2+} 通道

答案: C

40. 患者，女，62 岁。有高血压病史 14 年，伴变异型心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用()

A: 维拉帕米

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 尼莫地平

答案: A

41. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物是

A: 壬二酸

B: 过氧苯甲酰

C: 阿达帕林

D: 维 A 酸

答案: A

42. 长期合用下列哪个药物能使口服避孕药的主要成分炔诺酮和炔雌醇的代谢加快，血液中的药物浓度降低而导致避孕失败()

A: 四环素

B: 利福平

C: 复方磺胺甲噁唑

D: 氨苄西林

答案：B

43. 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是()。

A: 异戊巴比妥

B: 阿普唑仑

C: 地西洋

D: 佐匹克隆

答案：A

44. 需要 1 周才起效的是

A: 文拉法辛

B: 吡拉西坦

C: 吗氯贝胺

D: 氟西汀

答案：A

45. 有镇咳作用的是

A: 沙丁胺醇

B: 噻托溴铵

C: 氨溴索

D: 喷托维林

答案：D

46. 在虫体神经肌肉接头处发挥抗胆碱作用，阻断乙酰胆碱对蛔虫肌肉的兴奋作用，或改变虫体肌肉细胞膜对离子的通透性，影响神经自发冲动的传递；亦可抑制琥珀酸盐的产生，减少能量的供应，从而阻断神经肌肉接头处，使冲动不能下达，使蛔虫从寄生的部位脱开，随肠蠕动而排出体外的药物是

- A: 阿苯达唑
- B: 甲苯咪唑
- C: 左旋咪唑
- D: 哌嗪

答案：D

47. 甲氧苄啶的抗菌机制是

- A: 破坏细菌细胞壁
- B: 抑制二氢叶酸还原酶
- C: 抑制二氢蝶酸合成酶
- D: 抑制 DNA 螺旋酶

答案：B

48. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

- A: 克拉霉素
- B: 克林霉素
- C: 红霉素
- D: 万古霉素

答案：C

49. 催眠药应()

- A: 睡前内服

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 饭前内服

C: 空腹内服

D: 定时内服

答案: A

50. (2017 年真题) 属于抗雌激素的肿瘤药是 ()

A: 阿那曲唑

B: 炔雌醇

C: 氟他胺

D: 他莫昔芬

答案: D

51. 2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害, 临床用药需要重点关注的抗癫痫药是 ()

A: 苯巴比妥

B: 苯妥英钠

C: 丙戊酸钠

D: 氯硝西洋

答案: C

52. 普通肝素的作用靶点是

A: 因子 IIa

B: 凝血酶 III (AT—III)

C: 因子 Xa

D: 因子 IXa

答案: B

53. 作用机制是表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的是

A: 枸橼酸他莫昔芬

B: 巯嘌呤

C: 紫杉醇

D: 吉非替尼

答案: D

54. 不能用于隐球菌感染的抗真菌药是

A: 氟康唑

B: 伏立康唑

C: 伊曲康唑

D: 卡泊芬净

答案: D

55. 使用痤疮治疗药物不会出现

A: 红斑

B: 眼周局部刺激

C: 皮肤色素沉着

D: 中枢神经毒性

答案: D

56. 主要用于房颤与心房扑动(房扑)的复律、复律后窦性节律的维持和危及生命的室性心律失常的是()

A: 维拉帕米

B: 普萘洛尔

C: 利卡多因

D: 奎尼丁

答案: D

57. 止吐方案: 每日化疗前, 联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg, 化疗后从第 2 日到第 3 日口服地塞米松或应用 5-HT

- A: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- B: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：D

58. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 表柔比星
- B: 多西他赛
- C: 卡莫司汀
- D: 泼尼松

答案：C

59. 主要用于口服给药的广谱青霉素类是

- A: 庆大霉素
- B: 阿莫西林
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢哌酮

答案：B

60. 血浆蛋白结合率低，易透过血脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 甲氧苄啶
- C: 复方新诺明
- D: 磺胺多辛

答案：A

61. (2016 年真题) 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药是

- A: 阿瑞吡坦
- B: 甲氧氯普胺
- C: 托烷司琼
- D: 维生素 B6

答案: C

62. 属于环氧酶抑制剂的是

- A: 替格瑞洛
- B: 双嘧达莫
- C: 阿司匹林
- D: 乙酰唑胺

答案: C

63. 氨苄西林()

- A: 对 G
- B: 特别对铜绿假单胞菌有效
- C: 抗菌作用强, 对厌氧菌有效
- D: 对 G

答案: D

64. 具有留钾作用的利尿药是

- A: 去氨加压素
- B: 螺内酯
- C: 甘油果糖
- D: 甘露醇

答案: B

65. 引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

- A: 多沙唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 十一酸睾酮
- D: 舍尼通

答案：C

66. 多日化疗所致恶心及呕吐的药物预防方案是

- A: 建议用单一药物，如地塞米松、5-HT₃ 受体阻断剂或多巴胺受体阻断剂(如甲氧氯普胺)预防呕吐
- B: 推荐化疗前用三药方案，包括单剂量 5-HT₃ 受体阻断剂、地塞米松和 NK-1 受体阻断剂
- C: 推荐第 1 天采用 5-HT₃ 受体阻断剂联合地塞米松，第 2 和第 3 天继续使用地塞米松
- D: 在化疗期间每日使用 HT₃ 受体阻断剂，地塞米松应连续使用至化疗结束后 2~3 天，必要时可以考虑加入阿瑞匹坦

答案：D

67. 属于组胺 H₂ 受体阻断剂是

- A: 奥美拉唑
- B: 法莫替丁
- C: 多潘立酮
- D: 氯苯那敏

答案：B

68. 可导致凝血酶原时间延长的是

- A: 甲硝唑+乙醇
- B: 奥硝唑+乙醇

C: 替硝唑+苯巴比妥

D: 替硝唑+华法林

答案：D

69. 下列哪项不是维生素 K 的适应证

A: 水杨酸类药物过量引起的出血

B: 早产儿及新生儿肝脏合成功能不足引起维生素 K 缺乏

C: 梗阻性黄疸所致的出血

D: 用于弥散性血管内凝血症高凝期

答案：D

70. 既可用于男性性功能减退,又可用于女性绝后晚期乳腺癌治疗的药物是

A: 十一酸睾酮

B: 特拉唑嗪

C: 坦洛新

D: 西地那非

答案：A

71. 一对年轻夫妇计划出国旅游,出发前,准备选购以下治疗腹泻的药物备用,包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺,小檗碱。

A: 口服补液盐

B: 蒙脱石

C: 洛哌丁胺

D: 双歧杆菌三联活菌

答案：C

72. 属于第一代头孢菌素口服制剂的是 ()。

- A: 头孢克肟
- B: 头孢克洛
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢拉定

答案：D

73. (2016 年真题) 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式 (控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗

- A: 40mg
- B: 20mg
- C: 80mg
- D: 100mg

答案：C

74. 低分子量肝素的作用靶点是

- A: 因子 Xa
- B: 因子 IXa
- C: 凝血酶 III (AT—III)
- D: 因子 IIa

答案：C

75. 下述关于抗眼部细菌感染药物的描述中不正确的是 ()

- A: 对于衣原体感染的治疗主要是抗菌药物治疗
- B: 对淋球菌性结膜炎可采用全身及眼局部抗菌药物治疗
- C: 全身给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法

D: 细菌性眼内炎可采用玻璃体腔内注射方式给予抗菌药物

答案：C

76. 外耳道红肿局部治疗可选用

A: 伪麻黄碱

B: 2% 酚甘油

C: 3% 硼酸乙醇

D: 赛洛唑啉

答案：B

77. 下述关于双八面体蒙脱石的描述，错误的是

A: 可用于治疗儿童的急、慢性腹泻

B: 属于抗动力药

C: 具有吸附、收敛的作用

D: 不被胃肠道吸收，不进入血液循环

答案：B

78. 头孢曲松

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B: 用于非典型病原体感染

C: 肾毒性较大

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：A

79. 属于第一代抗精神病药物的是

A: 氯氮平

B: 氯丙嗪

C: 利培酮

D: 奥氮平

答案: B

80. 支气管哮喘急性发作气雾吸入

A: 多巴胺

B: 异丙肾上腺素

C: 去甲肾上腺素

D: 去氧肾上腺素

答案: B

81. 对氨基水杨酸的抗结核杆菌作用原理是

A: 抑制结核杆菌叶酸的代谢

B: 抑制 RNA 多聚酶

C: 抑制蛋白质合成

D: 抑制分枝菌酸合成

答案: A

82. 下列药物中，能促进食物消化的是()

A: 兰索拉唑

B: 胶体果胶铋

C: 乳酶生

D: 雷尼替丁

答案: C

83. 多柔比星与 β 受体阻滞药合用，可能()

A: 增加心脏毒性

B: 导致坏死性结肠炎

C: 易产生沉淀

D: 增加肝毒性

答案: A

84. 雌激素类药和孕激素类药均可用于()

A: 绝经期综合征

B: 晚期乳腺癌

C: 前列腺癌

D: 乳房胀痛

答案: C

85. 抑制质子泵而减少胃酸分泌的药物是

A: 奥美拉唑

B: 法莫替丁

C: 谷丙胺

D: 枸橼酸铋钾

答案: A

86. 属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

A: 酮替芬

B: 克罗米通

C: 麻黄碱

D: 过氧化氢

答案: C

87. 对乙酰氨基酚中毒可使用的解救药是

A: 阿托品

B: 乙酰半胱氨酸

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 肾上腺素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/437101056050010024>