

## 泌尿外科规培护士出科考试题

前列腺增生排尿困难的程度主要取决于（） [单选题]\*

- A 前列腺的大小
- B 患者的年龄
- C 增生的部位 (正确答案)
- D 是否癌变
- E 是否钙化

2 男，68岁。主诉排尿困难1年，下肢水肿，尿少3个月，化验病人血尿素氮、血清肌酐清除率均异常，临床诊断为肾衰竭。造成该病人肾衰竭的原因可能是（）  
[单选题]\*

- A：大面积烧伤
- B：感染性休克
- C：前列腺增生 (正确答案)
- D：肾血管疾病所致
- E：高血压所致

3 前列腺增生最早出现的症状（） [单选题]\*

- A 尿潴留
- B 排尿困难
- C 血尿
- D 尿频 (正确答案)
- E 尿急

4 老年患者出现尿潴留的首要处理方法（） [单选题]\*

- A 针刺
- B 肌肉注射药物
- C 耻骨膀胱上造瘘
- D 膀胱穿刺
- E 试行导尿并留置尿管 (正确答案)

5 尿潴留的表现 ( ) [单选题]\*

- A 尿频尿急 (正确答案)
- B 残余尿增加
- C 血尿
- D 尿线变小

6 非因前列腺增生导致 ( ) [单选题]\*

- A 尿道受压变形、狭窄、延长 (正确答案)
- B 膀胱出口梗阻
- C 尿道阻力增加
- D 排尿困难
- E 年龄增长

7 膀胱刺激症状是指 ( ) [单选题]\*

- A 尿频、尿多、尿痛
- B 尿频、尿急、尿痛 (正确答案)
- C 尿频、腰痛、尿急
- D 尿急、尿多、尿痛
- E 尿多

8 正常人每天生理需要的水摄入量 ( ) [单选题]\*

- A、500-1000ML
- B、1000-1500ML
- C、1500-2000ML (正确答案)
- D、2000-2500ML
- E3000-4000ML

9 男性，70 岁，因前列腺增生造成排尿困难，尿潴留，已 15 小时未排尿。目前正确的护理措施是（） [单选题]\*

- A：行导尿术 (正确答案)
- B：让病人坐起排尿
- C：热敷下腹部
- D：让病人听流水声
- E：用温水冲洗会阴部

10 前列腺有炎症时，前列腺液镜检每个高倍视野白细胞通常应在（） [单选题]\*

- A：3 个以上
- B：5 个以上
- C：30 个以上
- D：10 个以上 (正确答案)
- E：20 个以上

前列腺癌的致病因素有（） [单选题]\*

- A.性激素
- B.感染、饮食
- C.执业因素、年龄
- D.以上都是 (正确答案)

下列哪项是筛查前列腺癌的指标（） [单选题]\*

- A.AFP
- B.CEA
- C.CA125
- D.PSA (正确答案)

引起 PSA 升高的因素有 ( ) [单选题] \*

- A.良性增生肿瘤
- B.炎症
- C.直肠指检
- D.以上都是 (正确答案)

当前列腺有炎症时，卵磷脂小体数量 [单选题] \*

- A.不变
- B.增多
- C.先增多后减少
- D.减少 (正确答案)

PSA 正常值为 ( ) [单选题] \*

- A、 0-4ng/ml (正确答案)
- B、 4-10ng/ml
- C、 6-10ng/ml
- D、 0-6ng/ml

前列腺癌的临床症状以下 ( ) 除外 [单选题] \*

- A、 尿液排出梗阻症状
- B、 局部浸润症状
- C、 转移症状

D、耻骨疼痛(正确答案)

对前列腺脓肿的错误描述是 [单选题]

A、分泌物呈浓稠样

B、镜检可见大量成堆的白细胞、上皮细胞和不同数量的红细胞

C、卵磷脂小体明显增多(正确答案)

D、革兰染色可检出葡萄球菌或链球菌

E、检出淀粉样小体无临床意义

前列腺炎时，前列腺液检查可能出现的异常结果不包括 [单选题]

A、白细胞 $>10/HP$

B、淀粉样小体(正确答案)

C、葡萄球菌

D、滴虫

E、卵磷脂小体减少

前列腺炎最常见的病原菌是 [单选题]

A、淋球菌

B、链球菌

C、葡萄球菌(正确答案)

D、结核分枝杆菌

E、大肠埃希菌

属于前列腺癌的肿瘤标志物是 [单选题]

A、CEA

B、AFP

C、CA125

D、PSA (正确答案)

E、CA199

前列腺液中可随年龄增长而增多的物质是 [单选题]

A、卵磷脂小体

B、红细胞

C、白细胞

D、精子

E、淀粉样小体 (正确答案)

可作为前列腺炎、前列腺肥大、前列腺癌鉴别诊断的实验是 [单选题]

A、乳酸脱氢酶

B、转铁蛋白

C、补体

D、锌含量 (正确答案)

E、免疫球蛋白

关于前列腺液的叙述，下列错误的是 [单选题]

A、红色前列腺液即为恶性肿瘤 (正确答案)

B、前列腺炎时，外观可呈脓性

C、正常外观呈淡乳白色

D、卵磷脂小体减少主要见于前列腺炎

E、可出现淀粉样小体

前列腺液一般约占精液量的 [单选题]

A、10%

B、20%

C、30% (正确答案)

D、40%

E、50%

正常前列腺液镜检时可见大量 [单选题]

A、草酸钙结晶

B、卵磷脂小体 (正确答案)

C、上皮细胞

D、中性粒细胞

E、夏科雷登结晶

关于淀粉样小体的描述，哪项是错误的 [单选题]

A、体积较大

B、多呈卵圆形或圆形

C、有同心圆线纹的层状结构

D、呈微黄色或褐色

E、数量随年龄的增长而减少 (正确答案)

前列腺增生的典型临床表现是 [单选题]\*

A、血尿

B、进行性排尿困难 (正确答案)

C、尿路感染

D、尿毒症

E、肾积水

答案解析：进行性排尿困难是前列腺增生病人的典型表现症状。表现为排尿迟缓、断续、尿后滴沥。尿路梗阻严重时排尿费力、射程缩短，尿线细而无力，终呈滴沥状。

前列腺增生症状最先出现的是 [单选题]\*

- A、排尿困难
- B、膀胱刺激症状
- C、血尿
- D、尿频(正确答案)
- E、脱肛

答案解析：尿频是前列腺增生病人最初出现的症状。早期仅表现为夜尿次数明显增多，随梗阻加重，白天也可出现尿频。

良性前列腺增生易发生于 [单选题]\*

- A、儿童
- B、青年
- C、壮年
- D、老年(正确答案)
- E、幼儿

答案解析：目前认为高龄及有功能的睾丸是前列腺增生的重要因素，其中男性激素、多种生长因子、类固醇激素受体等与前列腺增生有一定的关系。

前列腺切除术后早期护理的重点应是 [单选题]\*

- A、观察和防治出血(正确答案)
- B、防止感染
- C、防止尿道狭窄
- D、防止血栓形成
- E、防止尿失禁

答案解析：继发性出血是前列腺切除术后常见并发症，主要是因为前列腺周围有丰富的血管网，位置较深不能在直视下缝扎止血，还有全身因素也是关键，如糖尿病和凝血功能障碍等疾病均可诱发术后出血，护士术后应重点观察和防治出血，故A正确。

患者男，64岁。患良性前列腺增生，有进行性排尿困难1年余，解除尿潴留的首选方法是 [单选题] \*

- A、针刺、诱导排尿
- B、插导尿管(正确答案)
- C、按摩腹部
- D、耻骨上膀胱造瘘
- E、肌肉注射卡巴胆碱

答案解析：此题中所有的选项都是解除尿潴留的方法，但最有效的还是进行导尿。可以缓解患者尿潴留症状。而长期引流者可行耻骨上膀胱造瘘。故选B。

肾癌最常见的转移部位( ) [单选题] \*

- A、肝
- B、肺(正确答案)
- C、骨骼
- D、肾上腺

大多发生在幼儿阶段的肾肿瘤为( ) [单选题] \*

- A、梭形细胞癌
- B、颗粒细胞癌
- C、肾母细胞瘤(正确答案)
- D、透明细胞癌

最常见的肾癌细胞类型( ) [单选题] \*

- A、透明细胞(正确答案)
- B、肾母细胞瘤
- C、梭形细胞癌

肾全切术后早期应哪侧卧位,鼓励尽早下床活动( ) [单选题] \*

- A、平卧位
- B、两侧均可
- C、健侧 (正确答案)
- D、患侧

肾的靶同治疗药物( ) [单选题] \*

- A、抑那通
- B、诺雷得
- C、索坦 (正确答案)
- D、康士得

肾癌 TNM 分期中 Mx 是指 ( ) [单选题] \*

- A、远处转移
- B、远处转移无法评估 (正确答案)
- C、有远处转移
- D、无远处转移

肾癌 TNM 分期中 T 是指 ( ) [单选题] \*

- A、远处转移
- B、原发肿瘤 (正确答案)
- C、未发现原发肿瘤
- D、区域淋巴结

护士为肾部分切除术后的患者制订的护理计划中,强调患者采取绝对卧床的时间是 [单选题] \*

B:6 天

C:8 天

D:12 天

E:14 天 (正确答案)

患儿，女，2 岁，腹部肿物诊断为肾肿瘤常见的是 [单选题]\*

A:肾母细胞瘤 (正确答案)

B:肾腺癌

C:肾蒂癌

D:肾盂乳头状瘤

E:肾盏乳头状瘤

患者，男性，63 岁。无明显诱因下，反复出现无痛性肉眼血尿 3 个月余，抗生素治疗无效。可能的疾病是 [单选题]\*

A:膀胱炎症

B:泌尿系结石

C:泌尿系肿瘤 (正确答案)

D:肾结核

E:前列腺癌

下列引起排尿困难的疾病除外 [单选题]\*

A:肾肿瘤 (正确答案)

B:前列腺增生

C:膀胱癌

D:尿道结石

E:包茎

) [单选题]\*

- A. 血尿、发热、肿块
- B. 腰痛、肿块、血尿 (正确答案)
- C. 尿急、尿频、尿痛
- D. 腰痛、血尿、血压升高
- E. 发热、血沉快、血压升高

肾脏的功能 [单选题]\*

- a 排出代谢产物 (正确答案)
- b 分解代谢产物
- c 消化内分泌功能
- d 控制人体新陈代谢

膀胱肿瘤的血尿特点。 [单选题]\*

- A. 镜下血尿
- B. 终末血尿
- C. 间歇性无痛肉眼血尿，终末加重 (正确答案)
- D. 血尿伴腰痛
- E. 血尿伴膀胱刺激症状

决定膀胱癌预后的是 [单选题]\*

- A 肿瘤大小。
- B 肿瘤部位。
- C 肿瘤的单发多发。
- D 治疗方法。
- E 癌细胞分化程度和浸润深度以及机体的免疫能力。 (正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437122124112006156>