

初级护师-外科护理学考试模拟试题及答案

1、肠内营养并发症与输入速度及溶液浓度有关的是

- A、误吸
- B、腹胀、腹泻
- C、肠炎
- D、肠道细菌移位
- E、胆囊结石

答案：B

答案解析：肠内营养并发症与输入速度及溶液浓度有关的是腹胀和腹泻。

【该题针对“专业知识-肠内营养（投予方法、护理措施）”知识点进行考核】

2、肛门坐浴的水温是

- A、25℃～35℃
- B、35℃～45℃
- C、45℃～55℃
- D、43℃～46℃
- E、55℃～65℃

答案：D

答案解析：坐浴的盆具应足够大，事先消毒，将沸水降至43～46℃是盛于盆内，持续坐浴20～30分钟左右。【该题针对“专业知识-直肠肛管疾病（护理措施）”知识点进行考核】

3、患者男性，45岁。主因意识丧失1小时，由家属送来急诊科，查体：意识丧失、叹息样呼吸，颈动脉搏动消失，立即为其行胸外心脏按压、气管插管、建立静脉通路、使用复苏药物、心电监护等抢救措施。

- A、气管内插管
- B、静脉给药
- C、心内注射
- D、动脉给药
- E、胃管内给药

答案：B

答案解析：用药途径：首选采用静脉给药，其次是气管内给药，最后才考虑心内注射。【该题针对“专业知识-脑复苏及复苏后处理（治疗、护理）”知识点进行考核】

4、在应激早期，人体葡萄糖消耗一般维持在

- A、100g/d
- B、110g/d
- C、120g/d
- D、130g/d
- E、140g/d

答案：C

答案解析：在应激早期，人体葡萄糖消耗一般维持在120g/d。【该题针对“基础知识-外科营养支持病人（概述）”知识点进行考核】

5、脊柱骨折的形态，多属于

- A、裂缝骨折
- B、横行骨折
- C、压缩骨折
- D、螺旋形骨折
- E、凹陷骨折

答案：C

答案解析：压缩性骨折见于松质骨，常见于椎体骨折，因此脊柱骨折多属于压缩性骨折，答案为C。【该题针对“基础知识-骨折（概述）”知识点进行考核】

6、胃十二指肠溃疡的病人行迷走神经切断术后的并发症不包括

- A、便血
- B、吞咽困难
- C、胃潴留
- D、腹泻
- E、胃小弯坏死穿孔

答案：A

答案解析：迷走神经切断术后并发症包括①吞咽困难：因食管下段运动失调或食管炎所致。②胃潴留：系迷走神经切断术后胃张力减退所致。③胃小弯

坏死穿孔：多与手术因素或胃小弯缺血坏死形成溃疡有关。④腹泻：多因迷走神经切断术后肠道功能紊乱、胆道和胰腺功能失常，或胃酸低致胃潴留后食物发酵和细菌繁殖所致。【该题针对“专业知识-胃、十二指肠溃疡的外科治疗（护理措施）”知识点进行考核】

7、男性，45岁。胃溃疡病多年，经内科系统治疗无效，近日入院手术治疗。

- A、上起锁骨下平脐
- B、上起锁骨下至耻骨联合
- C、上起剑突下至耻骨联合
- D、上起乳头连线下平脐
- E、上起乳头连线下至耻骨联合

答案：E

答案解析：胃大部切除术前备皮范围应为上起乳头连线下至耻骨联合。

【该题针对“专业知识-手术后病人（护理评估、措施）”知识点进行考核】

8、前列腺增生最重要的症状是

- A、尿频
- B、血尿
- C、尿潴留
- D、排尿困难
- E、排尿突然中断

答案：D

答案解析：前列腺增生最初的症状为尿频，最重要的症状为排尿困难。

【该题针对“专业知识-良性前列腺增生（临床表现）”知识点进行考核】

9、前列腺经尿道切除术术前的护理措施中，不正确的是

- A、给予粗纤维易消化的食物
- B、忌饮酒及辛辣食物
- C、每日询问病人排尿情况
- D、限制病人水分摄入
- E、保证良好的睡眠

答案：D

答案解析：在 TURP 术前应鼓励病人多饮水。【该题针对“专业知识-良性前列腺增生（护理措施）”知识点进行考核】

10、反映病人身体脂肪量的指标是

- A、体重
- B、体质指数
- C、三头肌皮褶厚度
- D、臂肌围
- E、肌酐身高指数

答案：C

答案解析：三头肌皮褶厚度可以间接测定脂肪量，体重和体质指数是混合性营养指标，臂肌围、肌酐身高指数反映体内肌肉含量。【该题针对“基础知识-外科营养支持病人（概述）”知识点进行考核】

11、可疑尿路结石患者，其他方法不能确诊时选择的检查是

- A、逆行肾盂造影
- B、B 超
- C、肾动脉造影
- D、肾图
- E、腹部平片

答案：A

答案解析：逆行肾盂造影仅适用于其他方法不能确诊时。【该题针对“相关专业-上尿路结石（辅助检查、治疗要点）”知识点进行考核】

12、急腹症非手术治疗的病人改用手术处理的指征不包括

- A、怀疑消化道穿孔
- B、有明显内出血表现
- C、出现休克表现
- D、腹膜刺激征明显
- E、腹痛反复发作 4 小时以上

答案：E

答案解析：疑有腹腔内出血不止，疑有肠坏死或肠穿孔而有严重腹膜炎者，经积极非手术治疗后，病情无好转反而加重者的应当改用手术治疗。【该题针对“相关专业-外科急腹症（辅助检查、治疗要点）”知识点进行考核】

13、患者，女，27岁。骑行过程中被快递货车撞飞，急诊入院。主诉腹部和腕部疼痛，检查：面部有擦伤，腹部压痛，腹肌紧张，生命体征平稳。怀疑有内脏损伤，观察期间出现哪种情况需急诊手术进行探查

- A、腹痛和腹膜刺激征有进行性加重或范围扩大
- B、肠鸣音逐渐减弱、消失或出现腹胀明显
- C、出现口渴、烦躁、脉率增快，或体温及白细胞计数上升
- D、血压由稳定转为不稳定，甚至下降
- E、以上任一情况均需要手术探查

答案：E

答案解析：已确诊为腹腔内脏器破裂，或非手术治疗者在观察期间出现以下情况时，应终止观察，及时进行手术探查：①腹痛和腹膜刺激征有进行性加重或范围扩大者；②肠鸣音逐渐减弱、消失或出现腹胀明显者；③全身情况有恶化趋势，出现口渴、烦躁、脉率增快，或体温及白细胞计数上升者；④红细胞计数进行性下降者；⑤血压由稳定转为不稳定，甚至下降者；⑥胃肠道出血不易控制者；⑦经积极抗休克治疗，情况不见好转反而继续恶化者。【该题针对“相关专业基础知识-常见实质性脏器损伤（治疗要点）”知识点进行考核】

14、关节脱位的定义是

- A、关节自关节囊脱出
- B、关节囊发育不良导致的关节失稳现象
- C、关节面失去正常的对合关系
- D、组成关节的关节面部分失去对合关系
- E、组成关节的各关节面形态发生改变

答案：C

答案解析：骨的关节面失去正常的对合关系，称为关节脱位。【该题针对“基础知识-关节脱位及断肢再植（病因病理）”知识点进行考核】

15、进行性血胸的紧急处理应

- A、抗感染
- B、剖胸探查
- C、固定胸壁
- D、穿刺排气减压
- E、迅速封闭胸壁伤口

答案：B

答案解析：进行性血胸病人因出血量大可致低血容量性休克，应及时剖胸探查，以止血。【该题针对“相关专业知识-损伤性气胸（治疗要点）”知识点进行考核】

16、患者女，49岁。因“尿毒症”行肾移植，术后第4天患者出现低热，尿量逐渐减少，自觉切口胀痛，乏力。查体发现移植肾肿大。

A、血肌酐、尿素氮测定

B、肾图检查

C、CT扫描

D、经肾穿刺活检

E、超声显像

答案：A

答案解析：急性排斥反应病人可出现寒战、高热、全身不适、移植物肿大而引起局部胀痛等，并出现移植器官功能减退，如肾移植，病人出现少尿或无尿、血肌酐及尿素氮增高；故病人首要检查的是血肌酐、尿素氮测定，答案为A。【该题针对“专业知识-器官移植术前准备”知识点进行考核】

17、肺叶切除者，术后体位取

A、半坐卧位

B、健侧卧位

C、平卧位

D、1/4侧卧位

E、患侧卧位

答案：C

答案解析：肺叶切除者，可采用平卧或左右侧卧位。【该题针对“专业知识-肺癌病人外科治疗（护理措施）”知识点进行考核】

18、泌尿系统梗阻引起的基本病理改变是

A、梗阻以上的尿路扩张

B、诱发感染

C、菌血症

D、肾积水

E、肾功能损害

答案：A

答案解析：泌尿系梗阻引起的基本病理改变是梗阻以上的尿路扩张。【该题针对“基础知识-泌尿系梗阻（概述）”知识点进行考核】

19、王女士，55岁，右乳房外上象限可扪及2cm×3cm肿块，质硬，尚能活动，皮肤有“橘皮样”改变，被诊为乳腺癌。

- A、组织液
- B、血液
- C、淋巴
- D、种植转移
- E、直接蔓延

答案：C

答案解析：淋巴转移：可循乳房淋巴液的四条输出途径扩散。转移部位与乳腺癌细胞原发部位有一定关系，原发癌灶位于乳头、乳晕区及乳房外侧者，约80%发生腋窝淋巴结转移；位于乳房内侧者，约70%发生胸骨旁淋巴结转移。

【该题针对“专业知识-乳腺癌（护理措施）”知识点进行考核】

20、深Ⅱ度烧伤，若无感染，通常愈合时间为

- A、2~3天
- B、1周
- C、2周
- D、3~4周
- E、5周以上

答案：D

答案解析：深Ⅱ度烧伤，若无感染的情况下，通常愈合时间为3~4周。

【该题针对“相关专业知-烧伤（治疗要点）”知识点进行考核】

21、下列属于气性坏疽的治疗原则是

- A、紧急清创
- B、应用抗生素
- C、高压氧治疗
- D、全身支持疗法
- E、以上说法均正确

答案：E

答案解析：气性坏疽的治疗原则是（1）紧急清创；（2）应用抗生素；（3）高压氧治疗；（4）全身支持疗法；（5）对症处理。【该题针对“相关专业知知识-气性坏疽（治疗要点）”知识点进行考核】

22、手术护士与巡回护士应共同完成的工作为

- A、术中观察病情
- B、传递器械
- C、安置手术体位
- D、体腔切开与关闭之前清点器械辅料
- E、术后清洗器械

答案：D

答案解析：AC选项为巡回护士应完成的工作，BE选项为手术（器械、洗手）护士应完成的工作，只有D为巡回护士手术护士共同完成的工作。【该题针对“专业知识-手术配合（器械、巡回护士）”知识点进行考核】

23、因注射青霉素引起的休克

- A、失血性休克
- B、感染性休克
- C、心源性休克
- D、创伤性休克
- E、过敏性休克

答案：E

答案解析：因注射青霉素引起的休克会导致过敏性休克。【该题针对“专业知识-外科休克病人（护理措施）”知识点进行考核】

24、闭合性损伤最常见的受损内脏为

- A、肝
- B、脾
- C、胃
- D、肾
- E、肠系膜

答案：B

答案解析：在闭合性损伤常见的受损内脏依次为脾、肾、小肠、肝、肠系膜等。【该题针对“基础知识-腹部损伤（概述）”知识点进行考核】

25、肾结核患者膀胱镜检中，不可能出现的检查结果是

- A、黏膜充血水肿
- B、结核结节
- C、结核性溃疡
- D、结核性肉芽肿及瘢痕
- E、膀胱内可见乳头状肿物样改变

答案：E

答案解析：肾结核膀胱镜检查：早期可见黏膜充血水肿、结核结节；后期可见有结核性溃疡，结核性肉芽肿及瘢痕等病变。【该题针对“相关专业知识-肾结核病人概述（辅助检查、治疗要点）”知识点进行考核】

26、患者女，33岁。有消化性溃疡病史。突发上腹部剧痛6小时，伴大汗淋漓、烦躁不安，服用制酸药不能缓解，考虑有溃疡穿孔可能。下列选项中最能有助于协助诊断穿孔的选项是

- A、腹肌紧张
- B、腹式呼吸减弱
- C、肠鸣音消失
- D、腹部叩诊鼓音
- E、腹部移动性浊音阳性

答案：C

答案解析：穿孔性病变：腹痛突然，呈刀割样持续性剧痛；迅速出现腹膜刺激征，容易波及全腹，但病变处最为显著；有气腹表现如肝浊音界缩小或消失，X线片见膈下游离气体；有移动性浊音，肠鸣音消失；选择性腹腔穿刺有助于诊断。所有选项中最能诊断穿孔的是肠鸣音消失。【该题针对“专业知识-外科急腹症概述（诊断和鉴别诊断要点）”知识点进行考核】

27、乳腺癌局部皮肤呈“酒窝征”的原因是

- A、肿物压迫引起
- B、癌肿位置深，侵及Cooper韧带
- C、癌细胞侵及或者堵塞乳房浅表淋巴管导致淋巴水肿
- D、肿物与乳房皮肤粘连
- E、肿物周围的炎性改变引起

答案：B

答案解析：若癌肿侵及 Cooper 韧带，可使其缩短而致癌肿表面皮肤凹陷，呈“酒窝征”。【该题针对“相关专业知 识-乳腺癌（治疗要点）”知识点进行考核】

28、急性乳腺炎最常见的致病菌是

- A、溶血性链球菌
- B、变形杆菌
- C、大肠埃希菌
- D、厌氧菌
- E、金黄色葡萄球菌

答案：E

答案解析：急性乳腺炎是乳腺的急性化脓性感染，好发于产后 3~4 周，病人多是产后哺乳期的妇女，以初产妇多见。多为金黄色葡萄球菌感染所致，少数为链球菌感染。【该题针对“基础知识-急性乳腺炎（病因）”知识点进行考核】

29、颅脑外伤患者临终状态的瞳孔表现是

- A、一侧瞳孔缩小，对光反射迟钝
- B、一侧瞳孔散大，对光反射迟钝
- C、一侧瞳孔散大，对光反射消失
- D、双侧瞳孔大小不变，对光反射迟钝
- E、双侧瞳孔散大，对光反射消失

答案：E

答案解析：瞳孔的大小、对光反应的灵敏度与脑神经（动眼神经）和交感神经的传导功能有关。缩瞳肌和扩瞳肌的中枢在中脑，当损伤累及中脑时常可出现瞳孔的改变。如两侧瞳孔迟发性散大、对光反射消失、眼球固定前视、深昏迷则表示脑于已失去功能，是濒临死亡的征象。中脑损伤常有瞳孔及眼球改变，瞳孔时大时小，或两侧交替变化，对光反射消失，眼球固定，眼球运动障碍。【该题针对“专业知识-颅脑损伤（护理评估、措施）”知识点进行考核】

30、骨与关节结核的主要感染途径是

- A、血液传播
- B、淋巴传播
- C、接触感染

- D、呼吸道传播
- E、临近结合组织蔓延

答案：A

答案解析：结核杆菌一般通过呼吸道传播先导致肺结核，然后经血液传播至骨与关节等部位。【该题针对“相关专业知识-骨与关节结核概述（辅助检查、治疗要点）”知识点进行考核】

31、胆道手术时易误伤的部位是

- A、肝十二直肠韧带
- B、Oddi 括约肌
- C、副右肝管
- D、胆总管
- E、胆囊管

答案：C

答案解析：有肝总管、胆囊管与肝脏下缘构成的三角区称为胆囊三角，其中有胆囊动脉、副右肝管等穿行，是手术时易误伤的部位。【该题针对“基础知识-肠道疾病解剖生理概要”知识点进行考核】

32、ICU 护士长一般设有几名

- A、1 名
- B、2 名
- C、1~2 名
- D、3 名
- E、3 名以上

答案：C

答案解析：ICU 主任全面负责医疗、教学、科研和行政管理工作。护士长 1~2 名。负责护理和护士培训并参与行政管理工作。【该题针对“基础知识-外科重症监护（概述）”知识点进行考核】

33、对 DIC 病人早期进行抗凝治疗时，首选的药物是

- A、肝素
- B、双嘧达莫（潘生丁）
- C、链激酶
- D、尿激酶

E、阿司匹林

答案：A

答案解析：DIC 病人早期在促凝物质作用下，凝血因子被激活，血中凝血酶量增加，血液呈高凝状态，循环血液中易有血栓形成。此期应及早进行抗凝治疗，常用药物有肝素、双嘧达莫（潘生丁）、右旋糖酐和阿司匹林等。其中肝素能抑制凝血机制，阻止 DIC 进展，使用越早效果越好，常为首选药物。

【该题针对“专业知识-弥漫性血管内凝血（治疗和护理要点）”知识点进行考核】

34、男性，33 岁，左小腿被锈铁钉刺伤一段时间后出现乏力、头疼、打哈欠，继而有张口困难、蹙眉和苦笑面容等表现，全身肌肉阵发性痉挛，但神志一直清醒，诊断为破伤风。针对该患者，治疗的中心环节是

- A、控制痉挛
- B、彻底清创
- C、应用抗生素
- D、中和游离毒素
- E、维持水电平衡

答案：A

答案解析：控制并解除解除痉挛是破伤风发作治疗时的重要环节。**【该题针对“相关专业知识-破伤风（治疗要点）”知识点进行考核】**

35、膀胱癌术后进行膀胱内药物灌注治疗的频率是

- A、每周 2 次，连续 4~6 周
- B、每周 1 次，连续 6~8 周
- C、每周 3 次，连续 2~4 周
- D、每 2 周 1 次，连续 6~8 周
- E、每 2 周 1 次，连续 8~10 周

答案：B

答案解析：膀胱内药物灌注治疗一般每周 1 次，连续 6~8 周，以后每月 1 次，持续 2 年。**【该题针对“相关专业知识-膀胱癌（辅助检查、治疗要点）”知识点进行考核】**

36、骨关节结核病人术前应用抗结核药物至少

- A、1 周

- B、2 周
- C、2 个月
- D、3~6 个月
- E、3~5 个月

答案：B

答案解析：术前用药至少 2 周。合并化脓感染时配合有效抗生素。【该题针对“专业知识-骨与关节结核（护理措施）”知识点进行考核】

37、候先生，37 岁，车祸中钢棒刺伤其左腋下，出现烦躁不安，呼吸困难，口唇发绀，左腋下胸壁有伤口，呼吸时能听到空气出入伤口的“嘶嘶”响声，气管向健侧移位，患侧胸部叩诊鼓音。该病人的急救措施首先是

- A、输血输液
- B、使用抗生素
- C、开胸手术
- D、闭式胸膜腔引流
- E、迅速封闭伤口

答案：E

答案解析：通过题干呼吸时能听到空气出入伤口的声音，可以判断是开放性损伤，应及时清创缝合，封闭伤口。【该题针对“专业知识-损伤病人概述（护理措施）”知识点进行考核】

- 38、急性重症胆管炎需要
- A、急症手术行胆总管引流
 - B、急症手术留置腹腔引流
 - C、胆囊切除
 - D、胆囊造瘘
 - E、给予解痉止痛

答案：A

答案解析：急性重症胆管炎病人因胆道梗阻继发感染，生命危急，应紧急手术减压。【该题针对“相关专业-胆道疾病的特殊检查及护理”知识点进行考核】

39、患者阿亚，牧民。偶发肝区疼痛，反复迁延多年，劳累后加重。近日疼痛加重求诊，血清甲胎蛋白（AFP）检测阴性，B 超检查示肝脏内有液性暗区，最可能的诊断是

- A、原发性肝癌
- B、肝脏良性肿瘤
- C、继发性肝癌
- D、肝包虫病
- E、肝脓肿

答案：D

答案解析：肝包虫病好发于牧区，有牛、羊、犬等接触史。病程迁延，但全身情况好；B 超检查示肝脏内有液性暗区，Casoni 试验和补体结合试验常阳性，而 AFP 为阴性。【该题针对“相关专业知 识-原发性肝癌（辅助检查、鉴别诊断、治疗要点）”知识点进行考核】

40、致病菌侵入胸膜腔并引起感染的途径，不包括的是

- A、直接侵入
- B、继发感染
- C、淋巴途径
- D、种植转移
- E、血行播散

答案：D

答案解析：致病菌侵入胸膜腔并引起感染的途径有：①直接由化脓病灶侵入或破入胸膜腔，如肺脓肿或邻近组织的脓肿破裂；②外伤、异物存留、手术污染或血肿引起继发感染；③经淋巴途径，如膈下脓肿、肝脓肿、纵隔脓肿、化脓性心包炎等，通过淋巴管侵犯胸膜腔；④血源性播散：在败血症、脓毒血症时致病菌经血液循环进入胸膜腔。【该题针对“基础知识-急性脓胸（病因、病理生理）”知识点进行考核】

41、机械性肠梗阻的病因为

- A、慢性铅中毒
- B、腹膜后血肿或感染
- C、肠管受压
- D、肠系膜血管栓塞

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438006023056006034>