

1. 孕妇，29 岁。尿 hCG 阳性，超声检查：宫内孕 6 周，对其孕期健康指导正确的是

- A.妊娠初期 8 周内谨慎用药
- B.28 周后每天数胎动 1 次
- C.妊娠 12~28 周避免性生活
- D.胎心率在 160~180 次 / 分
- E.妊娠 30 周后进行乳房护理

正确答案：

A

2. 日光浴一般于婴儿早餐后

- A.0.5 小时内为宜
- B.1~1.5 小时为宜
- C.2~2.5 小时为宜
- D.2.5~3 小时为宜
- E.3~3.5 小时为宜

正确答案：

B

3. PDCA 循环中的 “D” 代表

- A.管理
- B.计划
- C.实施
- D.检查
- E.处理

正确答案：

C

4. 患儿，女，3 岁。半年来“感冒”重复发作，家长多次自行给予“阿司匹林”、“头孢拉定”、“阿莫西林”、“罗红霉素”等药物治疗。5 天前患金黄色葡萄球菌肠炎入院。出院时护士对家长进行健康指导应特别强调

- A.合理喂养
- B.注意饮食卫生
- C.多进行户外活动
- D.注意儿童个人卫生
- E.滥用抗生素的严重后果

正确答案：

E

5. 患者男性，38 岁，因呼吸道感染伴咳嗽，发热到医院就诊，医嘱给与青霉素 80 万 U 肌内注射，每日两次。据患者表现首选药是

- A.多巴胺
- B.地塞米松
- C.盐酸肾上腺素
- D.去甲肾上腺素
- E.异丙肾上腺素

正确答案：

C

6. 口服避孕药的禁忌症不包括

- A.患严重心血管疾病病人
- B.糖尿病病人
- C.甲状腺功能亢进者
- D.精神病生活不能自理者
- E.产后 8 个月妇女

正确答案：

E

7. 患者，男性， 65 岁。3 年前被诊断为“肺心 病”，近日因感冒后呼吸困难加重入院。护士对该患者所采取的氧疗方式正确的是

- A.间歇高流量给氧
- B.间歇低流量给氧
- C.持续高流量给氧
- D.持续低流量给氧
- E.高压给氧

正确答案：

D

8. 某 8 岁患儿，被诊断为“胆道蛔虫病”，经非手术治疗后症状缓解。医嘱给予患儿驱虫药治疗(每天 1 次)。该患儿服用驱虫药的时间应是

- A.早餐后
- B.午餐前
- C.午餐后
- D.晚餐后
- E.晚上睡前

正确答案：

E

9. 患者男，26 岁，血友病 16 年，胃大部分切除术后 2 小时出现烦躁不安，术口敷料渗血，值班护士首先应采取的措施是

- A.监测血糖变化
- B.监测生命体征
- C.观察皮肤受压情况
- D.查看患者病历
- E.查看四肢活动情况

正确答案：

B

10. 胰腺癌最常见的首发症状是

- A.上腹痛及上腹饱胀不适
- B.黄疸
- C.食欲缺乏
- D.消化不良
- E.乏力消瘦

正确答案：

A

11. 患者，男性， 56 岁。肝硬化病史 5 年，今日饮酒后突然大量呕血，伴神志恍惚、四肢 湿冷、血压下降，医嘱予以输血、补液，该患者输新鲜血的主要目的是防止发生

- A.自发性腹膜炎
- B.心力衰竭
- C.肾衰竭
- D.肝性脑病
- E.水、电解质紊乱

正确答案：

D

12. 关于注射铁剂的用药护理措施中，下列哪项不正确：（）

- A.使用时剂量要准确
- B.宜作浅部肌肉注射
- C.观察有无严重的过敏性休克
- D.观察有无面部潮红、头痛。关节痛等副反应
- E.静脉注射时应避免药液外渗

正确答案：

B

13. 患者，女性， 18 岁。以焦虑症入院，护理措施 中最重要的是

- A.深入了解引发患者焦虑的来源
- B.鼓励患者描述焦虑的感受
- C.保护患者安全，降低焦虑程度
- D.指导患者认识个人的焦虑行为
- E.护士应与患者保持一定距离

正确答案：

B

14. 月经初潮后女性的一级预防保健重点是

- A.避孕指导
- B.经期卫生指导
- C.经期卫生指导
- D.孕前优生指导
- E.月经病治疗指导

正确答案：

B

15. 某 ICU 护士，毕业工作 3 年来，基本上是一个人护理某个病人，病人需要的全部护理由她全面负责，实施个体化护理。在 ICU 常运用的护理方式是

- A.个案护理
- B.功能制护理
- C.责任制护理
- D.小组护理
- E.临床路径

正确答案：

A

16. 肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要因素是

- A.缺氧
- B.血容量增加
- C.血液黏稠度增加

- D.继发性红细胞增多
- E.肺部毛细血管微小栓子形成

正确答案：

A

17. 特发性血小板减少性紫癜主要发病机理是：（）

- A.骨髓巨核细胞生成减少
- B.骨髓巨核细胞成熟障碍
- C.产生抗血小板抗体
- D.脾功能亢进
- E.雌激素抑制血小板生成

正确答案：

D

18. 患者女， 48 岁。类风湿关节炎 5 年，双侧腕、指关节肿胀畸形，为保持关节的功能，正确的做法是

- A.腕关节背伸、指关节背伸
- B.腕关节背伸、指关节掌曲
- C.腕关节掌曲、指关节侧曲
- D.腕关节掌曲、指关节背伸
- E.腕关节侧曲、指关节掌曲

正确答案：

B

19. 细菌性肝脓肿最常见的早期症状是

- A.恶心
- B.黄疸
- C.贫血
- D.右上腹肌紧张，局部触痛明显
- E.寒战、高热

正确答案：

E

20. 服用磺胺类药物治疗尿路感染时，加服碳酸氢钠的作用是

- A.抗炎
- B.增加尿量
- C.碱化尿液
- D.保护尿路黏膜
- E.增加肾血流量

正确答案：

C

21. 护士为患者同时抽取不同种类的血标本时，注入盛放血标本容器瓶的正确顺序是

- A.血培养瓶 抗凝瓶 干燥管
- B.血培养瓶 干燥管 抗凝瓶
- C.干燥管 血培养瓶 抗凝瓶
- D.抗凝瓶 血培养瓶 干燥管
- E.干燥管 抗凝瓶 血培养瓶

正确答案：

A

22. 患者，女性， 40 岁。胰腺癌术后第 4 天，患者 出现心慌、出冷汗，测血糖为 3.2mmol/L ， 护士正确的护理是

- A.加快输液
- B.输注血浆
- C.补充葡萄糖
- D.减慢输液
- E.增加胰岛素用量

正确答案：

C

23. 患者男性， 38 岁，因呼吸道感染伴咳嗽，发热到医院就诊，医嘱给与青霉素 80 万 U 肌内注射，每日两次。护士首先为患者做青霉素皮试，护士进行操作错误的是

- A.皮试前询问有无用药史和过敏史
- B.用注射用水稀释皮试液
- C.皮试液现用现配
- D.被好肾上腺素
- E.在前臂掌侧下段做皮试

正确答案：

B

24. 开放性脑损伤的主要表现不包括

- A.硬脑膜破裂
- B.头皮裂伤
- C.脑积水
- D.脑脊液漏
- E.颅骨骨折

正确答案：

C

25. 患者男，74 岁，因为膀胱癌住院手术，术后接受顺铂化疗在给药后，护士遵医嘱给患者输入大量液体急性水化，此做法是为了防止药物对患者产生

- A.骨髓抑制
- B.肾功能损害
- C.胃肠道反应
- D.神经毒性
- E.肝功能损害

正确答案：

B

26. 我国的《护士条例》中规定了护士的权利和义务。在以下的护士享有的权利的诉讼中，不正确的是（）

- A.按照国家有关规定获取工资报酬，享受福利待遇的权利
- B.获得与其所从事的护理工作相适应的卫生防护，医疗保健服务的权利
- C.按照国家有关规定获得与本人业务能力和学术水平相应的专业技术职称的权利
- D.参加专业培训，从事学术研究和交流，参加行业协会和专业学术团体的权利
- E.获得接触有毒有害物质津贴的权利

正确答案：

E

27. 扩张型心肌病病人心脏结构最基本的改变是

- A.室间隔肥厚
- B.心室容积减少
- C.单侧或双侧心腔扩大
- D.左心室肥厚
- E.右心室流出道梗阻

正确答案:

C

28. 患者男，60岁。车祸致颅脑损伤，下肢粉碎性骨折，深昏迷，营养状况差，轻度水肿。评估见骶尾部皮肤紫红色，有皮下硬结，并有小水疱。患者目前皮肤状况处于

- A.正常
- B.压疮淤血红润期
- C.压疮炎性浸润期
- D.压疮浅度溃疡期
- E.压疮坏死溃疡期

正确答案:

C

29. 患者，女性，25岁。因即将出国与同学聚餐后2小时出现上腹部剧痛，伴恶心、呕吐3次，急诊入院。体检：体温37.9℃，血压110/75mmHg，血白细胞计数 $16.5 \times 10^9/L$ 。目前该患者首要的护理问题是

- A.焦虑
- B.体液不足
- C.体温升高
- D.疼痛
- E.潜在并发症：休克

正确答案:

D

30. 肝性脑病患者禁用的维生素是

- A.维生素A
- B.维生素E
- C.维生素C
- D.维生素B₁
- E.维生素B₆

正确答案:

E

31. 患者女，48岁。类风湿关节炎5年，双侧腕、指关节肿胀畸形，为保持关节的功能，正确的做法是

- A.腕关节背伸、指关节背伸
- B.腕关节背伸、指关节掌曲
- C.腕关节掌曲、指关节侧曲
- D.腕关节掌曲、指关节背伸
- E.腕关节侧曲、指关节掌曲

正确答案:

B

32. 患者，女性， 34 岁。行左侧乳腺癌根治术后第 2 天，为左上肢做康复训练中正确的是

- A.做转绳运动
- B.手指爬墙运动
- C.让患者左手洗脸、梳头
- D.下床时用吊带托扶左上肢
- E.扶住患者左上肢进行屈肘运动

正确答案：

D

33. 患者男，48 岁。以“全身性细胞黄染 20 天伴消瘦纳差”入院，诊断胰头癌。患者入院后情绪低落，思想负担较重。责任护士对其采取较为适宜的护理措施是（）

- A.对患者隐瞒病情以取得配合
- B.注意强调手术治疗的效果
- C.尽量避免谈及患者的病情
- D.介绍同病种术后康复期病友与其交流
- E.为了避免患者术前情绪波动，尽量减少探视

正确答案：

D

34. 患者男、75 岁，患慢性阻塞性肺疾病 30 余年，现处于疾病稳定期。在为其制定肺功能康复计划时，应是

- A.护士单独制定，强制患者执行
- B.护士单独制定，指导患者执行
- C.患者自行制定并执行
- D.患者自行制定，有护士指导执行
- E.护士与患者共同制定，护士指导患者执行

正确答案：

E

35. 患者男性 ,35 岁.因”急性肾炎 ”入院 ,应给予

- A.低蛋白饮食
- B.要素饮食
- C.低脂饮食
- D.低胆固醇饮食
- E.低胆固醇饮食

正确答案：

A

36. 患者女， 6 岁。全身大面积开水烫伤送来急诊。四肢、后背大面积烫伤，创面红肿，大水疱。未伤及范围包括头、面部、颈部、以及前胸、腹部约 8 个手掌大的皮肤。估计其烧伤面 积为

- A.63%
- B.67%
- C.73%
- D.77%
- E.83%

正确答案：

D

37. 患儿 ,11 个月,腹泻合并中度脱水 代谢性酸中毒 ,给予补液 纠正酸中毒后出现抽搐 ,最可能的原因是

- A.低血钾
- B.低血钠
- C.低血镁
- D.低血钙
- E.低血糖

正确答案：
D

38. 关于硝普钠的主要药理作用， 正确的叙述的是

- A.利尿
- B.减慢心率
- C.心输出量增加
- D.增强心肌收缩力
- E.扩张动， 静脉减轻心脏负荷

正确答案：
E

39. 可出现持续性青紫的先天性心脏病是

- A.房间隔缺损
- B.室间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.动脉导管未闭
- E.法洛三联症

正确答案：
E

40. 患者男，68 岁。因患膀胱癌住院，入院时，护士主动与其交流：“您好，我是您的责任护士，有事请找我。”患者治疗多日病情不见好转，情绪低落，化疗不良反应重。护士悉心照顾、鼓励，患者深受感动。患者经治疗后即将出院，对护士的服务非常满意。影响患者与责任护士沟通的因素不包括

- A.患者的感受
- B.患者的情绪
- C.患者的身体状况
- D.患者的籍贯
- E.护士的专业能力

正确答案：
D

41. 早产儿，生后 2 天，胎龄 34 周。因发绀给予氧气吸入，为预防其氧中毒，正确的做法是

- A.维持动脉血氧分压在 80～90mmHg
- B.维持经皮血氧饱和度在 85% ～93%
- C.连续吸氧时间不超过 7 天
- D.吸氧浓度在 70%～80%
- E.给予机械正压通气

正确答案：
B

42. 患者女，31 岁，车祸造成损伤性血胸，来院后立即为其行胸腔闭式引流术，现有引流一处，在术后观察中，引流量(血量)为多少时护士应立即报告医生提示患者有进行性血胸的可能

- A.30ml/h
- B.50ml/h
- C.100ml/h
- D.150ml/h
- E.200ml/h

正确答案：

E

43. 某膀胱癌患者行保留膀胱术，术后应用膀胱灌注法治疗预防肿瘤复发。常用的灌注药物为

- A.新洁尔灭
- B.硼酸水
- C.卡介苗
- D.干扰素
- E.抗菌药

正确答案：

C

44. 24 小时尿标本检查需要加入甲醛作为防腐剂的检查项目是

- A.艾迪计数
- B.17- 酮类固醇
- C.尿糖定量
- D.尿蛋白定量
- E.、肌酐定量

正确答案：

A

45. 全血细胞减少、骨髓三系增生低下，你认为符合下列何种疾病护理评估的实验查：（）

- A.缺铁性贫血
- B.再生障碍性贫血
- C.急性白血病
- D.慢性白血病
- E.特发性血小板减少性紫癜

正确答案：

B

46. 患者女， 3 岁患法洛四联症，心功能 IV 级， 护士建议其家长该患儿最佳的手术时机是

- A.立即
- B.择期
- C.学龄前
- D.成年后
- E.心功能改善后

正确答案：

E

47. 患儿女，足月儿。出生后 1 分钟评估患儿情况：躯干皮肤色红，四肢较紫、心率 120 次/分、哭声响亮、肌张力好，呼吸 45 次/分。 该足月儿最终的 Apgar 评分是

- A.6 分
- B.7 分
- C.8 分

分

E.10 分

正确答案：

D

48. 改善医护人际关系的途径不包含（）

- A.把握角色，各司其职
- B.真诚合作，密切配合
- C.坚持原则，互不相让
- D.关心理解，相互尊重
- E.互相监督，协调关系

正确答案：

C

49. 患者，男性， 27 岁。用力排便后肛门剧烈痛痛，伴滴少量鲜血。肛门检查：截石位 6 点位见一暗红色预柔软团状物。以下对该患者的护理中错误的是

- A.便后用 1：5000 高锰酸钾温水坐浴
- B.行直肠指检以明确诊断
- C.嘱患者多喝水和进粗纤维食物
- D.可行扩肛疗法
- E.形成良好的排便习惯

正确答案：

B

50. 肝癌按组织细胞分型，最常见的类型是

- A.混合型
- B.胆管细胞型
- C.肝细胞型
- D.结节型
- E.弥漫型

正确答案：

C

51. 患者治疗过程中，白细胞低于多少时应停止化疗或减量

- A. $6.5 \times 10^9/L$
- B. $5.5 \times 10^9/L$
- C. $4.5 \times 10^9/L$
- D. $3.5 \times 10^9/L$
- E. $2.5 \times 10^9/L$

正确答案：

D

52. 患者，女性， 68 岁。因面部肿块疼痛来诊：诊断为面部疖肿。与患者的疾病相关度最低的健康史内容是

- A.局部受伤史
- B.糖尿病史
- C.营养状况
- D.卫生习惯
- E.家族史

正确答案：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438023133102006132>