

2024 年河北省丰润区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题大全【B 卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 在胃黏膜表面形成屏障的药物是

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 谷丙胺
- C: 法莫替丁
- D: 奥美拉唑

答案：A

2. 强心苷最常见的早期心脏毒性反应是()

- A: 二联律
- B: 房颤
- C: 房性期前收缩
- D: 室性期前收缩

答案：D

3. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 沙美特罗
- B: 丙卡特罗
- C: 福莫特罗
- D: 特布他林

答案：C

4. 可引起致死性肺毒性的抗心律失常药是()

- A: 胺碘酮
- B: 奎尼丁
- C: 普萘洛尔
- D: 利多卡因

答案：A

5. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 凝血酶
- B: 氨苯甲酸
- C: 卡巴克洛
- D: 酚磺乙胺

答案：D

6. ACEI 与()联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸及血糖的不良影响。

- A: 噻嗪类利尿剂
- B: 留钾利尿剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 人促红素

答案：A

7. 双香豆素与保泰松合用可

- A: 竞争性对抗
- B: 与其竞争结合血浆蛋白
- C: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- D: 产生协同作用

答案：B

8. 长期大量使用林旦后会导致的不良反应是

- A: 白细胞减少
- B: 中枢神经系统毒性
- C: 肝脏损害
- D: 眼部水肿

答案：B

9. 下述哪种药物与氨基糖苷类抗生素合用可能出现呼吸抑制或呼吸停止

- A: 硫糖铝
- B: 西咪替丁
- C: 多潘立酮
- D: 奥美拉唑

答案：B

10. 治疗铜绿假单胞菌感染选用()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 红霉素
- C: 庆大霉素
- D: 多西环素

答案：C

11. 奥美拉唑治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 抗幽门螺杆菌
- B: 抑制胃壁细胞的 H
- C: 阻断 H
- D: 阻断 CTZ 的 D

答案：B

12. 以下不属于强心苷的禁忌证的是()

- A: 梗阻性肥厚型心脏病
- B: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- C: 慢性收缩性心力衰竭
- D: 室性心动过速、心室颤动

答案: C

13. 导致胃肠道溃疡及出血风险较其他传统非甾体抗炎药低的是

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 吲哚美辛
- D: 布洛芬

答案: A

14. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断药的是()

- A: 阿司匹林
- B: 双嘧达莫
- C: 阿替普酶
- D: 氯吡格雷

答案: D

15. 主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

- A: 依折麦布
- B: 瑞舒伐他汀
- C: 利血平
- D: 阿昔莫司

答案: B

16.（2016 年真题）可用于缓解绝经后更年期症状的药品是

- A: 地屈孕酮
- B: 他莫昔芬
- C: 依普黄酮
- D: 戊酸雌二醇

答案：D

17. 下列哪种药物与碳酸钙合用时易发高钙血症（）

- A: 阿莫西林
- B: 氧化镁
- C: 噻嗪类利尿药
- D: 四环素

答案：C

18.（2019 年真题）与体内过氧化物和自由基结合，保护细胞中含巯基的蛋白质和酶，参与多种有毒物质解毒反应的药物是（）

- A: 多烯磷脂酸胆碱
- B: 葡醛内酯
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 甘草酸二铵

答案：C

19.（2021 年真题）作为大手术、外伤或脓毒血症引起的严重肾功能衰竭以及急慢性肾功能衰竭患者肠外营养支持的药物是（）

- A: 复方氨基酸注射液（9AA）
- B: 丙氨酰谷氨酰胺注射液
- C: 复方氨基酸注射液（18AA）

D: 赖氨酸注射液

答案：A

20. 下述可用于治疗甲氨蝶呤引起的巨幼红细胞性贫血的是

A: 维生素 B

B: 叶酸+维生素 B

C: 亚叶酸钙

D: 叶酸

答案：C

21. 由于严重的肾毒性，仅限于局部应用的是()

A: 替考拉宁

B: 去甲万古霉素

C: 万古霉素

D: 杆菌肽

答案：D

22. 被还原后的代谢物可抑制细菌的 DNA 代谢过程，促使细菌死亡，并可抑制阿米巴原虫的氧化还原反应，使原虫的氮链发生断裂的是

A: 莫西沙星

B: 甲氧苄啶 (TMP)

C: 替硝唑

D: 磺胺甲噁唑 (SMZ)

答案：C

23. 起效缓慢,可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是
()

A: 瑞格列奈

- B: 罗格列酮
- C: 利拉鲁肽
- D: 艾塞那肽

答案: B

24. 用于疥疮和阴虱病的药物是()

- A: 硼酸
- B: 林旦
- C: 过氧苯甲酰
- D: 维 A 酸

答案: B

25. 代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性()

- A: 氟尿嘧啶
- B: 环磷酰胺
- C: 巯嘌呤
- D: 纳武利尤单抗

答案: B

26. 关于红霉素使用的叙述，错误的是

- A: 重症肌无力病史的患者使用有病情加重的风险
- B: 老年人使用发生尖端扭转型室性心动过速的风险增加
- C: 在明确需要的情况下可在妊娠期使用
- D: 主要由肝脏代谢，代谢物由肾脏排出

答案: D

27. 可以改善心肌缺血的是

- A: 维生素

B: 葡萄糖

C: 果糖

D: 脂肪乳

答案：C

28. 血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

A: 多巴酚丁胺

B: 米力农

C: 地高辛

D: 依那普利

答案：D

29. (2020 年真题) 曲妥珠单抗的适应证是

A: 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

B: 晚期恶性黑色素瘤

C: 转移性结直肠癌

D: 人表皮生长因子受体-2 (HER-2) 过度表达的乳腺癌

答案：D

30. 属于第四代头孢菌素的药物是

A: 头孢吡肟

B: 头孢克洛

C: 头孢噻肟

D: 头孢拉定

答案：A

31. (2019 年真题) 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是 ()

- A: 美托洛尔
- B: 贝那普利
- C: 硝普钠
- D: 氨氯地平

答案：A

32. 以下哪种心律失常禁用强心苷

- A: 室上性心动过速
- B: 室性心动过速
- C: 心房颤动
- D: 心房扑动

答案：B

33. 抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的抗菌药是

- A: 四环素
- B: 喹诺酮类
- C: 苯唑西林
- D: 甲硝唑

答案：B

34. 甲状腺素的合成需要 ()

- A: 环氧化酶
- B: 蛋白水解酶
- C: 碳酸酐酶
- D: 过氧化物酶

答案：D

35. 患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 吧达帕胺
- B: 赖诺普利
- C: 氨氯地平
- D: 普萘洛尔

答案：B

36. 可用于烧伤及伤后感染的是

- A: 磺胺甲
- B: 磺胺米隆
- C: 磺胺嘧啶
- D: 柳氮磺吡啶

答案：B

37. 属于持续大剂量应用糖皮质激素引起的不良反应是

- A: 骨质疏松症
- B: Cushing 综合征体型
- C: 胰腺炎
- D: 青光眼

答案：B

38. 主要用于口服给药的广谱青霉素类是

- A: 头孢噻肟
- B: 庆大霉素
- C: 阿莫西林

D: 头孢哌酮

答案: C

39. 肾毒性大的是

A: 庆大霉素

B: 阿莫西林

C: 头孢哌酮

D: 头孢噻肟

答案: A

40. 用于肾病的氨基酸制剂的是

A: 复方氨基酸注射液（18AA）

B: 赖氨酸注射液

C: 复方氨基酸注射液（9AA）

D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案: C

41. 关于法莫替丁用药注意事项的说法, 错误的是

A: 与西咪替丁相比, 对性激素的影响较轻

B: 肾功能不全患者需要减少给药剂量或延长给药间隔

C: 抑制肝脏细胞色素 P450 酶的活性, 从而影响茶碱、华法林、地西泮等药物的代谢

D: 以原形从肾脏排泄, 肾功能不全患者易造成药物在体内蓄积

答案: C

42. 为了保护亚胺培南, 防止其在肾中破坏, 应与其配伍的药物是()

A: 他唑巴坦

B: 舒巴坦

C: 克拉维酸

D: 西司他丁

答案: D

43. 患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2.5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

A: 头孢他啶

B: 阿莫西林

C: 头孢唑林

D: 头孢噻肟

答案: B

44. 属于 Ib 类抗心律失常药且具有抗癫痫作用的是()

A: 苯妥英钠

B: 维拉帕米

C: 普鲁卡因胺

D: 利多卡因

答案: A

45. (2020 年真题) 患者，男，60 岁。入院诊断为：高胆固醇血症、支原体肺炎。医师拟选用克拉霉素治疗支原体肺炎，同时需进行调血脂治疗，不宜与克拉霉素合用的调血脂药是

A: 依折麦布

B: 辛伐他汀

C: 氟伐他汀

D: 非诺贝特

答案: B

46. 可增高甲氨蝶呤血浆浓度的药物不包括

- A: 水杨酸类
- B: 氯霉素
- C: 碳酸氢钠
- D: 磺胺类

答案：C

47. 与避孕药合用，可能导致避孕失败的药物不包括

- A: 苯巴比妥
- B: 四环素
- C: 利福平
- D: 环孢素

答案：D

48. 解救由蒽醌类抗肿瘤药物导致的心肌炎，应当选用的药物是

- A: 纳洛酮
- B: 右雷佐生
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 氟马西尼

答案：B

49. 铁剂的适应证为

- A: 巨幼细胞贫血
- B: 缺铁性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 恶性贫血

答案：B

50. 以下避孕药不受月经周期限制的是

- A: 双炔失碳酯
- B: 左炔诺孕酮
- C: 去氧孕烯
- D: 孕二烯酮

答案：A

51. 长期使用可引起骨质疏松的药物是

- A: 依替膦酸二钠
- B: 糖皮质激素
- C: 胰岛素
- D: 甲状腺素

答案：B

52. 通过抑制血管紧张素转化酶产生作用，长期应用有可能导致血钾升高的降压药是

- A: 维拉帕米
- B: 卡托普利
- C: 哌唑嗪
- D: 硝酸甘油

答案：B

53. 治疗流行性细菌性脑膜炎最合适的联合用药是()

- A: 青霉素+四环素
- B: 青霉素+磺胺嘧啶
- C: 青霉素+克林霉素
- D: 青霉素+链霉素

答案：B

54. 作用于血管内皮生长因子的单克隆抗体靶向药物是

- A: 利妥昔单抗
- B: 西妥昔单抗
- C: 贝伐珠单抗
- D: 曲妥珠单抗

答案：C

55. 能降低血压但伴有反射性心率加快，易导致心肌缺血的药物是

- A: 氯沙坦
- B: 普萘洛尔
- C: 卡托普利
- D: 硝苯地平

答案：D

56. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞剂药物的是()。

- A: 硝苯地平
- B: 氨氯地平
- C: 维拉帕米
- D: 尼莫地平

答案：C

57. 对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是()。

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 罗非昔布
- D: 吲哚美辛

答案：B

58. 可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

- A: 奥硝唑+乙醇
- B: 替硝唑+苯巴比妥
- C: 替硝唑+华法林
- D: 甲硝唑+乙醇

答案：B

59. 黄体酮属于

- A: 雌激素
- B: 雄性激素
- C: 皮质激素
- D: 孕激素

答案：D

60. 以上药物与肝素合用，不会增加出血风险的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 阿司匹林

答案：B

61. 以下关于氯吡格雷使用的描述，错误的是

- A: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量
- B: 在需要进行择期手术的患者，如抗血小板治疗并非必须，则应在术前停用氯吡格雷 7 日以上

C: 如果漏服，在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量

D: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可检测 CYP2C19 基因型

答案：A

62. 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是()

A: 聚乙烯醇蓖麻油

B: 乙醇

C: 邻苯二甲酸二辛酯

D: 聚氯乙烯

答案：A

63. 患者，男，45 岁。近来饭后出现上腹疼痛，胃镜检查后诊断为幽门螺杆菌感染所致的“胃溃疡”，与抗生素合用根除幽门螺杆菌治疗的是

A: 东莨菪碱

B: 泮托拉唑

C: 雷尼替丁

D: 昂丹司琼

答案：B

64. 治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

A: 沙库巴曲缬沙坦

B: 阿利吉仑

C: 胺碘酮

D: 阿托品

答案：D

65. (2016 年真题) 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是

- A: 氯化钾
- B: 乳酸钠
- C: 硫酸镁
- D: 谷氨酸

答案：B

66. 下列关于胺碘酮的描述，错误的是

- A: 脂溶性高，口服、静脉注射均可
- B: 在肝中代谢
- C: 是广谱抗心律失常药
- D: 主要经肾脏排泄

答案：D

67. 用于表面麻醉、阻滞麻醉的局部麻醉药是

- A: 利多卡因
- B: 西地碘
- C: 普鲁卡因
- D: 布地奈德

答案：A

68. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

- A: 妥布霉素
- B: 异烟肼
- C: 新霉素
- D: 庆大霉素

答案：D

69. 不能直接抑制凝血因子 Xa 的药物是

- A: 依度沙班
- B: 利伐沙班
- C: 华法林
- D: 阿哌沙班

答案：C

70. 下列属于新型非苯二氮

- A: 佐匹克隆
- B: 劳拉西泮
- C: 阿普唑仑
- D: 地西泮

答案：A

71. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 蓝色
- B: 红色
- C: 绿色
- D: 黑色

答案：D

72. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 白三烯受体阻断剂

C: 短效 B₂ 受体激动剂

D: 吸入性糖皮质激素

答案: C

73. 磷酸二酯酶 III 抑制剂 (PDE III 抑制剂) 是

A: 地高辛

B: 多巴酚丁胺

C: 依那普利

D: 米力农

答案: D

74. 胰岛素对代谢的作用叙述错误的是

A: 抑制糖原分解

B: 促进糖原合成

C: 抑制脂肪的合成

D: 减少酮体生成

答案: C

75. 糖尿病合并酮症酸中毒的患者 ()

A: 可促进周围组织细胞 (肌肉等) 对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用

B: 抑制葡萄糖苷酶

C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

D: 胰岛素皮下注射

答案: D

76. (2016 年真题) 患者, 男, 55 岁, 诊断为良性前列腺增生症, 服用非那雄胺片治疗, 最有可能发生与用药相关的不良反应是

- A: 心悸
- B: 脱发
- C: 体位性低血压
- D: 性欲减退

答案：D

77. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列哪项不属于多柔比星的禁忌证

- A: 腰椎间盘突出
- B: 骨髓功能抑制
- C: 严重心脏病
- D: 妊娠及哺乳期妇女

答案：A

78. 选择性地兴奋 β

- A: 酮替芬
- B: 沙丁胺醇
- C: 奈多罗米
- D: 扎鲁司特

答案：B

79. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 放射性碘
- C: 糖皮质激素
- D: 甲状腺素

答案：D

80. 高血压合并慢性阻塞性肺病不宜选用()

- A: 普萘洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 肼屈嗪
- D: 胍乙啶

答案：A

81. 亲脂性较强，易通过血—脑屏障

- A: 环磷酰胺
- B: 巯嘌呤
- C: 卡莫司汀
- D: 氟尿嘧啶

答案：C

82. (2021 年真题) 属于浓度依赖型抗菌药物，通常铜绿假单胞菌对其敏感的药物是()

- A: 氨苄西林
- B: 头孢他啶
- C: 氨曲南
- D: 阿米卡星

答案：D

83. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标的是

- A: 尿淀粉酶
- B: 肌酸激酶
- C: 乳酸脱氢酶

D: 碱性磷酸酶

答案：B

84. 作用于外周多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

A: 甲氧氯普胺

B: 西沙必利

C: 莫沙必利

D: 多潘立酮

答案：D

85. 患者，男，63 岁，慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者。因近来夜间喘息加重就诊。对其因迷走神经张力过高所致的气道狭窄，宜选用的药物是

A: 沙丁胺醇

B: 吸入型糖皮质激素

C: 异丙托溴铵

D: 白三烯调节剂

答案：C

86. 对多种氨基糖苷类钝化酶稳定的药物是

A: 庆大霉素

B: 链霉素

C: 奈替米星

D: 妥布霉素

答案：C

87. 选择性抑制 COX-2 的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 阿司匹林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/438062011045007022>