

# 扁桃体手术围术期相关理论知识考核

## 一、选择题

1. 扁桃体周围脓肿发生的部位是 [单选题] \*

扁桃体隐窝

扁桃体包膜内

扁桃体包膜与咽缩肌之间\*

扁桃体实质内

2. 扁桃体周脓肿最常继发于 [单选题] \*

急性扁桃体炎

慢性扁桃体炎

慢性扁桃体炎急性发作\*

急性咽炎

3. 扁桃体周脓肿多次发作者，将扁桃体切除的时间应在炎症消退后 [单选题] \*

2 天后

5 天后

1 周后

2 到 3 周后\*

1 个月后

4. 关于扁桃体周脓肿，下述错误的叙述为 [单选题] \*

临床上分为前上型和后下型 2 种\*

多单侧发病

多见于青壮年

对多次脓肿发作者，应在炎症消退 2 到 3 周后，将扁桃体切除

确诊后可在抗生素有效控制下行病侧扁桃体切除

5. 扁桃体周脓肿出现张口困难是因为累及 [单选题] \*

咽缩肌

咬肌

翼外肌

翼内肌\*

6. 扁桃体周脓肿下面那项不是常见致病菌 [单选题] \*

金黄色葡萄球菌

肺炎链球菌\*

乙型溶血性链球菌

厌氧菌

7. 扁桃体的主要生理功能为 ( ) [单选题] \*

A、呼吸功能

B、吞咽功能

C、消化功能

D、免疫功能\*

E、机体功能

8. 急性扁桃体炎的主要症状是 ( ) [单选题] \*

A、口干、口渴

B、畏寒、高热

C、咽部疼痛、吞咽疼痛\*

D、咽干、鼻塞

E、咽痛、声嘶

9. 下列哪项不是急性咽炎的致病菌 ( ) [单选题] \*

A、溶血性链球菌

B、肺炎链球菌

C、白色念珠菌\*

D、乙型溶血链球菌

E、葡萄球菌

10. 急性扁桃体炎包括 ( ) [单选题] \*

A、适当进行隔离

B、应用抗生素控制感染

C、复方硼砂溶液等药物漱口

D、使用疏风清热、消肿解毒的中药治疗

E、以上都是\*

11. 化脓性扁桃体炎哪个年龄段达到高峰 ( ) [单选题] \*

A、1-2岁

B、4-10岁\*

C、3-6岁

D、6-10岁

E、2-8岁

12. 下列哪项疾病不引起咽痛 ( ) [单选题] \*

A、急性扁桃体炎

B、咽角化症\*

C、扁桃体周围脓肿

D、急性会厌炎

E、急性咽炎

13. 化脓性扁桃体炎临床症状 ( ) [单选题] \*

A、畏寒高热

B、影响呼吸、妨碍睡眠

C、刺激性咳嗽

D、口臭

E、以上都是\*

14. 化脓性扁桃体炎饮食 ( ) [单选题] \*

A、干硬食物

B、煎炸, 辛辣食物

C、高热量、高蛋白、高维生素、易消化的流质或半流质食物\*

D、患儿喜欢吃的食物

E、可口的零食

15. 扁桃体的神经主要来自 ( ) [单选题] \*

A、迷走神经

B、舌咽神经\*

C、舌下神经

D、外展神经

16. 扁桃体的主要生理功能为 ( ) [单选题] \*

A、呼吸功能

B、吞咽功能

C、消化功能

D 免疫功能\*

17. 急性咽炎主要症状是 ( ) [单选题] \*

A、口干、口渴

B、畏寒、高热

C、咽部疼痛、吞咽疼痛\*

18. 急性扁桃体炎常见并发症有 ( ) [单选题] \*

A、咽白喉

B、扁桃体周围脓肿\*

C、咽后脓肿

D、关节炎

E、心肌炎

19. 急性扁桃炎患者饮食以 ( ) [单选题] \*

A、清淡为主\*

B、高脂肪

C、高蛋白

20. 有关扁桃体炎的发病年龄叙述正确的是 [单选题] \*

A.4~10岁少见

B.6 个月内多发

C.14~15 岁高发

D.1 岁内少见

E.3 岁内高发\*

21. 腭扁桃体发育的高峰年龄为 [单选题] \*

A.14~15 岁

B.1 岁前\*

C.4~10 岁

D.10 岁后

22. 患者,17 岁,因慢性扁桃体炎行扁桃体切除术,术后半小时见唾液中有少许血丝,

正确的处理是:( ) [单选题] \*

A 不需要特殊处理\*

B 用纱布球压迫扁桃体窝止血

C 用双极电凝止血

D 补液,应用止血药物止血

23. 在全麻下行扁桃体切除后,患者尚未清醒时,需采取的体位是:( ) [单选题] \*

A 仰卧位

B 半俯卧位\*

C 侧卧位

D 半坐位

24. 对于慢性扁桃体炎反复发作,最有效的是:( ) [单选题] \*

B 免疫治疗

C 激光治疗

D 物理疗法

E 手术治疗\*

25. 下列属于慢性扁桃体炎并发症的是: ( ) [单选题] \*

A 扁桃体角化症

B 风湿性关节炎\*

C 扁桃体周脓肿

D 咽后壁脓肿

26. 下列慢性扁桃体炎诊断依据不正确的是: ( ) [单选题] \*

A 急性扁桃体炎反复发作

B 一侧扁桃体迅速增大\*

C 扁桃体及腭舌弓慢性充血

D 颌下淋巴结肿大

27. 扁桃体切除后一般 6 小时可进: ( ) [单选题] \*

A 冷流质饮食\*

B 温流质饮食

C 热流质饮食

D 半流质饮食

28. 扁桃体切除最常见的并发症是: ( ) [单选题] \*

A 术后出血\*

B 创面感染

C 肺炎

D 气管异物

29. 小儿化脓性扁桃体炎高热一般可达 [单选题] \*

A、39-40°C\*

B、38.5-39°C

C、39-39.5°C

D、39.5-40.5°C

30. 扁桃体的主要生理功能为 [单选题] \*

A.呼吸功能

B.吞咽功能

C.消化功能

D.免疫功能\*

31. 雾化吸入常选用 [单选题] \*

A 祛痰药

B 平喘药

C 糖皮质激素

D 以上都是\*

32. 超声雾化吸入常用于减轻喉头水肿的是 [单选题] \*

A 胰蛋白酶

B 氨茶碱

C 地塞米松\*

D 沙丁胺醇

33. 超声雾化的特点不包括 [单选题] \*



A 利用高速气流输出雾滴\*

B 雾滴小而均匀

C 雾量大小可调节

D 气雾温暖

34. 超声雾化吸入结束后 [单选题] \*

A 先关电源开关，再关雾化开关

B 只关雾化开关，不需要开电源开关

C 先关雾化开关，再关电源开关\*

D 不需要关雾化开关，直接关电源开关就可

35. 1 扁桃体恶性肿瘤男女发病率为 ( ) [单选题] \*

A 1.46 : 1\*

B 2 : 1

C 1:2

36. 2 扁桃体恶性肿瘤以 ( ) 为最多见 [单选题] \*

A 淋巴肉瘤

B 鳞癌\*

C 扁桃体未分化癌

37. 3 扁桃体恶性肿瘤以 ( ) 为必要的和可靠的方法 [单选题] \*

A X 线摄片

B CT

C 活组织检查\*

38. 4 扁桃体恶性肿瘤最主要的治疗手段是 ( ) [单选题] \*

A 外照射\*

B 化疗

C 手术

39. 5 以下哪项不是扁桃体恶性肿瘤的病因 ( ) [单选题] \*

A 长期的炎症刺激

B 长期大量的吸烟

C 良好的学习、生活习惯\*

40. 术前禁食 ( ) 小时, 禁水 ( ) 小时。注意口腔清洁, 以减少感染机会。 [单选题] \*

A 4, 2

B 6, 4

C 8, 4\*

D 12, 6

41. 观察伤口, 术后 ( ) 小时开始长白膜, ( ) 小时长满, 术后 ( ) 天白膜从边缘开始脱落, 10—15 天创面完全愈合, 不需特殊处理。 [单选题] \*

6, 24, 5-7\*

12, 48, 3-5

24, 48, 7-10

24, 72, 10-14

42. 扁桃体的主要生理功能为 ( ) [单选题] \*

A、呼吸功能

B、吞咽功能

C、消化功能

D、免疫功能\*

43. 急性扁桃体炎的主要症状是 ( ) [单选题] \*

A、口干、口渴

B、畏寒、高热

C、咽部疼痛、吞咽疼痛\*

D、咽干、鼻塞

44. 下列哪项不是急性咽炎的致病菌 ( ) [单选题] \*

A、溶血性链球菌

B、肺炎链球菌

C、白色念珠菌\*

D、乙型溶血链球菌

45. 急性扁桃体炎包括 ( ) [单选题] \*

A、适当进行隔离

B、应用抗生素控制感染

C、复方硼砂溶液等药物漱口

D、使用疏风清热、消肿解毒的中药治疗

E、以上都是\*

46. 下列哪项疾病不引起咽痛 ( ) [单选题] \*

A、急性扁桃体炎

B、咽角化症\*

C、扁桃体周围脓肿

D、急性会厌炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438072142007006037>