

2024 年广西壮族自治区昭平县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题王牌题库【典优】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 糖尿病合并肾病患者首选的口服降血糖药为

- A: 格列美脲
- B: 格列吡嗪
- C: 格列喹酮
- D: 格列齐特

答案：C

2. 急诊处方一般不超过几日

- A: 15 日常用量
- B: 3 日常用量
- C: 1 日常用量
- D: 7 日常用量

答案：B

3. 可应用于有反复性偏头痛的抗偏头痛药是

- A: 阿司匹林
- B: 苯噻啶
- C: 地西泮
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

4. 根据《药品召回管理办法》，药品召回的主体是

- A: 药品生产企业
- B: 药品经营企业
- C: 药品研究机构
- D: 药品监督管理部门

答案：A

5. 药师审核处方"用药与病症诊断不相符"工作中，所遇到的典型问题不包括

- A: 有禁忌证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 联合用药
- D: 无适应证用药

答案：C

6. 属于 M 受体激动剂的是

- A: 乙酰胆碱
- B: 异丙托溴铵
- C: 福莫特罗
- D: 美托洛尔

答案：A

7. 清晨尿液酸碱度的参考范围为

- A: pH5.5~6.5
- B: pH4.5~8.0
- C: pH4.5~5.5
- D: pH4.5~6.5

答案：A

8. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 华法林
- B: 氯吡格雷
- C: 利伐沙班
- D: 肝素

答案：B

9. 使用前应用青霉素进行皮试的药物是

- A: 注射用头孢曲松钠
- B: 阿莫西林胶囊
- C: 左氧氟沙星片
- D: 阿奇霉素片

答案：B

10. （2016 年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（）。

- A: 地西泮
- B: 雷美尔通
- C: 米氮平
- D: 佐匹克隆

答案：C

11. 缺铁性贫血患者常表现为（）

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多

D: 红细胞增多

答案：A

12. 预防乳腺癌患者化疗出现呕吐，可在给药期间给予

A: 甲氧氯普胺

B: 白介素-11(IL-11)

C: 人粒细胞巨噬细胞刺激因子(GM—CSF)

D: 昂丹司琼

答案：D

13. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒发热，咽痛，流鼻涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是()

A: 复方酚咖伪麻胶囊

B: 速感宁胶囊

C: 速克感冒片

D: 维 C 银翘片

答案：A

14. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价。试验对象主要为健康受试者，样本数一般只有

A: 10~18 例

B: 20~24 例

C: 20~30 例

D: 12~13 例

答案：C

15. 属于 5 α -还原酶抑制剂，可抑制前列腺生长的药品

A: 非那雄胺

- B: 氟他胺
- C: 阿夫唑嗪
- D: 黄酮哌酯

答案：A

16. 轻症、慢性疾病适宜选用的给药途径是

- A: 外用给药
- B: 肌肉注射
- C: 口服给药
- D: 腔道给药

答案：C

17. 可作为急性胰腺炎的症状指标是

- A: 血清淀粉酶降低?
- B: 磷酸激酶升高?
- C: 血清淀粉酶升高?
- D: 磷酸激酶降低?

答案：C

18. 放射性碘的不良反应是

- A: 甲状腺功能低下
- B: 甲状腺功能亢进
- C: 粒细胞缺乏
- D: 中枢抑制

答案：A

19. (2018 年真题) 患者突发心前区压榨性疼痛, 立即取出硝酸甘油片, 正确的使用方法是 ()

- A: 清晨服用
- B: 舌下含服
- C: 应同时碱化尿液
- D: 用温水调服

答案：B

20. 常用的抗肿瘤药给药途径有:动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径最常用的给药途径

- A: 动脉注射
- B: 肌内注射
- C: 静脉注射
- D: 腔内注射

答案：C

21. 对照的系列病例观察属于

- A: 四级证据
- B: 一级证据
- C: 三级证据
- D: 二级证据

答案：A

22. 患者用药咨询的内容是

- A: 减肥、补钙、补充营养素
- B: 抗菌药物的合理使用
- C: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- D: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大

答案：C

23. 用于锑、铅、汞、砷中毒的解救药物是()。

- A: 二巯基丁二钠
- B: 氯丙嗪
- C: 盐酸烯丙吗啡
- D: 谷胱甘肽

答案：A

24. 连续应用抗菌药物 / 糖皮质激素眼用制剂的时间不宜超过

- A: 10 天
- B: 7 天
- C: 5 天
- D: 3 天

答案：A

25. 实施"用药列表"，能有效地

- A: 转变疾病预防和保健观念
- B: 识别及管理多重用药
- C: 提高用药顺应性
- D: 健康生活方式的教育

答案：B

26. 抑制细胞色素氧化酶损害中枢神经系统的是

- A: 磷化氢
- B: 氯化钠
- C: 氯化锌
- D: 磷化锌

答案：A

27. 急性感染、急性化学药物中毒如汞中毒可呈现

- A: 血小板减少
- B: 红细胞计数减少
- C: 白细胞增多
- D: 淋巴细胞增多

答案：C

28. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

- A: 葡萄糖
- B: 馒头
- C: 无糖饼干
- D: 蔗糖

答案：A

29. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 男性 <40U/L
- B: 成人 <40U/L
- C: 男性 11~50U/L
- D: 成人 <50U/L

答案：B

30. 患者女,56 岁,既往有高血压、高脂血症病史,长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周,伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛,服用布洛芬,疼痛未缓解,自行加用萘普生。胃镜检查显示:胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡,幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常

- A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) +枸橼酸铋钾+阿莫西林+甲硝唑
- B: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) 枸橼酸铋钾+克拉霉素+左氧氟沙星 A
- C: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) +阿莫西林+克拉霉素
- D: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) +枸橼酸铋钾+阿莫西林+克拉霉素

答案: A

31. 采用华法林进行抗凝治疗时, 国际标准化比值 (INR) 的有效安全范围是

- A: 3.0~4.0
- B: 2.0~3.0
- C: 0.8~1.5
- D: 1.5~2.0

答案: B

32. 属于超短效的胰岛素制剂是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 甘精胰岛素
- C: 低精蛋白锌胰岛素
- D: 赖脯胰岛素

答案: D

33. 患者, 男, 33 岁。中度哮喘急性发作, 宜选用的药物是

- A: 白三烯受体阻断剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: β_2 受体阻断剂

C: 糖皮质激素

D: 短效 β_2 受体激动剂

答案：D

34. 能增加感染和肿瘤风险的抗风湿药物是

- A: 雷公藤多苷
- B: 白芍总苷
- C: 青藤碱
- D: 肿瘤坏死因子(TNF- α)拮抗剂

答案：D

35. 上市后因出现局部缺血性结肠炎，并有死亡病例报道而导致撤市的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 阿洛司琼
- C: 利巴韦林
- D: 甲氨蝶呤

答案：B

36. 各种肠道感染性或非感染性腹泻，或急性胃肠炎可引起

- A: 冻状便
- B: 米泔水样便
- C: 黏液便
- D: 稀糊状或水样粪便

答案：D

37. 如“齐二药事件”

- A: 药品上市前风险评估
- B: 发现药品质量问题
- C: 药品上市后风险评估

D: 发现与规避假、劣药流入市场

答案：D

38. (2016 年真题) 患者到药店购买“扑尔敏片”，药师应给予（）。

A: 阿昔洛韦片

B: 氯苯那敏片

C: 更昔洛韦片

D: 奥司他韦片

答案：B

39. 治疗胆囊炎的药物需选用

A: M 受体激动剂

B: 消炎利胆片

C: 质子泵抑制剂

D: H₂ 受体阻断剂

答案：B

40. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

A: 洛哌丁胺

B: 药用炭

C: 小柴碱

D: 鞣酸蛋白

答案：A

41. (抗高血压药物的不良反应)，服用维拉帕米可能引起

- A: 房室传导阻滞
- B: 多毛症
- C: 直立性低血压
- D: 免疫失调

答案：A

42. 减少因人员不足、忙乱无序而带来的调配差错，是针对

- A: 环境整齐、安静
- B: 及时沟通
- C: 配备足够的人力
- D: 规范操作、坚持核对

答案：C

43. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史患者在服药 7 天后，疼痛症状完全缓解。为了保证患者能够规律治疗，药师在回访后推荐患者在此次痛风急性发作 2 周后应开始服用的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 别嘌醇
- C: 碳酸氢钠
- D: 丙磺舒

答案：B

44. 降钙素属于

- A: 激素替代剂
- B: 骨吸收抑制剂
- C: 骨形成刺激剂

D: 促进骨矿化剂

答案：B

45. 下列药品中，不属于不宜选用葡萄糖注射液溶解的药品是

A: 阿昔洛韦

B: 青霉素

C: 红霉素

D: 苯妥英钠

答案：C

46. 对于缺乏维生素 D 人群，应初始高剂量补充维生素 D₂ 或 D₃，待血清 25-OH-维生素 D₃ 水平达到一定值后，继而给予维持剂量。给予维持剂量的临床指标是血清 25-OH-维生素 D₃ 水平达到

A: 30 μg/L (75nmol/L) 以上

B: 10 μg/L (25nmol/L) 以上

C: 3 μg/L (7.5nmol/L) 以上

D: 90 μg/L (225nmol/L) 以上

答案：A

47. 可迅速崩解和释放药物的制剂

A: 膜剂

B: 透皮贴剂

C: 泡腾片剂

D: 滴丸剂

答案：C

48. (妊娠的危险性分级)对人类胎儿的危险有肯定的证据，仅在对孕妇肯定有利时方予应用(如生命垂危或疾病严重而无法应用较安全的药物或药物无效)

A: A 级

B: B 级

C: D 级

D: C 级

答案: C

49. 有助于药师明确被问询问题的咨询服务方法步骤是

A: 确立有效的检索方法、查阅文献

B: 对问题进行确定并归类

C: 形成答案并以口头形式提供给询问者

D: 对文献进行评价、分析和整理

答案: D

50. 布噻嗪属于

A: 血管扩张药

B: 抗组胺药

C: 镇痛药

D: 利尿剂

答案: D

51. 判断尿路感染是复发还是再感染，多以在停药后几周再发为依据

A: 4 周

B: 6 周

C: 3 周

D: 5 周

答案：B

52. 不适合儿童的抗癫痫药为（）

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 苯巴比妥

答案：D

53. 糖尿病合并肾病患者宜选用的药物是

- A: 胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 格列苯脲
- D: 格列喹酮

答案：D

54. 一些药品吸收二氧化碳发生碳酸化

- A: 湿度
- B: 空气
- C: 温度
- D: 日光

答案：B

55. 可引起排尿困难，尿潴留患者禁用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 奥美拉唑
- C: 加兰他敏
- D: 法莫替丁

答案：A

56. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 过敏反应
- B: 低血糖症状
- C: 血压升高
- D: 血糖不降

答案：B

57. 连续使用易产生耐受性的是

- A: 氨氯地平
- B: 普萘洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 哌唑嗪

答案：C

58. 老年增龄导致机体内环境改变，肝肾功能下降，药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄及药效发生一系列变化，一些药物的治疗剂量与中毒剂量更加接近，药物的不良反应发生率增高。

- A: 维生素 B
- B: 苯巴比妥
- C: 磺胺异噁唑
- D: 阿司匹林

答案：A

59. 可以杀伤结核分枝杆菌，最大限度地降低传染性的早期杀菌活性药是

- A: 氧氟沙星
- B: 乙胺丁醇
- C: 莫西沙星
- D: 氨苄西林

答案：B

60. 与动脉硬化和冠心病的发生和发展呈负相关的是

- A: VLDL
- B: HDL
- C: LDH
- D: CM

答案：B

61. 抑制细菌叶酸合成的药物是

- A: 头孢哌酮
- B: 利福喷汀
- C: 磺胺嘧啶
- D: 头孢米诺

答案：C

62. 患者，女，45 岁，常有上腹部饱胀、恶心食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物（）

- A: 蒙脱石散
- B: 干酵母片

C: 复方阿嗟米特肠溶片

D: 奥美拉唑肠溶胶囊

答案: B

63. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 妊娠 1~3 周

B: 妊娠 3~5 周

C: 妊娠 1~2 周

D: 妊娠 3~4 周

答案: B

64. 患者，男，58 岁，高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 160mmHg，心率 75 次/分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

A: 双氯芬酸

B: 甲钴胺

C: 碳酸钙 D

D: 氨基葡萄糖

答案: A

65. (2017 年真题) 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是 ()

A: 奥司他韦

B: 利巴韦林

C: 金刚烷胺

D: 金刚乙胺

答案：A

66. 运动员禁用药物中，蛋白同化激素产生的危害是

A: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

B: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡

C: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

D: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

答案：C

67. 主要用于伴有血清 PSA 水平过高、前列腺体积增大的前列腺增生症患者的治疗药物是

A: 奥昔布宁

B: 米多君

C: 非那雄胺

D: 坦索罗辛

答案：C

68. 心力衰竭的妊娠期妇女禁用

A: RAAS 抑制剂

B: 利尿剂

C: 强心苷

D: β 受体阻断剂

答案：A

69. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理
- B: 维生素 C 片用法用量不合理
- C: 氨溴索片给药剂量不合理
- D: 左氧氟沙星片给药间隔不合理

答案：D

70. （2017 年真题）患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是（）

- A: 阿司匹林
- B: 华法林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 氯吡格雷

答案：D

71. 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最容易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是

- A: 妊娠 1～2 周
- B: 妊娠 28～32 周
- C: 妊娠 13～27 周
- D: 妊娠 3～12 周

答案：D

72. 患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是（）

- A: 华法林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 氯吡格雷
- D: 阿司匹林

答案：C

73. 治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

- A: 头孢唑林
- B: 莫西沙星
- C: 青霉素
- D: 红霉素

答案：D

74. 作用于靶器官的多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

- A: 莫沙必利
- B: 西沙必利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 多潘立酮

答案：D

75. 静脉滴注阿昔洛韦的适宜溶媒是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 复方氯化钠注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

76. 不宜咽或吞下所用药品；用药后不宜马上吃食或饮水的是

- A: 阴道栓剂
- B: 含漱剂
- C: 咀嚼片
- D: 舌下片

答案：B

77. 服药时进食高脂肪食物可促进药物吸收的是

- A: 西咪替丁
- B: 维生素 A
- C: 硫酸亚铁
- D: 格列本脲

答案：B

78. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌 (LES) 压力 $<6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 戒烟酒
- B: 避免高脂饮食
- C: 餐中多饮水
- D: 控制体重

答案：C

79. 与烟酸合用可能引起横纹肌溶解症的是

- A: 万古霉素
- B: 卡那霉素
- C: 辛伐他汀

D: 吡哆美辛

答案: C

80. (2016 年真题) 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml/min，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是 ()。

A: 0.4g，每日 4 次

B: 0.4g，每日 2 次

C: 0.4g，每日 5 次

D: 0.4g，每日 3 次

答案: C

81. 药师应告知医师“合理用药信息”的事例是

A: 他汀类药物合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

B: 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起 5-羟色胺综合征

C: 头孢菌素类之间无共同抗原决定簇；如头孢哌酮皮试阳性者头孢曲松钠皮试阴性

D: 培氟沙星引起跟腱炎，合用糖皮质激素可致跟腱断裂

答案: C

82. 是归纳、综合、整理后的出版物，使用最为广泛

A: 药学网络

B: 研究论文

C: 三级文献源

D: 二级文献

答案: C

83. 患者，男，25 岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温 38.5℃，入院检查肺部湿啰音，WBC $12\times 10^9/L$ ，X 线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

- A: 社区获得性肺炎
- B: 支气管哮喘
- C: 肺结核
- D: 支气管炎

答案：A

84. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 17 β 一雌二醇
- B: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- C: 雌二醇一屈螺酮片
- D: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片

答案：B

85. 三叉神经痛，应选的药物是

- A: 芬太尼透皮贴剂
- B: 卡马西平片
- C: 羟考酮缓释片
- D: 对乙酰氨基酚片

答案：B

86. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高，血肌酐升高，其他生化指标，该患者最可能患有：

- A: 肾脏疾病

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 心脏疾病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/438077130045007022>