

2024 年福建省永定区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题完整题库【各地真题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 常见的患者用药咨询内容不包括

- A: 药品适应证
- B: 国外新药动态
- C: 药物相互作用
- D: 药品名称

答案：B

2. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止？
- B: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液？
- C: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星？
- D: 应给予少量、多次、清淡饮食？

答案：C

3. 可提示急性肝炎的是

- A: γ -谷氨酰转移酶升高
- B: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高
- C: A/G 值低于 1
- D: 血清碱性磷酸酶升高

答案：B

4. 可应用于有反复性偏头痛的抗偏头痛药是

- A: 地西泮
- B: 苯噻啶
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿司匹林

答案：B

5. 高度心脏传导阻滞抗高血压药物的禁忌证

- A: 维拉帕米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 依那普利
- D: 美托洛尔

答案：D

6. 长期使用可降低血小板数量，可引起紫癜的药物是

- A: 卡马西平
- B: 氟西汀
- C: 文拉法辛
- D: 阿苯达唑

答案：D

7. 餐前 15~20min 服用的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 奥美拉唑
- B: 伊托必利
- C: 复方氢氧化铝
- D: 阿托伐他汀

答案：B

8. (2018 年真题) 患者, 男, 67 岁, 慢性咳喘 20 余年, 现因哮喘急性发作就诊, 首选的药物是 ()

- A: 氨茶碱片
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 二羟丙茶碱片
- D: 异丙托溴铵气雾剂

答案：B

9. IV 级临床研究的结论或 II、III 级临床研究的推论属于

- A: D 级
- B: C 级
- C: E 级
- D: B 级

答案：B

10. 《中华人民共和国药典》收载的处方属于

- A: 法定处方
- B: 急诊处方
- C: 协定处方
- D: 医师处方

答案：A

11. 糖化血红蛋白检查结果可显示糖尿病患者过去 3~4 周的血糖水平，正常值为

- A: 3.8%~4.0%
- B: 5.0%~8.0%
- C: 4%~6%
- D: 48%~60%

答案：B

12. 一般高血压患者服用降压药，建议控制在

- A: <130 / 80mmHg
- B: <120 / 80mmHg
- C: <140 / 80mmHg
- D: <140 / 90mmHg

答案：D

13. 嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

- A: 铅、铋中毒
- B: 病毒感染性腹泻
- C: 过敏性疾病如荨麻疹
- D: 感染性疾病如肺结核

答案：C

14. 在妊娠期可致颅骨和面部畸形、腭裂的药是

- A: 沙立度胺
- B: 叶酸拮抗剂
- C: 雄激素
- D: 孕激素

答案：B

15. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1°C)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查， $T38.8^{\circ}\text{C}$ ，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/\text{L}$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 应给予少量、多次、清淡饮食
- B: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星
- C: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止
- D: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液

答案：B

16. 患者，女，55 岁，化验结果：TC 4.0mmol/L (参考值 $<5.2\text{mmol/L}$)，TG 8.1mmol/L (参考值 $0.56 \sim 1.70\text{mmol/L}$)，应首选的调脂药物为

- A: 依折麦布
- B: 烟酸
- C: 苯扎贝特
- D: 氟伐他汀

答案：C

17. 静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

- A: 药物的使用
- B: 不良生活方式
- C: 药物制剂因素
- D: 生理因素

答案：A

18. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

A: 白介素-6 拮抗剂

B: 依那西普

C: 泼尼松

D: 关洛昔康

答案：C

19. 患者，男 50 岁，血压 170/95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是：

A: A 受体阻滞剂+ACEI

B: 利尿剂+AR

C: 利尿剂+CCB

D: β 受体阻滞剂+ARB

答案：C

20. (2020 年真题) 患者，男，66 岁，2 型糖尿病，长期口服二甲双胍，格列美脲，近日查空腹血糖 12.3mmol/L，糖化血红蛋白 9.0%，主诊医师加用“甘精胰岛素每日 1 次+门冬胰岛素每日 3 次”，关于该患者药物治疗方案的说法，正确的是（）

A: 因采用一日多次胰岛素治疗，格列美脲应停用

B: 患者为 2 型糖尿病，加用胰岛素一日 4 次方案不适宜

C: 甘精胰岛素应避免与二甲双胍联合使用

D: 门冬胰岛素应在三餐前 30 分钟皮下注射

答案：A

21. 用于解救苯二氮草类药物中毒的特殊解毒剂是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 亚甲蓝
- C: 纳洛酮
- D: 氟马西尼

答案: D

22. 可引起粪便红细胞增多的是

- A: 急性胰腺炎
- B: 溶血性黄疸
- C: 细菌性痢疾
- D: 阻塞性黄疸

答案: C

23. 吲哚美辛片剂和栓剂所表现的是()。

- A: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同
- B: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同
- C: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同
- D: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同

答案: C

24. 异烟肼+维生素 B6 治疗结核病属于

- A: 延缓细菌耐药性的产生
- B: 治疗多种疾病
- C: 提高药物疗效
- D: 减少药物不良反应

答案: D

25. 对有过敏倾向和特异体质以及有 ADR 家族史的患者，最重要的是

- A: 注意药物的迟发反应
- B: 了解患者及家族的过敏史
- C: 注意特殊人群用药
- D: 注意定期监测器官功能

答案：B

26. 下列物质口服中毒后，解救时不宜洗胃的是

- A: 汽油
- B: 乐果
- C: 砒霜
- D: 重金属

答案：A

27. 可导致嗜酸性粒细胞升高及维生素 K 减少的抗菌药物是

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢唑林
- C: 青霉素
- D: 美罗培南

答案：A

28. 应用华法林抗凝治疗时，患者应该控制的国际标准化比值为

- A: >3.0
- B: <2.0
- C: $2.0 \sim 2.5$
- D: $2.0 \sim 3.0$

答案：D

29. 以下属于急性肾盂肾炎的表现的是

- A: 老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等
- B: 可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难
- C: 尿液常浑浊，有异味
- D: 约 30%可出现血尿

答案：A

30. 高血压首选的利尿剂是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

31. 药品中的危险品应存放于()，

- A: 低温库
- B: 常温库
- C: 凉暗库
- D: 专用仓库

答案：D

32. 可引起尿胆红素阳性的是

- A: 肾小球肾炎
- B: 再生障碍性贫血
- C: 肺结核
- D: 病毒性肝炎

答案：D

33. 营养性巨幼细胞性贫血主要因为缺乏

- A: 白细胞
- B: 鞣酸
- C: 维生素 C
- D: 叶酸和(或)维生素 B

答案：D

34. 患者，男，60 岁，身高 170cm，体重 85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率 100 次 / 分、血压 160 / 100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

- A: 利尿剂
- B: ACEI 或者 ARB 和 β 受体阻断剂
- C: ACEI 与 ARB 联合应用
- D: 强心苷类和维拉帕米联合应用

答案：B

35. 患者，男，46 岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

- A: 在葡萄糖溶液中稳定
- B: 与氯化钠存在配伍禁忌
- C: 其神经毒性与剂量大小无关
- D: 遇冷可加重其神经毒性

答案：C

36. Hb 量 31~60g/L 可诊断为

- A: 中度贫血
- B: 基本正常
- C: 轻度贫血
- D: 重度贫血

答案：D

37. 吩噻嗪类抗精神病药中毒时若癫痫发作应给予

- A: 地西泮
- B: 有机硫类
- C: 间羟胺
- D: 阿托品

答案：A

38. (2017 年真题) 治疗滴虫性阴道炎首选的药物是 ()

- A: 甲硝唑栓
- B: 伏立康唑片
- C: 吡喹酮片
- D: 莫匹罗星软膏

答案：A

39. 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

- A: 30ml/min

B: 34ml/min

C: 40ml/min

D: 25.5ml/min

答案：D

40. 下列处方用药应该评判为“无适应证用药”的是

A: 忽略药品说明书提示用药

B: 应用两种或两种以上一药多名的药物

C: 感冒、咳嗽、无感染，给予阿奇霉素

D: 病因未明用药

答案：C

41. 痛风急性发作期为抑制粒细胞浸润可选用

A: 别嘌醇

B: 秋水仙碱

C: 苯溴马隆

D: 泼尼松龙

答案：B

42. 判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目是

A: HBeAg(+)

B: 抗-HBc(+)

C: 抗-HBe(+)

D: 抗-HBs(+)

答案：A

43. 既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

A: 阿米替林

B: 氟伏沙明

C: 丙咪嗪

D: 帕罗西汀

答案: B

44. 服药不宜从事驾驶、高空作业的药品是

A: 含咖啡因的抗感冒药

B: 含氯苯那敏的抗感冒药

C: 含伪麻黄碱的抗感冒药

D: 含右美沙芬的抗感冒药

答案: B

45. (2019 年真题) 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是

A: X 级

B: B 级

C: C 级

D: A 级

答案: B

46. 容易引起肌酸激酶升高的药物是

A: 青霉素

B: 红霉素

C: 洛伐他汀

D: 奥美拉唑

答案: C

47. (2016 年真题) 与阿莫西林配伍，可提高治疗的是 ()。

A: 叶酸

B: 克拉维酸钾

C: 苜丝肼

D: 奥美拉唑

答案: B

48. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，是归属于

A: 药学信息服务工作

B: 处方点评工作

C: 参与健康教育工作

D: 处方审核工作

答案: B

49. 中危患者

A: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

B: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗

C: 立即进行抢救治疗

D: 立即使用抗高血压药物

答案: B

50. 禁用于严重痛风患者的调脂药物为

A: 阿托伐他汀

B: 考来烯胺

C: 烟酸类

D: 非诺贝特

答案: C

51. 使用前应用原药进行皮试的药物是

- A: 左氧氟沙星片
- B: 注射用头孢曲松钠
- C: 阿奇霉素片
- D: 注射用阿莫西林

答案：B

52. 需要用 10%酒精或植物油冲洗是清除（）

- A: 眼内进入固体腐蚀性颗粒
- B: 毛发被毒物污染
- C: 皮肤污染酚类毒物
- D: 眼内污染毒物

答案：C

53. （2015 年真题）患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇 4mg tid 治疗。没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋，话不成句，被紧急送往医院。

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 福莫特罗吸入剂
- C: 沙丁胺醇片
- D: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

答案：D

54. 患者，女，33 岁，患有高铁血红蛋白血症，可选用的治疗药物是

- A: 亚甲蓝
- B: 纳洛酮
- C: 青霉胺
- D: N-乙酰半胱氨酸

答案：A

55. 关于治疗肺炎的用药注意事项，叙述不正确的是

- A: 体温正常 48~72h，无肺炎任何一项临床不稳定征象可停用抗菌药物
- B: 抗菌药物治疗后 48~72h 应对病情进行评价
- C: 肺炎的抗菌药物治疗应尽早进行，一旦怀疑为肺炎即应马上给予首剂抗菌药物
- D: 肺炎的药物治疗应避免使用抗生素，其他药物无效时再考虑使用抗生素

答案：D

56. (2021 年真题) 患者，女，31 岁，1 个月前顺一健康男婴。近 2 周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片 20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是 ()

- A: 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药
- B: 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善 1 个月后逐渐减量，直至停药
- C: 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加
- D: 氟西汀应于每日早餐后服用

答案：B

57. 患者，女，45 岁，既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症病史。近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是

- A: 氨溴索
- B: 阿莫西林
- C: 头孢呋辛酯
- D: 莫西沙星

答案：D

58. 质子泵抑制剂

- A: 铝碳酸镁
- B: 多潘立酮
- C: 埃索美拉唑
- D: 法莫替丁

答案：C

59. 抽烟可降低呋塞米的利尿作用，其主要原因是烟草中含有

- A: 咖啡因
- B: 醛类成分
- C: 焦油
- D: 烟碱

答案：D

60. 作用于核酸转录的药物是

- A: 顺铂
- B: 依托泊苷
- C: 放线菌
- D: 培美曲塞

答案：C

61. 中度药品不良反应是指

- A: 没有临床症状，无须治疗
- B: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害
- C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害
- D: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗

答案：B

62. 患者，女，68 岁，体重 45kg，因发热、咳嗽咳痰入院治疗，临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果：白细胞计数 $11.76 \times 10^9/L$ ，肌酐清除率 18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是()

- A: 莫西沙星
- B: 头孢噻肟钠
- C: 阿莫西林
- D: 左氧氟沙星

答案：A

63. I 期新药临床试验样本数要求查看材料

- A: ≥ 300 例
- B: 主要病种 ≥ 300 例
- C: 常见病 ≥ 12000 例
- D: 20~30 例

答案：D

64. I 类手术切口应用第三代头孢菌素，属于

- A: 超适应证用药
- B: 不合理联合用药
- C: 无适应证用药
- D: 过度治疗用药

答案：C

65. 药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务重要人群的是

- A: 社区患者

B: 过敏体质者

C: 住院患者

D: 门诊患者

答案：B

66. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A: 米多君

B: 索利那新

C: 坦索罗辛

D: 非那雄胺

答案：D

67. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响，妊娠早期服用甲氨蝶呤

A: 可能致胎儿畸形

B: 导致新生儿血钙过高

C: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

D: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

答案：A

68. 弥漫性青铜色色素沉着的是

A: 白消安

B: 氟尿嘧啶

C: 博来霉素

D: 柔红霉素

答案：A

69. 属于容积性泻药的是

- A: 开塞露
- B: 硫酸镁
- C: 番泻叶
- D: 乳果糖

答案：B

70. 对合并糖尿病及肾病的高血压患者的降压目标是

- A: <150 / 90mmHg
- B: <160 / 90mmHg
- C: <140 / 85mmHg
- D: <130 / 80mmHg

答案：D

71. （2017 年真题）治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，宜选择的药物是（）

- A: 比沙可啶
- B: 硫酸镁
- C: 乳果糖
- D: 东莨菪碱

答案：C

72. 患儿，男，12 岁，连续 3 日夜间咳嗽就诊，首选的止咳药是

- A: 苯丙哌林
- B: 右美沙芬
- C: 糖皮质激素
- D: 氨溴索

答案：B

73. 用于用药错误分级的是（）

A: CoCkroft-GAut 公式

B: CoChrAnE 分级

C: CLHD 公式

D: NCEMERP 标准

答案：D

74. 亚硝酸盐中毒的解救药物是

A: 亚甲蓝

B: 青霉胺

C: 氯解磷定

D: 纳洛酮

答案：A

75. 后记

A: 主要实验室数据

B: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

C: 临床诊断、费别

D: 医师签名、药品金额

答案：D

76. 患者，男，60 岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降 6 个月，BMI 值 29.0。空腹血糖 10.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 16.7mmol/L，血压 115/80mmHg。

A: 关节痛

B: 低血糖

C: 胃肠道反应

D: 皮疹

答案: C

77. 用药不适宜处方

A: 黄连素用于细菌性腹泻

B: 无正当理由不首选国家基本药物

C: 无适应证用药

D: 二甲双胍用于糖尿病患者

答案: B

78. 常见老年人 ADR 的药物类别, 硝苯地平可出现面部潮红、心慌、头痛等反应

A: 抗生素

B: β 受体阻断剂

C: 钙通道阻滞剂

D: 抗胆碱药

答案: C

79. 人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制, 很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的生物节律(生物钟)有着极其密切的关系, 同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

A: 抗抑郁药

B: 平喘药

C: 调节血脂药

D: 抗过敏药

答案: A

80. 患者，女，36 岁。患支气管哮喘，以上哪种药物能够最有效地控制哮喘呼吸道炎症

- A: 短效 β_2 受体激动剂
- B: 糖皮质激素
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: β_2 受体阻断剂

答案：B

81. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

- A: β 受体阻断剂
- B: 钙通道阻断剂
- C: 精神刺激剂
- D: 利尿剂

答案：B

82. 属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的抗 HIV 药物是

- A: 利托那韦
- B: 拉替拉韦
- C: 替诺福韦
- D: 阿德福韦

答案：C

83. 胶囊中的色素可引起固定性药疹，说明药源性疾病的药物因素是

- A: 药物制剂因素
- B: 生理因素
- C: 药物的使用
- D: 不良生活方式

答案：A

84. 口服避孕药可能导致

- A: 血清血红蛋白升高
- B: 血白细胞减少
- C: 血清总胆固醇升高
- D: 血清碱性磷酸酶升高

答案：C

85. 规范处方行为与操作流程，归属

- A: 环境与流程的优化与持续改进
- B: 科学发展
- C: 知识培训
- D: 管理规范到位

答案：D

86. 肝病患者慎用的药品不包括

- A: 氯丙嗪
- B: 甲氨蝶呤
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 多粘菌素

答案：D

87. 属于 COMT 抑制剂的是

- A: 普拉克索
- B: 司来吉兰
- C: 苯海索

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 恩托卡朋

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/438104072043007022>