

## 2024 广西壮族自治区象山区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题内部题库（考试直接用）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 有关依从性的说法错误的是

- A: 患者如缺乏依从性可能会干扰临床试验结果
- B: 采用缓释或控释制剂给药有利于提高患者的依从性
- C: 依从性仅限于药物治疗
- D: 药师加强对患者的用药指导可提高其依从性

答案：C

2. 用于慢性胆囊炎患者改善胆源性消化不良症状的药物是

- A: 头孢曲松与甲硝唑联用
- B: 脂肪乳
- C: 匹维溴铵
- D: 复方阿嗪米特

答案：D

3. 对刺激性干咳或阵咳者宜首选

- A: 苯丙哌林
- B: 盐酸吗啡
- C: 羧甲司坦
- D: 氨溴索

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

4. 嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

- A: 过敏性疾病如荨麻疹
- B: 感染性疾病如肺结核
- C: 病毒感染性腹泻
- D: 铅、铋中毒

**答案：A**

5. 在一定范围内，其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是（）

- A: HbA1c
- B: HDL-C
- C: LDL-C
- D: TG

**答案：B**

6. 当创伤应激严重时，给予肠外营养的热氮比调整为

- A: 150kcal:1gN
- B: 100kcal:1gN
- C: NPC5: 5
- D: NPC7:3

**答案：B**

7. （2021 年真题）哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是（）

- A: 依那普利
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 胰岛素
- D: 复方炔诺酮

**答案：B**

8. 脂肪乳用于脂质肾病患者，属于

- A: 撒网式给药
- B: 超适应症给药
- C: 有禁忌症用药
- D: 盲目联合用药

**答案：C**

9. 可提示肝硬化、慢性肝炎的是

- A: A/G 值低于 1
- B: 血清碱性磷酸酶升高
- C:  $\gamma$ -谷氨酰转移酶升高
- D: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高

**答案：A**

10. 关于现代药学的发展,以药品供应为中心阶段的特征是

- A: 以新药研制为中心
- B: 以药品工业化生产为中心
- C: 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作
- D: 以促进合理用药为主

**答案：C**

11. 用于治疗厌食、脚气合并糙皮病，服用后尿液可能呈黄色的药品是

- A: 维生素 C 片
- B: 维生素 A 片
- C: 维生素 AD 复方制剂
- D: 复合维生素 B 片

**答案：D**

12. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 10 万—15 万 IU

B: 15 万—30 万 IU

C: 30 万—45 万 IU

D: 30 万~60 万 IU

**答案：B**

13. 成本-效果分析

A: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率

B: 是成本-效果分析的一种特例

C: 成本和治疗结果均用货币表示

D: 药物利用指数(DUI)

**答案：A**

14. 成人白细胞计数(WBC)的正常参考区间是

A: (4.0~10.0) X10<sup>9</sup> / L

B: (3.5~10.0) X10<sup>9</sup> / L

C: (5.0~12.0) X10<sup>9</sup> / L

D: (5.0~10.0) X10<sup>9</sup> / L

**答案：A**

15. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 溴己新
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

**答案：C**

16. 属于抗过敏非处方药的是

- A: 息斯敏
- B: 异丙嗪
- C: 依巴斯汀
- D: 氯雷他定

**答案：B**

17. 可引起 A/G 比值 $<1$  的是

- A: 摄入不足、消化不良时
- B: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害
- C: 各种原因脱水所致的血液浓缩
- D: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

**答案：B**

18. 患者男 56 岁因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊查体舌面光滑，呈牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素 B12 水平下降，下列药物中不会影响维生素 B12 吸收的是()

- A: 二甲双胍
- B: 对氨基水杨酸

C: 氨氯地平

D: 奥美拉唑

**答案: C**

19. 有幻觉副作用，不宜与右美沙芬合用的药物是

A: 铝碳酸镁

B: 多奈哌齐

C: 美金刚

D: 匹伐他汀

**答案: C**

20. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的为

A: 达比加群酯直接作用于凝血酶（IIa 因子）

B: 与食物和药物相互作用小

C: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节

D: 需监测 INR

**答案: D**

21. 下列药物中适宜在餐前服用的是()

A: 双氯芬酸钠片

B: 莫沙必利片

C: 头孢呋辛酯片

D: 伊马替尼片

**答案: B**

22. 血管内容血时，尿中可见()。

A: 乳糜尿

B: 血红蛋白尿

C: 红细胞管型

D: 白细胞管型

**答案：B**

23. 应在每日的同一时间服用并且不能有一日间断，仅数小时的给药间隔变化也会降低避孕效果的药物是

A: 探亲避孕药

B: 口服低剂量孕激素避孕药

C: 甲地孕酮硅胶环

D: 长效复方口服避孕药

**答案：B**

24. 糖浆剂给药时的注意事项是

A: 服用时在口咽部黏膜表面形成一层保护膜，不宜立刻饮水，以免冲淡药物，降低疗效

B: 宜含服于舌下，以达到迅速缓解病情的作用

C: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管

D: 宜用温开水送服，以免药品黏附在咽喉和食管壁上引起刺激，产生恶心等不适

**答案：A**

25. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A: 链霉素

B: 阿奇霉素

C: 米诺环素

D: 克拉霉素

**答案：A**

26. 药师在调剂工作中，首先要审核处方的

A: 用药适宜性

B: 完整性

C: 规范性

D: 合法性

**答案：D**

27. (2017 年真题) 慢性阻塞性肺病稳定期患者 (FEV<sub>1</sub><50%) 宜选用的治疗方案是 ( )

A: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

B: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

C: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

D: 长效  $\beta_2$  受体激动剂+吸入型糖皮质激素

**答案：D**

28. 药物治疗结核病的原则及早用药以利于杀灭结核菌株

A: 适量

B: 规律

C: 联合

D: 早期

**答案：D**

29. 主要对成本进行量化分析、也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择是指

A: 成本-效用分析

- B: 最小成本分析
- C: 成本-效益分析
- D: 最大效果分析

**答案：B**

30. 药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

- A: 驳倒的信号
- B: 部分确认的信号
- C: 确认的信号
- D: 尚不确定的信号

**答案：D**

31. 铅严重中毒患者出现的最难救治的临床症状是（）

- A: 中毒性肾炎
- B: 贫血
- C: 中毒性肝炎
- D: 铅毒性脑病

**答案：D**

32. 以最低的药物成本，实现最好的治疗效果体现

- A: 规范性
- B: 安全性
- C: 有效性
- D: 经济性

**答案：D**

33. 第二类精神药品每张处方不超过几日常用量

A: 4 日

B: 7 日

C: 5 日

D: 3 日

**答案：B**

34. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

A: 米泔水样便

B: 冻状便

C: 黏液便

D: 稀糊状或水样粪便

**答案：B**

35. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果欲更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停用（）

A: 5 天

B: 14 天

C: 10 天

D: 7 天

**答案：B**

36. 吸烟后延缓胃溃疡的愈合，而加重出的药物是

A: 西咪替丁

B: 胰岛素

C: 氯丙嗪

D: 呋塞米

**答案：A**

37. 可提示骨骼疾病的是

- A: 血清碱性磷酸酶升高
- B:  $\gamma$ -谷氨酰转移酶升高
- C: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高
- D: A/G 值低于 1

**答案：A**

38. 中成药血脂康中含有的化学成分是

- A: 阿托伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 洛伐他汀
- D: 辛伐他汀

**答案：C**

39. 长期服用苯妥英钠，可能导致

- A: 血清碱性磷酸酶升高
- B: 丙氨酸氨基转移酶升高
- C:  $\gamma$ -谷氨酰转移酶升高
- D: A / G 比值 < 1

**答案：C**

40. 下列药物属于肝药酶诱导剂的是

- A: 氟康唑
- B: 环丙沙星
- C: 卡马西平
- D: 胺碘酮

**答案：C**

41. 延缓或降低抗药性的联合用药是

- A: 硫酸阿托品联用吗啡
- B: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- C: 磷霉素联用其他抗菌药物
- D: 头孢哌酮 / 舒巴坦复方制剂

**答案：C**

42. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 糖皮质激素
- B: 阿司匹林
- C: 抗菌药物
- D: 布洛芬

**答案：A**

43. 过敏性疾病患者可出现

- A: 血小板增多
- B: 红细胞/血红蛋白减少
- C: 中性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

**答案：D**

44. 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A: 肝素
- B: 阿司匹林
- C: 利伐沙班

D: 氯吡格雷

**答案: B**

45. 冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌症，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

A: 75~150mg/d

B: 25~50mg/d

C: 25~75mg/d

D: 150~300mg/d

**答案: A**

46. 万络（罗非昔布）撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍；此例体现了药物警戒的作用包括

A: 药品上市后风险评估

B: 药品上市前风险评估

C: 发现药品说明书问题

D: 发现与规避假、劣药流入市场

**答案: A**

47. 不仅能阻止早期炎症反应，且能稳定肥大细胞等炎症细胞，阻止组胺及其他炎症介质和细胞因子释放，阻止嗜酸性粒细胞的趋化、浸润，从而抑制或减轻晚期的炎症反应

A: 氯雷他定片

B: 萘甲唑林滴鼻液

C: 孟鲁司特钠片

D: 泼尼松片

**答案: A**

48. 美金刚的主要不良反应是

- A: 血脂升高
- B: 幻觉
- C: 呼吸抑制
- D: 心律不齐

**答案：B**

49. 能改善眼部干燥症状,缓解视疲劳的药物是()

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 山莨菪碱滴眼液
- C: 可的松滴眼液
- D: 聚乙烯醇滴眼液

**答案：D**

50. 药师应告知医师"合理用药信息"的事例是

- A: 培氟沙星引起跟腱炎、合用糖皮质激素可致跟腱断裂
- B: 长时间、大剂量应用头孢菌素类引起牙龈出血、手术创面渗血等反应
- C: 氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起 5 羟色胺综合征
- D: 他汀类药合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

**答案：B**

51. 患者，男，48 岁，因“肺结核”入院治疗。医师处方异烟肼片 0.3gqd、利福平胶囊 0.6gqd、乙胺丁醇片 1.0gqd、吡嗪酰胺片 1.5gqd。药师对患者的正确用药指导是

- A: 利福平可减慢异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能
- B: 患者治疗期间应避免服用维生素 B6

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

C: 异烟肼加快乙胺丁醇代谢，增加球后视神经炎风险，须定期评估视神经功能

D: 利福平可加快异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

**答案：D**

52. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别卡托普利在妊娠中晚期使用属于药物妊娠毒性分级

A: C 级

B: A 级

C: D 级

D: B 级

**答案：C**

53. 下列药品中，不属于不宜选用葡萄糖注射液溶解的药品是

A: 阿昔洛韦

B: 红霉素

C: 苯妥英钠

D: 青霉素

**答案：B**

54. 视疲劳所呈现的显著临床特征是

A: 视物时症状加重

B: 眼睑沉重、痉挛

C: 复视

D: 泪液减少

**答案：A**

55. (2017 年真题) 慢性阻塞性肺病稳定期患者 (FEV<sub>1</sub><50%) 宜选用的治疗方案是 ( )

- A: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- B: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- C: 长效 β<sub>2</sub> 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- D: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

**答案: C**

56. 利巴韦林的通用名是

- A: 阿霉素
- B: 病毒唑
- C: 克毒星
- D: 无环鸟苷片

**答案: B**

57. 轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

- A: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30 次 / 分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常>120 次 / 分，奇脉，PaO<sub>2</sub>
- B: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常
- C: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失
- D: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

**答案: B**

58. 患者用药咨询的内容是

- A: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

B: 抗菌药物的合理使用

C: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大

D: 减肥、补钙、补充营养素

**答案：A**

59. 静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

A: 万古霉素

B: 头孢哌酮

C: 克拉霉素

D: 美罗培南

**答案：A**

60. （2016 年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（）。

A: 雷美尔通

B: 地西泮

C: 米氮平

D: 佐匹克隆

**答案：C**

61. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患荨麻疹患者常出现的血常规检查异常是

A: 血小板计数增多

B: 血红蛋白减少

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 中性粒细胞增多

**答案：C**

62. (2015 年真题) 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药是 ( )。

- A: 头孢呋辛
- B: 左氧氟沙星
- C: 阿奇霉素
- D: 阿莫西林

**答案：C**

63. (2019 年真题) 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是

- A: X 级
- B: A 级
- C: B 级
- D: C 级

**答案：C**

64. 阿片类药物中毒的首选拮抗剂为

- A: 美沙酮
- B: 土的宁
- C: 纳洛酮
- D: 阿托品

**答案：C**

65. (消化性溃疡并发症)，穿孔

- A: 规律性上腹痛
- B: 突发上腹剧痛，继而至全腹
- C: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物
- D: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

**答案：B**

66. 所有的 UA/NSTEMI 患者均应尽早使用阿司匹林，首次服用剂量为（  
）

A: 100mg

B: 150mg

C: 300mg

D: 75mg

**答案：C**

67. 可与茶叶中的鞣酸结合产生沉淀，饮茶会影响其吸收的药物是

A: 硝苯地平

B: 地西洋

C: 对乙酰氨基酚

D: 硫酸亚铁

**答案：D**

68. 患者，男，40 岁，体重 70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于 50ml / min 时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐 (Cr) 130  $\mu$ mol / L。医师给出的治疗方案是

A: 经验剂量的 1 / 2

B: 经验剂量的 3 / 4

C: 延长给药间隔时间

D: 不需要调整给药方案

**答案：D**

69. 属于白三烯受体阻断剂的是

A: 曲尼司特

B: 多索茶碱

C: 氨茶碱

D: 孟鲁司特

**答案：D**

70. 治疗真菌性阴道炎可选用

A: 复方角菜酸酯栓

B: 复方苯甲酸酊

C: 克霉唑栓

D: 阿达帕林凝胶

**答案：C**

71. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

A: 溶栓同时

B: 溶栓后 24h

C: 溶栓前 12h

D: 溶栓后 12h

**答案：B**

72. II 期临床试验很难发现“低于 1% 发生频率”的不良反应，缘于

A: 考察不全面

B: 病例数目少

C: 管理漏洞

D: 观察时间短

**答案：B**

73. 阿托伐他汀钙的日剂量范围是()

A: 40—200mg

B: 10—80mg

C: 5—20mg

D: 10—20mg

**答案：B**

74. 患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg。1天前开始发热，体温39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，每间隔2~3小时排1次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 鞣酸蛋白

B: 小檗碱

C: 药用炭

D: 洛哌丁胺

**答案：D**

75. 下列说法错误的

A: 空腹服用抗蠕虫药可增强疗效

B: 急性化脓性或弥漫性皮炎禁用抗蠕虫药

C: 抗蠕虫药对妊娠及哺乳期妇女不宜应用

D: 噻嘧啶与枸橼酸哌嗪合用可增强疗效

**答案：D**

76. 以下对单纯疱疹的描述错误的是（）

A: 人与动物为HSV的主要自然宿主

B: HSV主要存在于感染者的疱疹液、唾液及粪便中

C: HSV是双股DNA病毒

D: 分为 HSV- I 型和 HSV- II 型两个血清型

**答案：A**

77. 可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

A: 维生素 A

B: 复合维生素 B

C: 维生素 C

D: 维生素

**答案：B**

78. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

A: 丙戊酸钠的不良反

B: 卡马西平的不良反

C: 停用了苯妥英钠

D: 糖尿病病情进展

**答案：A**

79. 以下所列物质中，一旦误服中毒，忌用硫酸镁导泻的是

A: 磷化锌等灭鼠药

B: 香豆素类灭鼠药

C: 拟除虫菊酯类杀虫药

D: 有机氮类杀虫药

**答案：A**

80. (2019 年真题) 某批次青霉素钠原料 1mg 相当于 1670 单位效价，生产规格为 80 万 U/支的青霉素钠产品，每支所需的装量是

A: 2.088mg

B: 1.33g

C: 1.33mg

D: 0.48g

**答案: D**

81. 下列药物中，属于弱阿片类药物的为

A: 美沙酮

B: 吗啡

C: 曲马多

D: 哌替啶

**答案: C**

82. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是：

A: 很可能

B: 肯定

C: 可能

D: 可能无关

**答案: A**

83. 《中华人民共和国药典》、国家食品药品监督管理局颁布标准收载的处方属于

A: 普通处方?

- B: 医师处方?
- C: 法定处方?
- D: 急诊处方?

**答案: C**

84. 重度贫血，Hb 为 ( )

- A: 90~120g/L
- B: 60~90g/L
- C: 60~120g/L
- D: 小于 60g/L

**答案: D**

85. 丙烯腈、氟化物、一氧化碳、重金属等中毒的特殊解毒剂

- A: 谷胱甘肽
- B: 纳洛酮
- C: 二巯丁二钠
- D: 乙酰半胱氨酸

**答案: A**

86. 某女性，45 岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5 个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

- A:  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂
- B: 胰岛素
- C: 磺脲类降糖药
- D: 双胍类降糖药

**答案: D**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

87. 可减弱华法林抗凝作用的药物为

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/445010041120012033>