2024江西省吉水县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试及答案1套

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.（2019年真题）患者，男，56岁，因出现面色苍白、乏力、肢体麻木、共济失调等症状就诊，查体:舌面光滑，呈“牛肉样舌”。化验结果提示血清叶酸和维生素B12水平下降，下列药物中不会影响维生素B12吸收的是

A: 氨氯地平

B: 二甲双胍

C: 奥美拉唑

D: 对氨基水杨酸

答案：A

2.具有吸附力，对氰化物无效的洗胃液是

A: 活性炭混悬液

B: 1：5000高锰酸钾

C: 淀粉溶液

D: 3%鞣酸溶液

答案：A

3.可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A: 形成答案并以口头形式提供给询问者

B: 对问题进行确定并归类

C: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

D: 随访了解效果，并建立档案

答案：D

4.患者，女，55岁，患骨质疏松症伴食管裂孔疝，该患者避免使用的治疗药是

A：鲑鱼降钙素

B：特立帕肽

C：雷洛昔芬

D：阿仑膦酸钠

答案：D

5.我国高警示药品推荐目录(2015版)中，新遴选列入的药品种类是

A：透皮贴剂

B：茶碱类药物(静脉途径)

C：中药注射剂

D：肠内营养制剂

答案：B

6.治疗皮肤疾病，最适宜选用的给药途径是

A：口服给药

B：直肠给药

C：吸入给药

D：局部给药

答案：D

7.（2021年真题）避免与辛伐他汀合用的药物是（）

A：头孢哌酮

B：美罗培南

C：克拉霉素

D：万古霉素

答案：C

8.（2017年真题）可能影响儿童骨骼发育的药物是（）

A：头孢克洛

B：诺氟沙星

C：阿莫西林

D：复方磺胺甲噁唑

答案：B

9.儿科用药中，最方便、最安全、最经济的给药途径是

A：静脉滴注

B：口服给药

C：肌内注射

D：静脉注射

答案：B

10.延缓或降低抗药性的联合用药是

A：普萘洛尔联用硝苯地平降血压

B：磷霉素联用其他抗菌药物

C：头孢哌酮/舒巴坦复方制剂

D：硫酸阿托品联用吗啡

答案：B

11.可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是()

A：对氨基水杨酸钠

B：乙胺丁醇

C：异烟肼

D: 链霉素

答案：B

12.可引发周围神经疾病，需同服维生素 B6 进行防止

A: 利福平

B: 异烟肼

C: 链霉素

D: 乙胺丁醇

答案：B

13.随机对照临床试验结果属于循证医学证据级别的

A: 2 级证据

B: 1 级证据

C: 3 级证据

D: 4 级证据

答案：B

14.形似或声似的药品要加用醒目的标识，是针对

A: 配备足够的人力

B: 环境整齐、安静

C: 规范操作、坚持核对

D: 及时沟通

答案：B

15.（2017 年真题）慢性阻塞性肺病稳定期患者（FEV1<50%）宜选用的治疗方案是（）

A: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

B: 长效 β2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

C: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

D: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

16.牙齿黄染及牙釉质发育不全

A: 米诺环素

B: 氯霉素

C: 庆大霉素

D: 阿奇霉素

答案：A

17.患者男，55岁，BMI28，2型糖尿病5年，伴有高脂血症，应首选的降糖药是

A: 罗格列酮?

B: 二甲双胍?

C: 格列本脲?

D: 阿卡波糖?

答案：B

18.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

A: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

B: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，其药理效应增强

C: 慢乙酰化者服用异烟肼后，其半衰期延长至2～4.5h

D: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

答案：D

19.毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A: 药用炭吸附

B: 依地酸钙钠解救铅中毒

C: 弱碱中和强酸

D: 二巯丙醇"驱汞"治疗

答案：A

20.患者，男，身高180cm，体重90kg，腰围100cm，其体重指数(BMI)是()

A: 27.8

B: 30.2

C: 20

D: 18

答案：A

21.竞争自肾小管排泄、延长半衰期的是

A: 多潘立酮+维生素C

B: 西咪替丁+格列本脲

C: 四环素+硫酸亚铁

D: 青霉素+丙磺舒

答案：D

22.减少不良反应的配伍用药是

A: 纳洛酮用于解救吗啡中毒

B: 应用地高辛与氢氯噻嗪

C: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性

D: 阿托品联用吗啡镇痛

答案：D

23.一些药物的副作用是嗜睡、眩晕、视力模糊或定向力障碍等；为安全起见驾驶员应该

A: 开车前 4 小时慎用

B: 开车前 4 小时服用

C: 开车前 2 小时服用

D: 开车前 2 小时慎用

答案：A

24.含有马兜铃酸的中药，可引起的典型药源性疾病是

A: 溶血性贫血

B: 粒细胞减少症

C: 慢性肾衰竭

D: 消化性溃疡

答案：C

25.由服用利尿药所引起的尿失禁属于

A: 真性尿失禁

B: 急迫性尿失禁

C: 压力性尿失禁

D: 急性、可逆性/暂时性尿失禁

答案：D

26.患者，男，50岁，主诉咳嗽，症状持续8天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期未患其他疾病。患者14岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温37．1℃、心率70次／分、血压130／70mmHg、呼吸18次／分，动脉血氧饱和度为98%，肺部可闻及喘鸣音。

A：社区获得性肺炎

B：肺结核

C：急性支气管炎

D：肺气肿

答案：C

27.清洁手术的预防用药时间不超过

A：12小时

B：6小时

C：24小时

D：48小时

答案：C

28.癫痫持续状态的首选治疗方法为

A：乙琥胺口服

B：苯巴比妥肌内注射

C：地西泮静脉注射’

D：苯妥英钠静脉注射

答案：C

29.解救慢性重症铅性脑病患者给予

A: 糖皮质激素
B: 补充蛋白质
C: 卫生教育
D: 驱铅治疗
答案：A

30.沟通时多使用服务用语、通俗易懂的语言、短句子和开放式提问方式
A: 关注特殊人群
B: 认真聆听
C: 注意语言的表达
D: 注意掌握时间
答案：C

31.肠外营养1g氮能提供的热量是
A: 3kcal
B: 4kcal
C: 9kcal
D: 7kcal
答案：B

32.（2018年真题）患者,女,50岁,近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状,临床诊断为围绝经期综合征,在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况不属于禁忌证但属于慎用的是（）
A: 乳腺增生
B: 耳硬化症
C: 近6月内患活动性静脉栓塞性疾病
D: 严重肝功能障碍

答案：A

33.影响药酶代谢、增强药物作用而危及安全用药的是

A：多潘立酮+维生素 C

B：青霉素+丙磺舒

C：西咪替丁+格列本脲

D：四环素+硫酸亚铁

答案：C

34.旅行者轻中度腹泻宜选用

A：山莨菪碱

B：双歧三联活菌制剂

C：胰酶

D：洛哌丁胺

答案：D

35.老年 CAP 患者。不能选用的治疗药物是

A：大环内酯类

B：氟喹诺酮类

C：第三代头孢菌素

D：碳青霉烯类

答案：B

36.（2018 年真题）患者,男,58 岁,体重 68kg,高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰，伴发热,入院查体 BP：120/80mmHg,T38.9℃。化验结果:白细胞计数 14.6×109L,中性粒细胞百分比 86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

A：头孢他啶

B: 头孢曲松

C: 哌拉西林

D: 阿奇霉素

答案：A

37.特布他林平喘的主要机制是

A: 激动肾上腺素 β2 受体

B: 抑制白三烯受体

C: 阻断腺苷受体

D: 拮抗 M 胆碱受体

答案：A

38.餐后 0.5～1 小时给药的是

A: 胰岛素

B: 二甲双胍

C: 瑞格列奈

D: 阿卡波糖

答案：B

39.在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

A: 尽量避免使用专业术语

B: 尽量提供更多的信息

C: 可提供一些宣传资料

D: 认真聆听

答案：B

40.过敏性疾病患者可出现

A: 血小板增多

B: 红细胞/血红蛋白减少

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 中性粒细胞增多

答案：C

41.患者男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 氯吡格雷

B: 利伐沙班

C: 华法林

D: 肝素

答案：A

42.长期大量应用容易导致体重明显增加的是

A: 盐酸异丙嗪

B: 氯雷他定

C: 色甘酸钠

D: 酮替芬

答案：D

43.有机磷中毒的解救药物是()

A: 氟马西尼

B: 乙酰半胱氨酸

C: 硫代硫酸钠

D: 阿托品+碘解磷定

答案：D

44.服用两咪替丁等H2受体阻断剂、地西泮等苯二氮䓬类药物应该禁用的是

A：烟

B：酒

C：浓茶

D：食醋

答案：A

45.用药期间粪便呈橘红至红色的药物是

A：利福平

B：氢氧化铝制剂

C：硫酸钡

D：水杨酸钠

答案：A

46.由医师和药师加强指导来减少

A：护士执行医嘱差错

B：医师处方差错

C：药师调配处方差错

D：患者执行医嘱差错

答案：D

47.伏立康唑体内代谢的主要肝药酶是（）

A：CYP2C19

B：CYP2B6

C：CYP2C9

D：CYP1A2

答案：A

48.药物代谢酶系不成熟或分泌不足，2周后肝功能趋于完备可影响

A：药物代谢

B：药物吸收

C：药物中毒

D：药物排泄

答案：A

49.患者术后，给予肠外营养液10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳250ml、8．5%复方氨基酸750ml、水溶性维生素10ml、脂溶性维生素10ml、微量元素10ml、10%氯化钠注射液40ml、10%氯化钾注射液30ml

A：200kcal

B：450kcal

C：1150kcal

D：700kcal

答案：B

50.患者，男，57岁，查体：心率54次/分，既往患有痛风。近期体检发现高血压，未服药时血压维持在150／95mmHg左右，建议服药控压，适宜该患者的降压药是

A：哌唑嗪

B：氢氯噻嗪

C：美托洛尔

D：氯沙坦

答案：D

51.可引起头晕、失眠、抑郁、幻觉、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘的兴奋剂是

A: 精神刺激剂

B: B受体阻断剂

C: 人生长激素

D: 蛋白同化激素

答案：B

52.患者，男性，36岁，主因“反复上腹部疼痛3年，加重伴黑便2天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院3年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前2天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排3次，每次约2509左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36．2℃、P84次／分、R20次／分、BP110／70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音3～5次／分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有-1．5cm×2cm椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 尿素酶试验

B: 粪便隐血试验

C: 尿素呼气试验

D: 尿酮体试验

答案：C

53.抑制胃酸分泌作用的药物是

A：西沙必利

B：奥美拉唑

C：碳酸氢钠

D：莫沙必利

答案：B

54.重度贫血，Hb为（）

A：60~120g/L

B：90~120g/L

C：60~90g/L

D：小于60g/L

答案：D

55.男性红细胞沉降率的正常范围值

A：0～20mm/h

B：0～5mm/h

C：0～15mm/h

D：0～10mm/h

答案：C

56.下列药源性疾病中，其诱因主要是“基础疾病因素”的是

A：肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病

B：月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

C：假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

D：新生儿体内蓄积氯霉素呈现灰婴综合征

答案：A

57.巴比妥类药物重度中毒的表现是

A：呼出气体中可有苦杏仁气味

B：意识障碍、昏迷

C：恶心、呕吐、视力模糊

D：抽搐反复发作

答案：B

58.乙型肝炎病毒感染后在血清里最早出现的是

A：HBsAg

B：HBcAb

C：HBsAb

D：HBeAb

答案：D

59.治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

A：青霉素

B：红霉素

C：头孢唑林

D：莫西沙星

答案：B

60.可引起溶血性贫血的药物是

A：氯霉素

B：阿糖胞苷

C：氯丙嗪

D：地塞米松

答案：C

61.适用于阿司匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

A: 异丙托溴铵气雾剂

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 孟鲁司特钠咀嚼片

D: 茶碱片

答案：C

62.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛：血常规见WBC15X109／L，中性粒细胞百分比85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

B: 首选针对革兰阳性菌的药物

C: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

D: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素

答案：B

63.主要药物代谢酶系活性接近成人，对多数药物具有足够的代谢能力，即

A: 药物分布

B: 药物吸收

C: 药物代谢

D: 药物排泄

答案：C

64.春季卡他性结膜炎适宜选用

A: 2%色甘酸钠滴眼液

B: 利巴韦林滴眼液

C：碘苷滴眼液

D：妥布霉素滴眼液

答案：A

65.当患者因氯丙嗪中毒需要解救时，针对血压过低应采用的最佳治疗药物是

A：苯丙胺

B：多巴胺

C：去甲肾上腺素

D：肾上腺素

答案：C

66.引起药源性肾病的药物,阿昔洛韦可导致

A：肾间质纤维化

B：前列腺素合成障碍

C：肾小管阻塞

D：直接肾毒性

答案：C

67.下列药物服用后可引起嗜睡，对驾车、高空作业或操作机器者宜慎用的是

A：右美沙芬

B：喷托维林

C：苯丙哌林

D：可待因

答案：A

68.用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

A：二甲双胍

B：西格列汀

C：格列吡嗪

D：阿卡波糖

答案：C

69.下列关于失眠药物治疗策略的说法,正确的是()

A：失眠继发于或伴发于其他疾病时,应同时治疗原发或伴发疾病

B：药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

C：焦虑症患者存在失眠时以失眠药物为主

D：原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮?类抗失眠药

答案：A

70.遭遇蛇类咬伤，最先采取的应急措施是

A：用绳索等在伤口的近心端捆扎

B：用布带等在伤口的近心端5cm处捆住

C：就地取材在伤口的远心端捆扎

D：就地取材将伤口捆扎

答案：B

71.（2021年真题）患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A：肾损害

B：便秘

C：共济失调

D: 口干

答案：A

72.发热在应用解热镇痛药时，老年人的用药时间间隔是

A: 3～5小时

B: 2～5小时

C: 4～6小时

D: 3～6小时

答案：C

73.（2017年真题）良性前列腺增生症老年患者应用α1肾上腺素能受体阻断治疗时可能导致的不良反应是（）

A: 干咳

B: 乳腺增生

C: 尿潴留

D: 体位性低血压

答案：D

74.处方按性质可分为

A: 普通处方、协定处方

B: 法定处方、麻醉药品处方

C: 法定处方、医师处方

D: 法定处方、普通处方

答案：C

75.下列治疗蛔虫病的药物中，以对肠道寄生虫具有神经一肌肉阻滞作用而显效的是

A: 噻苯达唑

B: 噻嘧啶

C: 阿苯达唑

D: 甲苯咪唑

答案：B

76.布噻嗪属于

A: 抗组胺药

B: 血管扩张药

C: 镇痛药

D: 利尿剂

答案：D

77.(联合用药)普通感冒患者应用抗病毒药+抗生素属于

A: 超适应证用药

B: 非适应证用药

C: 过度治疗用药

D: 超剂量用药

答案：B

78.患者，男，12岁，因纳差、恶心、呕吐、腹泻就诊，主诉里急后重，每小时排便3～4次，水样便，初步诊断为急性感染性腹泻，处方如下：

A: 存在给药时间不合理

B: 存在重复用药

C: 存在禁忌人群用药

D: 存在适应证不适宜用药

答案：C

79.能诱导肝药酶CYP2C19的药物是

A：地塞米松

B：卡马西平

C：西咪替丁

D：苯妥英钠

答案：A

80.以下医学检查项目中，主要用于诊断急性胰腺炎的是

A：肌酸激酶增高

B：血淀粉酶

C：尿淀粉酶

D：淀粉酶增高

答案：D

81.可能导致血小板(PLT)计数减少的药物是

A：胰岛素

B：氯氮平

C：苯妥英钠

D：阿司匹林

答案：D

82.脂溶性维生素吸收减少，是由于

A：肾功能随年龄增长而减退

B：肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长

C：胆汁分泌缺乏

D：脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低

答案：C

83.抽烟可降低呋塞米的利尿作用，其主要原因是烟草中含有

A：焦油

B：烟碱

C：醛类成分

D：咖啡因

答案：B

84.可与茶叶中的鞣酸结合产生沉淀，饮茶会影响其吸收的药物是

A：对乙酰氨基酚

B：硫酸亚铁

C：地西泮

D：硝苯地平

答案：B

85.阿卡波糖片的适宜服药时间是

A：餐后

B：餐中

C：餐前

D：清晨

答案：B

86.稳定型心绞痛缓解期的治疗选用

A：硝酸甘油

B：阿司匹林

C：低分子肝素

D：氯贝丁酯

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/445332123114012033