

预防医学考试试题库含答案

1、收集某医院的资料，计算各种疾病所占的比例，该指标为（ ）

- A、发病率
- B、构成比
- C、相对比
- D、患病率
- E、比值

答案：B

2、如要确定儿童血液中微量元素锌含量的正常值的范围，宜采用的流行病学研究方法是

- A、现况调查
- B、病例对照研究
- C、队列研究
- D、临床研究
- E、实验研究

答案：A

3、某厂发生食物中毒，9 名患者潜伏期分别为：16、2、6、3、30、2、10、2、24+(小时)，该食物中毒的平均潜伏期为（ ）（小时）用中位数法找：当观察值中出现个别特效或特大的数值，资料的一端或两端无确定数值，分布不明确等使用

- A、5
- B、5. 5
- C、6
- D、10
- E、12

答案：C

4、下列哪种疾病不属于生物地球化学性疾病

- A、克山病
- B、氟斑牙
- C、黑脚病
- D、水俣病
- E、克汀病

答案：D

5、归因危险度是指：

- A、暴露组发病或死亡率与非暴露组发病或死亡率的比值

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

- B、暴露组发病或死亡率与非暴露组发病或死亡率之差
- C、暴露因素所致的发病或死亡率占暴露者发病或死亡率的百分比
- D、某病全人群发病或死亡率与非暴露者中某病发病或死亡率之差
- E、人群暴露者中由于暴露某因素所致的发病或死亡率占暴露者全部发病或死亡率的百分比

答案：B

6、均数的标准误大小，叙述正确的是

- A、与 σ 的大小成正比，与 nn 为样本含量成反比
- B、与 σ 的大小成反比，与 nn 为样本含量成正比
- C、与 σ 的大小成反比，与 $\sqrt{nn}$ 为样本含量成正比
- D、与 σ 的大小成正比，与 $\sqrt{nn}$ 为样本含量成反比
- E、与 σ 的大小成正比，与 $\sqrt{nn}$ 为样本含量成正比

答案：D

7、健康管理不具有的特点是

- A、标准化
- B、系统化
- C、可量化
- D、个体化
- E、封闭化

答案：E

8、处于任何危险度级别的高血压病人都应该接受

- A、行为生活方式的调整
- B、药物治疗
- C、手术治疗
- D、卧床休息
- E、以上都是

答案：A

9、某高血压患者，男，45岁，他在管理自己疾病方面，以上做法不正确的是

- A、定期去就诊
- B、学会控制情绪变化
- C、购买血压计
- D、辞职在家养病
- E、积极锻炼

答案：D

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

10、描述性研究主要适用于（）

- A、病因研究
- B、疾病分布调查
- C、预防效果调查
- D、疾病危险因素研究
- E、疾病自然史研究

答案：B

11、标准差越大的意义，下列认识中正确的是（）

- A、观察个体之间变异越大
- B、观察个体之间变异越小
- C、样本的变异可能越大
- D、样本对总体的代表性可能越差
- E、总体的抽样误差可能越小

答案：A

12、频数分布的特征包括

- A、集中趋势
- B、最大值
- C、离散趋势
- D、最小值
- E、A 和 C 都是

答案：E

13、下列影响人群易感性的因素中，不能使易感性升高的是

- A、新生儿增加
- B、易感人口迁入
- C、免疫人口死亡
- D、原先免疫过的人口免疫力自然消退
- E、传染病的发生和流行

答案：E

14、某单位调查了 1000 人的乙型肝炎表面抗原(HBSAg)的携带情况，其中 45 人阳性。该调查最合适的流行病学描述指标是：

- A、发病率
- B、患病率
- C、感染率
- D、死亡率
- E、续发率

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

答案：C

15、关于吸烟，说法错误的是

A、我国烟草生产和消费均占全球 1/3 以上

B、可导致高密度脂蛋白升高，低密度脂蛋白降低高密度脂蛋白血脂中的胆固醇与血液中的蛋白结合形成高密度脂蛋白和低密度脂蛋白，高密度脂蛋白可以从组织中提取胆固醇将其转运至肝脏，在肝脏中结合胆汁酸排出体外。与冠心病呈负相关，低密度脂蛋白将血脂送至血管内皮细胞中，以维持细胞正常的生理活动，增加血液的粘稠度

C、可使体内处于慢性缺氧状态

D、可引起血管内皮细胞损伤

E、可加速动脉硬化

答案：B

16、标准误越大，则表示此次抽样得到的样本均数（）。

A、系统误差越大

B、可靠程度越大

C、抽样误差越大

D、可比性越差

E、离散程度越大

答案：C

17、美国人 1954 年实施了旨在评价索尔克（Salk）疫苗预防小儿麻痹或死于脊髓灰质炎效果的临床试验，最终肯定了索尔克疫苗的效果。问此结论是针对（）而言

A、180 万儿童

B、每个儿童

C、所有使用索尔克疫苗的儿童

D、所有儿童

E、180 万儿童中随机化的 1/4

答案：C

18、要反映某一城市连续五年甲肝发病率的变化情况，应选用

A、直条图

B、直方图

C、普通线图

D、百分条图

E、圆形构成图

答案：C

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

19、关于相对数, 下列哪一个说法是错误的

- A、相对数是两个有联系的指标之比
- B、常用相对数包括相对比, 率与构成比
- C、计算相对数时要求分母要足够大
- D、率与构成比虽然意义不同, 但性质相近,
- E、计算相对数时要求分母要足够大

答案: D

20、关于现况调查, 以下说法错误的是

- A、描述疾病的分布特征
- B、进行社区诊断
- C、发现高危人群
- D、验证病因假设
- E、作为疾病监测的一种经常性手段

答案: D

21、频数分布的特征包括

- A、集中趋势
- B、最大值
- C、离散趋势
- D、最小值
- E、A 和 C 都是

答案: E

22、传染源一般包括

- A、患者
- B、患者、病原携带者
- C、患者、病原携带者、受感染动物
- D、患者、病原携带者、受感染动物、易感人群
- E、患者、病原携带者、受感染动物、易感人群、易感动物

答案: C

23、健康管理的首要步骤是

- A、收集健康信息
- B、疾病危险性评价
- C、健康改善计划的制订
- D、健康改善计划的实施
- E、疾病风险预测

答案: A

24、以下哪项不属于糖尿病的一级预防

- A、对糖尿病高危人群进行糖尿病知识的讲座
- B、提倡健康的生活方式
- C、多静坐，少运动
- D、建议肥胖人群控制体重
- E、合理的膳食

答案：C

25、用校正四格表 χ^2 检验计算公式的条件是

- A、实际数均 ≥ 5
- B、理论数均 > 5
- C、实际数 ≥ 5 和样本总例数 ≥ 40
- D、有出现 $5 > \text{理论数} \geq 1$ 的格子，且样本总例数 ≥ 40
- E、以上都不对

答案：D

26、临床预防服务内容中成本效果最好的是

- A、健康咨询与教育
- B、健康筛检
- C、免疫接种
- D、化学预防
- E、以上均不对

答案：A

27、 χ^2 检验统计推断的用途不包括

- A、两个分类指标是否有关联
- B、两个均数的差别是否有统计学意义
- C、两个率或构成比的差别是否有统计学意义
- D、多个率或构成比的差别是否有统计学意义
- E、某指标是否不符合某种特定的分布类型

答案：B

28、以下属于主动免疫的是

- A、服用乙胺嘧啶预防疟疾
- B、注射抗体
- C、注射细胞因子
- D、注射免疫血清球蛋白制剂
- E、注射疫苗

答案：E

29、光化学烟雾可致

- A、急性中毒
- B、慢性中毒
- C、致癌作用
- D、致畸作用
- E、致突变作用

答案：A

30、以下不属于定量资料的是

- A、体质指数体重/身高²
- B、白蛋白与球蛋白比值
- C、细胞突变率%
- D、中性核细胞百分比%
- E、中学生中吸烟人数

答案：B

31、完全随机设计的两样本均数比较，其无效假设（H₀）可以是（ ）

- A、 $\mu_1 = \mu_2$
- B、 $\mu_1 \neq \mu_2$
- C、 $\mu_1 \geq \mu_2$
- D、 $\mu_1 \leq \mu_2$
- E、 $\pi_1 = \pi_2$

答案：A

32、土壤污染的来源不包括（ ）

- A、大气污染物
- B、工业废水和生活废水
- C、固体废弃物
- D、化肥及农药的使用
- E、地质环境中区域性差异导致土壤中某些元素过高

答案：E

33、下列哪种疾病不属于慢性非传染性疾病

- A、心脑血管疾病
- B、肿瘤
- C、糖尿病
- D、外伤
- E、血脂异常

答案：D

34、自由度为 1 的 χ^2 检验是

- A、成组设计四格表资料 χ^2 检验
- B、配对设计四格表资料 χ^2 检验
- C、成组设计四格表资料 χ^2 检验或配对设计四格表资料 χ^2 检验
- D、2 行多列的行 $\times$ 列表资料的 χ^2 检验
- E、多行 2 列的行 $\times$ 列表资料的 χ^2 检验

答案：C

35、说明两个有关联的同类指标的比即为

- A、率
- B、相对比
- C、构成比
- D、频率
- E、频数

答案：B

36、下列危险因素不可预防的是

- A、高血压
- B、糖尿病
- C、吸烟
- D、高血压家族史
- E、缺乏体育锻炼

答案：D

37、假设检验中的第二类错误是指（ ）

- A、拒绝了实际上成立的 H_0
- B、不拒绝实际上成立的 H_0
- C、拒绝了实际上成立的 H_1
- D、不拒绝实际上不成立的 H_0
- E、拒绝 H_0 时所犯的错误

答案：D

38、表达某地 2000 年和 2010 年三种疾病的患病率可用。

- A、直方图
- B、百分直条图
- C、单式直条图
- D、复式直条图
- E、线图

答案：D

39、描述某地某地 210 名健康成人发汞含量的分布，宜绘制

- A、条图
- B、直方图
- C、线图
- D、百分条图
- E、统计地图

答案：B

40、SO₂ 是大气中主要污染物，其主要来源

- A、石油
- B、煤
- C、汽油
- D、天然气
- E、柴油

答案：B

41、土壤的卫生防护原则不包括（ ）

- A、杀灭土壤中的所有微生物和寄生虫卵
- B、实行粪便、垃圾无害化处理
- C、对含有毒物的污水进行净化，回收处理
- D、合理使用农药化肥
- E、治理工业废渣

答案：A

42、拟调查某地人群高血压的现患率，可采用的研究方法是

- A、病例对照研究
- B、队列研究
- C、实验研究
- D、现况研究
- E、理论研究

答案：D

43、观察意外死亡在不同年份的变化趋势，宜选择的图形为（ ）

- A、直条图
- B、普通线图
- C、圆图
- D、半对数线图
- E、直方图

答案：B

不飞则已，一飞冲天；一鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

44、卡方检验中自由度的计算公式是

- A、行数 $\times$ 列数
- B、 $n-1$
- C、 $n-k$
- D、 $(\text{行数}-1)(\text{列数}-1)$
- E、行数 $\times$ 列数 -1

答案：D

45、环境污染的概念是（ ）

- A、排入环境中的废弃物的数量或浓度超过了环境的自净能力
- B、排入环境中的废弃物造成了环境质量下降和恶化
- C、排入环境中的废弃物影响了人体健康
- D、A+B
- E、A+B+C

答案：E

46、李某在某市开了一家饭店，饭店的碗筷每次用后都进行消毒，这种对餐具的消毒属于

- A、终末消毒
- B、疫源地消毒
- C、随时消毒
- D、预防性消毒
- E、化学消毒

答案：D

47、如用病例对照研究检验“经常闯红灯的驾驶者发生交通事故概率高”这一假说，合适的对照是

- A、未发生交通事故的驾驶者
- B、未闯红灯的驾驶者
- C、闯过红灯但未发生过交通事故的驾驶者
- D、未闯红灯也发生过交通事故的驾驶者
- E、未闯过红灯也未发生过交通事故的驾驶者

答案：A

48、在 1962 年和 1952 年英国伦敦两次烟雾事件中发生多种急慢性疾病，其中起主要作用的污染物是（ ）。

- A、 SO_2
- B、烟尘
- C、 NO_x

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/446024034030011025>