

2024 年河南省封丘县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题真题题库带答案 (新)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 属于叶酸类抗代谢类药物的是()

- A: 甲氨蝶呤
- B: 巯嘌呤
- C: 长春瑞滨
- D: 吉西他滨

答案: A

2. (2015 年真题) 属于超强效的外用糖皮质激素是 () 。

- A: 地塞米松
- B: 曲安奈德
- C: 卤米松
- D: 氢化可的松

答案: C

3. 口服治疗体癣，毛发癣，对深部真菌无效的药物是()

- A: 环丙沙星
- B: 灰黄霉素
- C: 克霉唑
- D: 咪康唑

答案: B

4. 洛伐他汀的作用是()

- A: 影响脂蛋白合成、转运及分解
- B: 主要影响胆固醇吸收
- C: 主要影响甘油三酯合成
- D: 主要影响胆固醇合成

答案：D

5. 铁剂用于治疗

- A: 溶血性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 小细胞低血红蛋白性贫血
- D: 巨幼红细胞性贫血

答案：C

6. 与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括()

- A: 给药较方便，可以为抢救患者赢得时间
- B: 具有较强的、特异的纤维蛋白选择性
- C: 全身纤溶活性大于链激酶、阿替普酶
- D: 血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便

答案：C

7. 室上性心动过速、颅脑损伤、颅内占位性病变、慢性阻塞性肺疾病患者禁用()。

- A: 哌替啶
- B: 芬太尼
- C: 吗啡
- D: 曲马多

答案：A

8. 金刚烷胺与阿托品合用

- A: 增加锥体外系不良反应的风险
- B: 增加肾毒性
- C: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- D: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

答案：C

9. 格列齐特是

- A: 长效类胰岛素
- B: 中效类胰岛素
- C: 磺酰脲类
- D: α -葡萄糖苷酶抑制剂

答案：C

10. (2020 年真题) 口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

- A: 伐昔洛韦
- B: 泛昔洛韦
- C: 昔多福韦
- D: 喷昔洛韦

答案：A

11. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 双嘧达莫
- B: 替格瑞洛

C: 利伐沙班

D: 氯吡格雷

答案: C

12. 关于法莫替丁用药注意事项的说法, 错误的是

A: 抑制肝脏细胞色素 P450 酶的活性, 从而影响茶碱、华法林、地西泮等药物的代谢

B: 以原形从肾脏排泄, 肾功能不全患者易造成药物在体内蓄积

C: 与西咪替丁相比, 对性激素的影响较轻

D: 肾功能不全患者需要减少给药剂量或延长给药间隔

答案: A

13. 属于促血小板生成药的是

A: 甲萘氢醌

B: 酚磺乙胺

C: 氨甲环酸

D: 艾曲泊帕乙醇胺

答案: D

14. 下列哪项不能提高镇静催眠药用药安全性

A: 应尽量避免长期使用同一种镇静催眠药

B: 服用后应避免高速高空作业

C: 镇静催眠药可交替使用

D: 与易成瘾的药物合用不会产生依赖性

答案: D

15. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 急性肝衰竭
- B: 高血压危象
- C: 红人综合征
- D: 血糖异常

答案：A

16. 抑制胸腺核苷酸合成酶

- A: 羟基脲
- B: 甲氨蝶呤
- C: 阿糖胞苷
- D: 氟尿嘧啶

答案：D

17. 与鲑降钙素合用，有可能急速降血钙，出现严重低钙血症的是

- A: 钙剂
- B: 维生素 D
- C: 铁剂
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

18. 具有阿片样作用，长期大量服用可产生欣快感，并可能出现药物依赖性的止泻药是()

- A: 蒙脱石散
- B: 洛哌丁胺

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 地芬诺酯

D: 乳果糖

答案：C

19. 以下药物中，不属于眼用局麻药的是()

- A: 利多卡因
- B: 丁卡因
- C: 阿托品
- D: 奥布卡因

答案：C

20. 高血压伴变异型心绞痛宜选用

- A: 硝苯地平
- B: 尼莫地平
- C: 利血平
- D: 普萘洛尔

答案：A

21. 长期应用不但加速自身代谢，而且可加速其他合用药物代谢的肝药酶诱导剂是()。

- A: 苯巴比妥
- B: 佐匹克隆
- C: 唑吡坦
- D: 地西泮

答案：A

22. (2020 年真题) 下列药动学/药效学 (PK/PD) 参数中，适用于浓度依赖型抗菌药物的评估指标

- A: 血浆药时曲线下面积与血浆达峰时间比值 (AUC/T_{max})
- B: 血浆药物峰浓度与达峰时间比值 (C_{max}/T_{max})

C: 血浆药物半衰期 ($t_{1/2}$)

D: 血浆药物峰浓度与最低抑菌浓度比值 (C_{max}/MIC)

答案: D

23. 异烟肼联用氢氧化铝使

A: 吸收减少

B: 疗效减弱

C: 肝毒性增加

D: 月经不规则

答案: A

24. 耐酸耐酶的青霉素是

A: 双氯西林

B: 氨苄西林

C: 羧苄西林

D: 青霉素 V

答案: A

25. 糖尿病合并心血管疾病者可选用()

A: 格列喹酮

B: 格列齐特

C: 胰岛素

D: 格列吡嗪

答案: D

26. 属于孕激素类的是()

A: 己烯雌酚

B: 睾酮

C: 他莫昔芬

D: 甲地孕酮

答案: D

27. 属于长效 β

A: 沙美特罗

B: 多索茶碱

C: 沙丁胺醇

D: 布地奈德

答案: A

28. 糖皮质激素的适应证，不包括

A: 系统性红斑狼疮

B: 再生障碍性贫血

C: 活动性肺结核

D: 风湿性关节炎

答案: C

29. 使血小板内环磷酸腺苷(cAMP)增多的抗血小板药物是

A: 替格瑞洛

B: 双嘧达莫

C: 替罗非班

D: 阿司匹林

答案: B

30. 下述药物用于治疗消化性溃疡时，不属于抑制胃酸分泌的药物是

A: 氢氧化铝

B: 奥美拉唑

C: 泮托拉唑

D: 雷尼替丁

答案: A

31. (2018 年真题) 可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化, 用于痛风急性发作的药物是 ()

A: 别嘌醇

B: 非布索坦

C: 秋水仙碱

D: 苯溴马隆

答案: C

32. 高浓度使细胞膜的渗透性增加, 钾离子和其他内容物漏出, 细胞死亡的是

A: 特比萘芬

B: 制霉菌素

C: 环吡酮胺

D: 阿莫罗芬

答案: C

33. 适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的 2 型糖尿病患者的药物是

A: 瑞格列奈

B: 骨化三醇

C: 葡萄糖酸钙

D: 利拉鲁肽

答案: A

34. 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是

- A: 阿格列汀
- B: 利拉鲁肽
- C: 伏格列波糖
- D: 那格列奈

答案：B

35. 通过产生一氧化氮(NO)松弛血管平滑肌，以扩张静脉为主的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 双嘧达莫

答案：C

36. 硫脲类药物用于甲状腺功能亢进内科治疗的正确给药方式是

- A: 开始给小剂量，以后逐渐加大剂量，直至基础代谢率正常，改用维持量
- B: 开始给小剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量
- C: 开始给治疗量，基础代谢正常后继续给 3~6 个月停药
- D: 开始给大剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

答案：D

37. (2017 年真题) 眼部病毒感染宜选用 ()

- A: 氯霉素滴眼剂
- B: 托吡卡胺滴眼剂
- C: 碘苷滴眼剂
- D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：C

38. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 吉非替尼
- B: 紫杉醇
- C: 枸橼酸他莫昔芬
- D: 疏嘌呤

答案：C

39. 下列抗心律失常的药物中，有较明显肝代谢首关效应的是

- A: 普罗帕酮
- B: 胺碘酮
- C: 普鲁卡因胺
- D: 奎尼丁

答案：A

40. 碳青霉烯类药可使下列哪种抗癫痫药血浆药物浓度降低

- A: 拉莫三嗪
- B: 丙戊酸钠
- C: 卡马西平
- D: 苯巴比妥

答案：B

41. 治疗支原体肺炎、军团菌病、百日咳和白喉带菌者首选

- A: 庆大霉素
- B: 氯霉素
- C: 链霉素
- D: 红霉素

答案：D

42. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而起到抗抑郁作用的药物是 ()

- A: 度洛西汀
- B: 马普替林
- C: 吗氯贝胺
- D: 帕罗西汀

答案: D

43. 毒性低，但胃肠刺激症状较常见的药物是 ()

- A: 异烟肼
- B: 吡嗪酰胺
- C: 对氨基水杨酸
- D: 利福平

答案: C

44. 通过抑制 GABA 的降解或促进合成而达到抗癫痫作用的药物是

- A: 二苯并氮革类
- B: 乙内酰脲类
- C: γ -氨基丁酸类似物
- D: 脂肪酸类

答案: D

45. 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 曲妥珠单抗
- C: 长春新碱
- D: 环磷酰胺

答案: C

46. 属于润滑性泻药的是

- A: 欧车前
- B: 番泻叶
- C: 多库酯钠
- D: 利那洛肽

答案: C

47. 磺酰脲类降糖药的作用机制是

- A: 抑制胰岛素降解
- B: 提高胰岛 β 细胞功能
- C: 加速胰岛素合成
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案: D

48. (2021 年真题) 作为大手术、外伤或脓毒血症引起的严重肾功能衰竭以及急慢性肾功能衰竭患者肠外营养支持的药物是 ()

- A: 赖氨酸注射液
- B: 复方氨基酸注射液 (9AA)
- C: 丙氨酰谷氨酰胺注射液
- D: 复方氨基酸注射液 (18AA)

答案: B

49. 用于青春期前隐睾症的诊断和治疗的是

- A: 噻嘧啶
- B: 绒促性素
- C: 硝苯地平
- D: 米非司酮

答案：B

50. 维生素 B1 缺乏时出现

- A: 糙皮病
- B: 成人佝偻病
- C: 脚气病
- D: 夜盲症

答案：C

51. 关于糖皮质激素对血液成分影响的描述，错误的是

- A: 使红细胞和血红蛋白含量增加
- B: 降低纤维蛋白原浓度
- C: 使血小板增多
- D: 使中性白细胞数增多

答案：B

52. 高血压伴消化性溃疡患者不宜选用的药物是()

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 利血平
- D: 哌唑嗪

答案：C

53. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: CYP2D6
- B: CYP2C19
- C: CYP2E1

D: CYP286

答案：B

54. (2016 年真题) 可用于缓解绝经后更年期症状的药品是

A: 依普黄酮

B: 他莫昔芬

C: 地屈孕酮

D: 戊酸雌二醇

答案：D

55. (2018 年真题) 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

A: 甘精胰岛素注射液

B: 精蛋白锌胰岛素注射液

C: 预混胰岛素注射液

D: 普通胰岛素注射液

答案：D

56. 对组胺 H

A: 甲硝唑

B: 哌仑西平

C: 丙谷胺

D: 雷尼替丁

答案：D

57. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A: M 期

B: G1 期

C: G0 期

D: S 期

答案: D

58. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂

A: 硝苯地平

B: 地尔硫

C: 溴苄铵

D: 维拉帕米

答案: C

59. 具有磺胺类药物结构，作用于近曲小管的利尿药是

A: 螺内酯

B: 乙酰唑胺

C: 呋达帕胺

D: 氢氯噻嗪

答案: B

60. 不可用于降低眼压的药物是

A: 毛果芸香碱滴眼剂

B: 卡替洛尔滴眼剂

C: 拉坦前列素滴眼剂

D: 利福平滴眼剂

答案: D

61. 局部抗炎作用较弱的长效糖皮质激素是

A: 地塞米松

B: 氢化可的松

C: 倍他米松

D: 泼尼松

答案：A

62. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 痛风

B: 胃溃疡

C: 支气管哮喘

D: 骨关节炎

答案：D

63. 纳洛酮治疗的疾病或症状有

A: 阿片中毒

B: 失眠

C: 剧烈疼痛

D: 惊厥

答案：A

64. 糖尿病合并发热、感染者可选用()

A: 格列齐特

B: 胰岛素

C: 格列喹酮

D: 格列吡嗪

答案：B

65. 索他洛尔最严重的不良反应是

A: 呼吸困难

B: 心动过缓

C: 尖端扭转型室速

D: 头晕

答案: C

66. 糖皮质激素在临床上一般不用于

A: 中毒性感染

B: 全身性红斑狼疮

C: 支气管哮喘

D: 真菌感染

答案: D

67. 利多卡因的电生理作用错误的是

A: 明显影响动作电位 0 相

B: 提高心室颤动阈值

C: 缩短复极时间

D: 使传导减慢

答案: A

68. (2016 年真题) 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是

A: 利奈唑胺

B: 头孢他啶

C: 头孢曲松

D: 罗红霉素

答案: D

69. 阿托品在使用中应注意

A: 糖尿病患者避免使用

B: 对食管有刺激性，需整片吞服

C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

D: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

答案: D

70. 仅用于绝经后妇女,不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是()

A: 阿仑磷酸钠

B: 骨化三醇

C: 雷洛昔芬

D: 阿法骨化醇

答案: C

71. 以下避孕药不受月经周期限制的是

A: 双炔失碳酯

B: 去氧孕烯

C: 孕二烯酮

D: 左炔诺孕酮

答案: A

72. 关于替加环素的使用,错误的是

A: 8 岁以下儿童禁用替加环素

B: 肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整

C: 替加环素是 P—gp 的底物

D: 替加环素抑制 CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6 和 3A4 介导的药物代谢

答案: D

73. (2015 年真题)属于刺激性泻药的是 ()。

A: 聚乙二醇 4000

B: 乳果糖

C: 酚酞

D: 甘油（开塞露）

答案：C

74. 四环素联用钙剂使

A: 调整抗凝血药的剂量

B: 增加麦角中毒的风险

C: 口服吸收减少

D: 肝毒性增加

答案：C

75. （2017 年真题）可能导致牙龈出血的药物是（）

A: 普萘洛尔

B: 依诺肝素

C: 拉西地平

D: 普伐他汀

答案：B

76. 慢性肾上腺皮质功能减退症宜用

A: 氢化可的松

B: 泼尼松

C: 地塞米松

D: 倍他米松

答案：A

77. 下列不可用于治疗前列腺增生的是

A: 特拉唑嗪

B: 西地那非

C: 坦洛新

D: 非那雄胺

答案: B

78. 兼具抑菌作用、抑制痛觉神经和刺激腺体分泌的鼻用制剂是

A: 氟替卡松鼻喷剂

B: 鲑鱼降钙素鼻喷剂

C: 异丙托溴铵吸入剂润德教育

D: 复方薄荷脑滴鼻液

答案: D

79. 主要经胆汁排泄的抗生素是

A: 美洛西林

B: 头孢哌酮

C: 青霉素

D: 头孢甲肟

答案: B

80. 匹维溴铵在使用中应注意

A: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

B: 对食管有刺激性，需整片吞服

C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

D: 糖尿病患者避免使用

答案: B

81. 患者,男,67岁,为葡萄糖-6 磷酸脱氢酶缺乏症患者,如果使用复方磺胺甲噁唑,可能引发的药源性疾病是

A: 抗生素相关性腹泻

- B: 红人综合征
- C: 肌肉震颤
- D: 急性溶血性贫血

答案: D

82. 蛇毒血凝酶的给药方式不包括

- A: 静脉注射
- B: 肌肉注射
- C: 皮下注射
- D: 皮内注射

答案: D

83. 属于第四代喹诺酮类药物的是

- A: 诺氟沙星
- B: 莫西沙星
- C: 萘啶酸
- D: 吡哌酸

答案: B

84. 对呼吸无抑制的外周性镇咳药是

- A: 苯丙哌林
- B: 右美沙芬
- C: N-乙酰半胱氨酸
- D: 可待因

答案: A

85. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 双歧杆菌
- B: 嗜酸乳杆菌
- C: 梭状芽孢杆菌
- D: 粪肠球菌

答案：C

86. 人体内缺乏维生素 E 时会导致()

- A: 不孕症
- B: 夜盲症
- C: 佝偻病
- D: 脚气病

答案：A

87. 头孢类药物作用机制

- A: 抑制细菌蛋白质合成
- B: 干扰细菌核酸代谢
- C: 抑制细菌细胞壁合成
- D: 抑制细菌糖代谢

答案：C

88. 大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿液呈黄色

- A: 维生素 B
- B: 维生素 C
- C: 维生素 B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 维生素 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/446055015100011030>