

2024 年广西壮族自治区昭平县《执业药师之西药学专业二》资格考试真题（突破训练）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 高血压伴有肾功能不全者最好选用

- A: 卡托普利
- B: 胍乙啶
- C: 利血平
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

2. 可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻，具有固定和清除多种病原体和毒素药物是()

- A: 蒙脱石
- B: 洛哌丁胺
- C: 地芬诺酯
- D: 番泻叶

答案：A

3. 放射性碘

- A: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
- B: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- C: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- D: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

答案：C

4. 不属于糖皮质激素对代谢的影响的是

- A: 增强钙离子的吸收
- B: 增高肝糖原
- C: 升高血糖
- D: 提高蛋白质的分解代谢

答案：A

5. (2017 年真题) 主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是 ()

- A: 瑞舒伐他汀
- B: 利血平
- C: 依折麦布
- D: 阿昔莫司

答案：A

6. (2020 年真题) 痛风缓解期，抑制内源性尿酸生成的药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 苯溴马隆
- C: 非布司他
- D: 碳酸氢钠

答案：C

7. 患者，男，17 岁。拔牙 2 天后出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈。12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：T39℃，脉搏 89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音。实验室检查：WBC 28×10

- A: 痰细胞学检查
- B: 咳出的痰直接涂片

C: 通过环甲膜穿刺吸取痰液，进行痰涂片和需氧、厌氧菌检查

D: 咳出的痰进行细胞培养

答案：C

8. 下述关于甘油的描述，错误的是()

A: 属于渗透性泻药

B: 用于便秘的治疗

C: 孕妇慎用

D: 属于润滑性泻药

答案：A

9. (2021 年真题) 血培养结果为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，首选的抗菌药物是()

A: 头孢唑林

B: 青霉素 G

C: 左氧氟沙星

D: 万古霉素

答案：D

10. 合并重度感染的糖尿病应使用()

A: 阿卡波糖

B: 正规胰岛素

C: 二甲双胍

D: 那格列奈

答案：B

11. (2016 年真题) 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

- A: 依诺肝素
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 B2

答案：A

12. 阻断脑内多巴胺受体，小剂量抑制延脑催吐化学感受区的多巴胺受体，大剂量时直接抑制呕吐中枢，兼有镇静作用的是

- A: 劳拉西泮
- B: 帕洛诺司琼
- C: 氯丙嗪
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

13. 属于人体必需、人体不能合成或合成速度不能满足人体需要

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 复方氨基酸(18AA)
- C: 精氨酸
- D: 赖氨酸

答案：D

14. 关于氢氧化铝叙述正确的是

- A: 不易引起便秘
- B: 减少胃酸分泌
- C: 促进肠道磷酸盐的重吸收
- D: 与胃液混合形成凝胶保护膜

答案：D

15. 耐酸耐酶的青霉素是

- A: 双氯西林
- B: 青霉素 V
- C: 羧苄西林
- D: 氨苄西林

答案：A

16. 患者，女 75 岁，既往有 2 型糖尿病史 18 年，有青霉素过敏史，因车祸导致左下肢开放性骨折，术后发生骨髓炎，给予克林霉素治疗 10 余天，临床应关注的典型不良反应是

- A: 抗生素相关性腹泻
- B: 急性溶血性贫血
- C: 肌肉震颤
- D: 红人综合征

答案：A

17. 有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法，错误的是（）

- A: 阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- B: 与顺铂等肾毒性药物合用，可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- C: 丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄
- D: 碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

答案：D

18. 下列药物中不用于抗心律失常的是

- A: 胺碘酮
- B: 单硝酸异山梨酯
- C: 比索洛尔
- D: 美西律

答案：B

19. 血浆半衰期最长的强心苷类药物是

- A: 米力农
- B: 地高辛
- C: 洋地黄毒苷
- D: 多巴酚丁胺

答案：C

20. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 赖氨酸
- C: 复方氨基酸(18AA)
- D: 精氨酸

答案：D

21. 重症甲状腺功能亢进症病情未控制者不宜使用

- A: 甲状腺素
- B: 小剂量碘制剂
- C: 大剂量碘制剂
- D: None

答案：D

22. 治疗血吸虫病宜选用

- A: 甲苯咪唑
- B: 氯喹
- C: 甲硝唑
- D: 吡喹酮

答案：D

23.（2021 年真题）通过监测国际标准化比值（INR）调整给药剂量的药物是（）

- A: 茶碱
- B: 华法林
- C: 丙戊酸钠
- D: 地高辛

答案：B

24. 噻唑烷二酮类药物可降低

- A: 女性骨折的风险
- B: 血容量
- C: 体重
- D: 血红蛋白

答案：D

25. 下列哪种药物属于抑菌药

- A: 庆大霉素
- B: 青霉素 G
- C: 头孢氨苄
- D: 四环素

答案：D

26. 长期频繁使用可致眼部真菌感染的药物是

- A: 氯霉素
- B: 更昔洛韦
- C: 四环素可的松

D: 利巴韦林

答案: C

27. 防治血栓性疾病如心肌梗死、脑梗死的药物是()

A: 氨甲环酸

B: 非格司亭

C: 维生素 K

D: 香豆素类

答案: D

28. 兼具抑菌作用、抑制痛觉神经和刺激腺体分泌的鼻用制剂是

A: 复方薄荷脑滴鼻液

B: 异丙托溴铵吸入剂润德教育

C: 鲑鱼降钙素鼻喷剂

D: 氟替卡松鼻喷剂

答案: A

29. 临床主要用于脑型恶性疟的药物是()。

A: 奎宁

B: 伯氨喹

C: 氯喹

D: 甲硝唑

答案: A

30. 洋地黄中毒时的信号为

A: 色觉障碍

B: 眩晕

C: 胃肠道症状

D: 定向力丧失

答案: C

31. 维生素 B1 缺乏时出现

A: 夜盲症

B: 脚气病

C: 成人佝偻病

D: 糙皮病

答案: B

32. 出现流感样综合征，寒战、发热的药物是()

A: 异烟肼

B: 对氨基水杨酸

C: 利福平

D: 链霉素

答案: C

33. ACEI 与()联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸及血糖的不良影响。

A: β 受体阻断剂

B: 留钾利尿剂

C: 人促红素

D: 噻嗪类利尿剂

答案: D

34. (2018 年真题) 不属于血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)类药物作用特点是()

A: ACEI 可引起反射性心率加快

B: ACEI 对肾脏有保护作用

C: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大

D: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者

答案：A

35. 喹诺酮类药物作用机制

A: 抑制细菌糖代谢

B: 干扰细菌核酸代谢

C: 抑制细菌细胞壁合成

D: 抑制细菌蛋白质合成

答案：B

36. 中毒症状主要表现为胃肠道反应、中枢神经系统反应和心脏毒性三个方面的是

A: 卡托普利

B: 哌唑嗪

C: 地高辛

D: 氨氯地平

答案：C

37. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 选择适宜的病期、疗程和监测

B: 尽量选择三价铁

C: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离

D: 注意预防铁负荷过重

答案：B

38. 普萘洛尔

- A: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- B: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- C: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
- D: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

答案：C

39. 主要用于疟疾的预防，也可用于治疗弓形虫病的药物是

- A: 蒿甲醚
- B: 双氢青蒿素
- C: 乙胺嘧啶
- D: 奎宁

答案：C

40. (2019 年真题) 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状，其所激动的受体是 ()

- A: N 受体
- B: H 受体
- C: M 受体
- D: α 受体

答案：D

41. 应用高剂量的 β_2 受体激动剂可导致的严重典型不良反应是

- A: 低钾血症
- B: 高钙血症
- C: 低镁血症
- D: 低钙血症

答案：A

42. 影响毛细血管通透性的促凝血药是

- A: 卡巴克络
- B: 血凝酶
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素 K

答案：A

43. 肾上腺皮质功能不全采用

- A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- B: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- C: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- D: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

答案：B

44. 下列哪项不是维生素 K 的适应证

- A: 早产儿及新生儿肝脏合成功能不足引起维生素 K 缺乏
- B: 用于弥散性血管内凝血症高凝期
- C: 梗阻性黄疸所致的出血
- D: 水杨酸类药物过量引起的出血

答案：B

45. 与噻嗪类利尿剂合用易发生高钙血症的药物是

- A: 碳酸钙
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 莫沙必利
- D: 奥关拉唑

答案：A

46. 关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误的是

- A: 治疗急性感染通常疗程不宜超过 7~14 日
- B: 联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染
- C: 可在身体同一部位给药
- D: 两类药不能混入同一容器内

答案：C

47. 属于持续大剂量应用糖皮质激素引起的不良反应是

- A: 青光眼
- B: 骨质疏松症
- C: Cushing 综合征体型
- D: 胰腺炎

答案：C

48. (2018 年真题) 可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化, 用于痛风急性发作的药物是 ()

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 非布索坦
- D: 苯溴马隆

答案：A

49. 患者，女，46 岁。肝硬化腹水患者，长期使用噻嗪类利尿药不会引起

- A: 低氯性碱中毒
- B: 低钙血症
- C: 低钾血症

D: 高尿酸血症

答案：B

50. (2015 年真题) 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是 ()。

A: 沙美特罗

B: 多索茶碱

C: 孟鲁司特

D: 噻托溴铵

答案：A

51. 治疗各种人类血吸虫病的首选药物是

A: 乙胺嗪

B: 酒石酸锑钾

C: 左旋咪唑

D: 吡喹酮

答案：D

52. 作用于远曲小管近端的中效利尿药是

A: 乙酰唑胺

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 氨苯蝶啶

答案：C

53. 可拮抗维生素 B

A: 糖皮质激素

B: 异烟肼

C: 雌激素

D: 丙磺舒

答案：B

54. 属于胰高血糖素样肽-1 受体激动剂的是

A: 阿卡波糖

B: 瑞格列奈

C: 艾塞那肽

D: 罗格列酮

答案：C

55. 急性化脓性中耳炎早期最有效的治疗是()

A: 2%酚甘油滴耳

B: 抗生素加激素全身应用

C: 及早足量抗生素应用

D: 抗生素溶液滴耳

答案：C

56. 通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

A: 吗氯贝胺

B: 度洛西汀

C: 阿米替林

D: 舍曲林

答案：A

57. (2017 年真题) 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是 ()

- A: 长效 β_2 受体激动剂+长效 M 胆碱受体阻断剂
- B: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂
- C: 吸入性糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂
- D: 吸入性糖皮质激素+短效 β_2 受体激动剂

答案: C

58. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 吉非替尼
- B: 巯嘌呤
- C: 枸橼酸他莫昔芬
- D: 紫杉醇

答案: C

59. 患者，男，30 岁。近期出现乏力、心动过速，考虑为“甲亢”，遵医嘱服用药物后出现头痛、眩晕、关节痛、剥落性皮炎的是

- A: 左甲状腺素
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 甲巯咪唑
- D: 地塞米松

答案: B

60. 阿片类药物治疗期间最常出现的不良反应

- A: 认知障碍
- B: 身体和精神依耐性
- C: 尿频、尿急、尿潴留
- D: 便秘、恶心、镇静功能受损

答案：D

61. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 修复消化道黏膜
- B: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能
- C: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素
- D: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动

答案：D

62. 关于地高辛的说法不正确的是

- A: 减慢心率
- B: 激动 Na
- C: 减慢传导
- D: 加强心肌收缩力

答案：B

63. (2015 年真题) 李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是 ()。

- A: 辛伐他汀
- B: 米氮平
- C: 阿司匹林
- D: 二甲双胍

答案：B

64. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

A: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量

B: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可进行代谢酶基因型检测

C: 在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量

D: 单次负荷量 300mg 开始，然后以 75mg，每日 1 次连续服药

答案：A

65. 一日 2 次，早餐和晚餐前 60 分钟内给药，餐后不能给药，每次给药剂量固定，不需要根据血糖水平作随时调整的药物是

A: 艾塞那肽

B: 利拉鲁肽

C: 瑞格列奈

D: 格列齐特

答案：A

66. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A: 阿托品

B: 阿托品+新斯的明

C: 胆碱酯酶复活药

D: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药

答案：D

67. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和 () 联合有协同作用。

A: 人促红素

B: 留钾利尿剂

C: β 受体阻断剂

D: 噻嗪类利尿剂

答案: C

68. 吗啉类抗真菌药 ()

A: 特比萘芬

B: 两性霉素

C: 阿莫罗芬

D: 氟康唑

答案: C

69. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A: 贝那普利

B: 比索洛尔

C: 螺内酯

D: 呋塞米

答案: A

70. 下列抗心律失常药中，属于 β 受体阻断剂的代表药是 ()。

A: 胺碘酮

B: 普萘洛尔

C: 索他洛尔

D: 溴苄胺

答案: B

71. 外用无效，口服治疗体癣，毛发癣的药物是

A: 克霉唑

B: 制霉菌素

C: 灰黄霉素

D: 咪康唑

答案：C

72. 以下关于 PPI 用法用量的描述，错误的是

A: 泮托拉唑静脉给药用于急性上消化道出血时，一次 40mg~80mg，每日 1~2 次

B: 泮托拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

C: 艾司奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

D: 奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

答案：D

73. 硫脲类药物用于甲状腺功能亢进内科治疗的正确给药方式是

A: 开始给小剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

B: 开始给小剂量，以后逐渐加大剂量，直至基础代谢率正常，改用维持量

C: 开始给大剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

D: 开始给治疗量，基础代谢正常后继续给 3~6 个月停药

答案：C

74. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是

A: 喜树碱

B: 卡莫氟

C: 来曲唑

D: 甲氨蝶呤

答案：A

75. 下列不属于局麻药物作用特点的是

- A: 作用消失后神经功能不可完全恢复
- B: 可暂时、完全阻断神经传导
- C: 可逆性阻断神经冲动产生和传导
- D: 对各类组织无损伤性影响

答案：A

76. 治疗酮症酸中毒的是

- A: A 和 B 均无效
- B: 胰岛素
- C: 磺酰脲类
- D: 二甲双胍

答案：B

77. 与唑来膦酸合用可增加多发性骨髓瘤患者发生肾功能不全风险的谷氨酸衍生物是

- A: 萘普生
- B: 沙利度胺
- C: 抗血管生成药
- D: 高钙食品

答案：B

78. 最常见不良反应为干咳，严重不良反应为血管神经性水肿的是

- A: 地高辛
- B: 哌唑嗪
- C: 卡托普利
- D: 氨氯地平

答案：C

79. 属于金属配合物类的抗肿瘤药是

- A: 阿糖胞苷
- B: 氮芥
- C: 长春碱
- D: 顺铂

答案：D

80. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

- A: 多索茶碱
- B: 布地奈德
- C: 沙美特罗
- D: 孟鲁司特

答案：A

81. 低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

- A: 螺内酯
- B: 阿米洛利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 氨苯蝶啶

答案：C

82. (2021 年真题) 可待因是前药，需经肝药酶转化为吗啡而发挥镇痛作用，参与转化的肝药酶是 ()

- A: CYP2D6
- B: CYP3A4
- C: CYP2C9
- D: CYP1A2

答案：A

83. (2020 年真题) 关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

- A: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用
- B: 为了加强疗效，可以一日多次给药
- C: 不宜用于皮肤皱褶部位
- D: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用

答案：B

84. 通过影响疟原虫红内期的超微结构，阻断了疟原虫营养摄取的药物是

- A: 吡喹酮
- B: 奎宁
- C: 青蒿素
- D: 乙胺嘧啶

答案：C

85. 属于脂肪酸类抗癫痫药的代表药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 氯硝西泮
- C: 丙戊酸钠
- D: 加巴喷丁

答案：C

86. 血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 他达拉非

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/446143230101011030>