2024年广西壮族自治区昭平县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试内部题库【满分必刷】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.治疗过敏性结膜炎可选用的药物是()

A：羟甲基纤维素钠滴眼液

B：酞丁安滴眼液

C：氧氟沙星滴眼液

D：色甘酸钠滴眼液

答案：D

2.患者，女，57岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20／5mgqd

A：白色，右上角应有标注

B：淡绿色

C：淡黄色

D：淡红色

答案：A

3.常见老年人ADR的药物类别,阿托品、苯海索等致尿潴留

A：钙通道阻滞剂

B：抗胆碱药

C: β受体阻断剂

D: 抗生素

答案：B

4.脂质体药物属于

A: B级高危药品

B: C级高危药品

C: D级高危药品

D: E级高危药品

答案：B

5.有机磷中毒的解救药物是()

A: 阿托品+碘解磷定

B: 乙酰半胱氨酸

C: 硫代硫酸钠

D: 氟马西尼

答案：A

6.有明确的风险，有必要采取措施以降低风险；评判为

A: 确认

B: 驳倒

C: 验证

D: 待验证

答案：A

7.患者，女，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190／110mmHg，R307欠／分，Bp108次／分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿哕音。

A: 急性左心衰竭

B: 肺动脉栓塞

C: 支气管哮喘

D: 慢性支气管炎急性发作

答案：A

8.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg。1天前开始发热，体温39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，每间隔2～3小时排1次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次／分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109／L，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 鞣酸蛋白

B: 洛哌丁胺

C: 小檗碱

D: 药用炭

答案：B

9.患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 左旋氨氯地平

B: 雷米普利

C: 氟伐他汀

D: 比索洛尔

答案：D

10.慢性肾盂肾炎治疗的关键是

A: 积极寻找并去除易感因素

B: 选用敏感抗菌药物

C: 延长给药疗程

D: 联合使用抗菌药物

答案：A

11.欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

A: 《中华人民共和国药典》

B: 《梅氏药物副作用》

C: 《新编药物学》

D: 《中国国家处方集》

答案：B

12.患者，女，66岁，身高156cm，体重61kg。空腹血糖7.8mmol／L，餐后血糖11.2mmol／L，糖化血红蛋白8.7%。

A: 增加现用口服降糖药的剂量

B: 启用胰岛素治疗

C: 换用其他作用机制的口服降糖药

D: 增加一种口服降糖药

答案：B

13.某男性，27岁，间断上腹痛3年，表现为餐后痛，约1～2h后缓解，以冬春季多发。

A: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

B: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

C: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂

D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

答案：D

14.在人体血中白细胞群体中，中性粒细胞(DC)的正常比例范围是

A：0.01～0.05

B：0.03～0.08

C：0.20～0.40

D：0.50～0.70

答案：D

15.药物警戒对用药安全具有重要作用。下列确认的用药不良事件中，属于发现药品使用环节问题的是

A：“阿糖胞苷儿科事件”

B：“万络(罗非昔布)事件”

C：“亮菌甲素事件”

D：“拜斯亭(西立伐他汀)事件”

答案：A

16.心力衰竭治疗中唯一能够控制体液潴留的药物是

A：阿托品

B：β 受体拮抗剂

C：肾上腺素

D：利尿药

答案：D

17.下列金属解毒剂中，对铅中毒疗效最好的是

A：二巯丙醇

B：二巯丁二钠

C：硫代硫酸钠

D：依地酸钙钠

答案：D

18.患者，女，5岁，体重25kg。两天前受凉后发热，最高体温38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 每天用药最多不应超过5次，用药不超过3天

B: 每天用药最多不应超过4次，用药不超过3天

C: 每天用药最多不应超过6次，用药不超过3天

D: 每天用药最多不应超过3次，用药不超过3天

答案：B

19.（2015年真题）使用前应用青霉素进行皮试的药物是（）。

A: 阿奇霉素片

B: 注射用头孢曲松钠

C: 阿莫西林胶囊

D: 左氧氟沙星片

答案：C

20.治疗癌症疼痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，可选择的药物是

A: 东莨菪碱

B: 硫酸镁

C: 比沙可啶

D: 乳果糖

答案：D

21.药师应告知医师"合理用药信息"的事例是

A：长时间、大剂量应用头孢菌素类引起牙龈出血、手术创面渗血等反应

B：氟西汀或帕罗西汀与异烟肼等单胺氧化酶抑制剂合用引起 5 羟色胺综合征

C：他汀类药合用吉非贝齐或烟酸致横纹肌溶解症

D：培氟沙星引起跟腱炎、合用糖皮质激素可致跟腱断裂

答案：A

22.（2018 年真题）患者,男 58 岁,高血压病史 5 年,吸烟史 40 年，日均 40 支,6 小时前出现左侧肢体无力,并逐渐加重,不能站立,家属发现其说话迟钝含混,右侧嘴唇变浅,意识清楚,到某院急诊 BP190/120mmHg，血常规基本正常,行头部 MRI 检查后,诊断为急性脑梗死。

A：甘露醇注射液 250mlq6hiv

B：呋塞米片 200mgqdpo

C：胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv

D：尼莫地平注射液 20mgqdiv

答案：A

23.患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm／1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

A：来氟米特

B：环孢素

C：柳氮磺吡啶

D：甲氨蝶呤

答案：D

24.血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患贫血患者常出现的血常规检查异常是

A: 血红蛋白减少

B: 中性粒细胞增多

C: 血小板计数增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：A

25.粪便隐血可见于

A: 胃溃疡

B: 湿疹

C: 痛经

D: 口腔溃疡

答案：A

26.属于蛋白酶抑制剂的抗HIV药物是

A: 拉替拉韦

B: 利托那韦

C: 替诺福韦

D: 阿德福韦

答案：B

27.包括索引、文摘和题录等，查阅非常方便

A: 二级文献

B: 药学网络

C: 三级文献源

D: 研究论文

答案：A

28.（2016年真题）治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用2～3次的药物是（）。

A：西地碘含片

B：地塞米松粘贴片

C：甲硝唑口腔粘贴片

D：冰硼咽喉散

答案：D

29.可吸附砷、沉淀汞的洗胃液是

A：1%氯化钠溶液

B：鸡蛋白

C：3%～5%鞣酸溶液

D：药用炭混悬液

答案：B

30.氢氯噻嗪所致的主要不良反应是

A：支气管痉挛

B：血钠升高

C：血尿酸升高

D：外周血肿

答案：C

31.属于雌激素受体拮抗剂的抗肿瘤药是

A：阿那曲唑

B：炔雌醇

C：丙酸睾酮

D：他莫昔芬

答案：D

32.常用于碱化尿液，促进毒性药物排泄的是

A: 碳酸氢钠

B: 麻黄碱

C: 磺胺醋酰

D: 苯巴比妥

答案：A

33.以下医学检查项目中，主要用于诊断急性胰腺炎的是

A: 淀粉酶增高

B: 肌酸激酶增高

C: 血淀粉酶

D: 尿淀粉酶

答案：A

34.患者，男，50岁，身高167cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖7.8mmol／L（正常值：3.9～6.1mmol／L），餐后血糖14.8mmol／L；血尿酸580μmol/L（正常值：男性180～440μmol／L），低密度脂蛋白胆固醇3.7mmol／L（正常值：2.1～3.1mmol／L），肌酐清除率100ml／min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 控制体重

B: 低嘌呤饮食

C: 适量运动

D: 应用阿司匹林

答案：D

35.有双侧肾动脉狭窄的高血压患者不宜选用

A：维拉帕米

B：卡托普利

C：哌唑嗪

D：多沙唑嗪

答案：B

36.（2018年真题）患者,女,30岁,因感冒所致发热（体温38.5℃）并伴有头痛、全身酸痛到药店购药,药师应推荐的药品是（）

A：萘甲唑啉滴鼻液

B：氯苯那敏片

C：酚麻美敏片

D：对乙酰氨基酚片

答案：D

37.患者，女，57岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20／5mgqd

A：处方应写商品名

B：无适应证用药

C：门诊处方所开剂量不能超过7日用量

D：超适应证用药

答案：C

38.患者，女，42岁。左足背部出现严重冻疮，可考虑应用

A: 肝素钠乳膏

B: 樟脑软膏

C: 紫云膏

D: 赛庚啶

答案：A

39.属于胆固醇吸收抑制剂的药物是

A: 依折麦布

B: 甲基多巴

C: 辛伐他汀

D: 非诺贝特

答案：A

40.用于产后出血，但在胎盘娩出前禁用的药物是

A: 抗组胺药

B: 麦角新碱

C: 水合氯醛

D: 甲巯咪唑

答案：B

41.病例对照研究试验结果属于循证医学证据级别

A: 3级证据

B: 4级证据

C: 1级证据

D: 2级证据

答案：A

42.服药期间饮茶可降低药效的是

A: 西咪替丁

B: 泼尼松

C: 硫酸亚铁

D: 格列本脲

答案：C

43.慢性肝炎尤其是肝硬化时，肝功能检查结果可能显示的是

A: AST 上升幅度大

B: AST 上升幅度高于 ALT

C: AST、ALT 同时上升

D: ALT 上升幅度大

答案：B

44.糖尿病急性并发症为

A: 周围神经病变

B: 糖尿病酮症酸中毒

C: 肾动脉硬化

D: 糖尿痛肾痛

答案：B

45.患者,男,52 岁支气管哮喘病史 10 年。因间断喘息发作,长期自行服用泼尼松片 20mgq

A: 该患者可能出现的不良反应中,不包括的是（）

B: 骨质疏松

C: 低血压

D: 消化性溃疡

答案：A

46.患者到药店要求购买痢特灵，药师应该给予

A：呋喃唑酮

B：诺氟沙星

C：双嘧达莫

D：喷托维林

答案：A

47.可提示轻度黄疸的是

A：17.1μmol/L～171μmol/L

B：17.1μmol/L～34.2μmol/L

C：>342μmol/L

D：34.2μmol/L～171μmol/L

答案：D

48.Ⅰ期新药临床试验样本数要求查看材料

A：常见病≥12000例

B：≥300例

C：20～30例

D：主要病种≥300例

答案：C

49.隔日1次用药的外文规范缩写是

A：qn

B：qod

C：qh

D：qd

答案：B

50.患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A: 阿昔洛韦

B: 利巴韦林

C: 恩替卡韦

D: 奥司他韦

答案：A

51.紫外线加速一些药品的氧化、分解

A: 空气

B: 湿度

C: 温度

D: 日光

答案：D

52.可稀释痰液，并借助咳嗽反射以帮助痰液排出，避免阻塞气道的药品是

A: 羧甲司坦

B: 沙丁胺醇

C: 布地奈德

D: 扎鲁司特

答案：A

53.应将该药倒入 50ml 温水中充分稀释，摇匀服用，可用于 IBS 患者止泻的药物是

A: 匹维溴铵

B: 蒙脱石散

C: 地芬诺酯

D: 环孢素 A

答案：B

54.患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190／110mmHg，R307 欠／分，Bp108 次／分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 心房颤动

B: 心室颤动

C: 阵发性室上性心动过速

D: 室性期前收缩

答案：A

55.脑梗死的分期恢复期

A: 2 周

B: 1～3 个月

C: 1~6 个月

D: 1 个月内

答案：C

56.可用于慢性消耗性疾病的蛋白同化激素是

A: 甲羟孕酮

B: 司坦唑醇

C: 依普黄酮

D: 他莫昔芬

答案：B

57.各种肠道染性或非感染性腹泻，或急性胃肠炎可引起

A: 米泔水样便
B: 稀糊状或水样粪便
C: 胨状便
D: 黏液便
答案：B

58.适用于有完整子宫，仍希望有月经样出血的妇女
A: 单纯雌激素补充治疗
B: 雌孕激素连续联合用药
C: 单纯孕激素补充治疗
D: 雌孕激素序贯用药
答案：D

59.贫血患者常出现
A: 中性粒细胞增多
B: 血小板计数增高
C: 血红蛋白减少
D: 嗜酸性粒细胞增多
答案：C

60.根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。
A: 急性尿潴留
B: 严重高血压
C: 慢性荨麻疹
D: 急性胰腺炎
答案：A

61.用于有机氟杀虫农药中毒的解毒剂是

A: 青霉胺

B: 乙酰胺

C: 维生素K1

D: 硫酸阿托品

答案：B

62.药历是开展个体化药物治疗的重要依据。药历书写的基本要求是

A: 完整、真实

B: 客观、真实

C: 科学、易懂

D: 客观、完整

答案：B

63.能有效抑制肠道内胆固醇的吸收，禁用于妊娠期和哺乳期的是（）

A: 普罗布考

B: 依折麦布

C: 他汀类

D: 烟酸类

答案：B

64.缺铁性贫血、肾性贫血可呈现

A: 红细胞计数减少

B: 白细胞增多

C: 血小板减少

D: 淋巴细胞增多

答案：A

65.血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

A: 2

B: 0.8～1.5

C: >1.5

D: <0.8

答案：B

66.（2021年真题）患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A: 疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用

B: 遵医嘱，不得自行增加剂量

C: 应适当减轻体重

D: 注意关节保暖

答案：A

67.非甾体抗炎药引起的典型药源性肌病是

A: 胃肠道疾病

B: 肌病

C: 神经系统疾病

D: 血液系统疾病

答案：A

68.用量过大可引起低血糖反应的是

A: 胰岛素

B: 糖皮质激素

C: 炔雌醇

D: 甲状腺素

答案：A

69.女性，32岁，3年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞7×10

A: 硫酸亚铁口服

B: 右旋糖酐铁肌注

C: 输血

D: 维生素B

答案：A

70.饮酒可导致患者对该药的耐受性降低的药物是

A: 卡马西平

B: 维生素B

C: 苯妥英钠

D: 利血平

答案：A

71.(解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用1%硫酸铜溶液催吐用于解救的中毒是

A: 丙米嗪中毒

B: 丙戊酸钠中毒

C: 三唑仑中毒

D: 磷化锌中毒

答案：D

72.关于微生态制剂，下列说法不正确的是

A: 调节肠道菌群平衡

B: 对促进营养物质的吸收没有帮助

C: 补充人体正常生理细菌

D: 清除对人体具有潜在危害的细菌

答案：B

73.患者，男，35 岁，因支气管哮喘入院，经正规治疗后病情缓解，仅偶尔胸闷，出院时医嘱如下。

A: 白三烯受体拮抗剂

B: β 受体阻断药

C: 抗胆碱药物

D: β 受体激动剂

答案：B

74.血管内溶血时，尿中可见()。

A: 白细胞管型

B: 红细胞管型

C: 血红蛋白尿

D: 乳糜尿

答案：C

75.吸附力强、可阻止毒物吸收的是

A: 1%硫酸镁溶液

B: 淀粉溶液

C: 1%氯化钠溶液

D: 药用炭混悬液

答案：D

76.（2015年真题）患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用（）。

A: 司来吉兰

B: 苯海索

C: 多巴丝肼

D: 左旋多巴

答案：B

77.可致体重增加的抗癫痫药为（）

A: 苯巴比妥

B: 苯妥英钠

C: 左乙拉西坦

D: 丙戊酸钠

答案：D

78.主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是

A: 依他尼酸

B: 乙酰唑胺

C: 氢氯噻嗪

D: 布美他尼

答案：B

79.重量比重量百分浓度系指100g溶液中所含溶质的克数，以符号

A: %(g/ml)表示

B: %(ml/ml)表示

C: %(ml/g)表示

D: %(g/g)表示

答案：D

80.已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次400mg。一个体重为10kg的11个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

A: 90mg

B: 100mg

C: 50mg

D: 75mg

答案：B

81.可使阿莫西林免受 β-内酰胺酶破坏的药品是()。

A: 三唑巴坦

B: 克拉维酸钾

C: 右旋糖酐

D: 西司他丁

答案：B

82.药库管理人员根据药品用量和库存情况提出购药计划，向指定的药品经营单位采购，必须持有

A: 五专管理

B: 防盗设施

C: 印鉴卡

D: 基数卡

答案：C

83.重症、急救治疗时，要求药物迅速起效，最不适宜选用的给药途径是

A: 喷雾给药

B: 静脉滴注

C: 吸入给药

D: 腔道给药

答案：D

84.注意个体化用药体现

A: 有效性

B: 安全性

C: 规范性

D: 经济性

答案：C

85.非甾体抗炎药的不良反应,引起荨麻疹、瘙痒、剥脱性皮炎等皮肤损害

A: 美洛昔康

B: 塞来昔布

C: 保泰松

D: 布洛芬

答案：A

86.可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

A: 维生素C

B: 复合维生素B

C: 维生素A

D: 维生素

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/447120155052010024