眼科学主治医师相关专业知识模拟试卷 6 (题后含答案及解析)

题型有：1. A1 型题 2. A4 型题 3. B1 型题 4. B1 型题 5. B1 型题 6. X 型题

1． 棘阿米巴病的特点不正确的是
A．对化学消毒剂敏感
B．主要感染角膜
C．可致上皮性角膜炎
D．有滋养体和包囊两种形式存在 E．可涂片做细胞学检查

正确答案：A
解析：棘阿米巴有滋养体和包囊两种形式， 滋养体以细菌为食， 二分裂繁殖，环境不适宜时， 形成包囊。棘阿米巴对一般抗菌药物、氯化物、化学消毒剂、H：0：等均不敏感。角膜轻微外伤后接触污染棘阿米巴的水后，阿米巴即通过上皮缺损处侵入致病。最初可类似单纯疱疹病毒性角膜炎，上皮呈树枝状浸润或上皮细小浑浊，可逐渐发展到地图状上皮缺损，继续进展可侵入角膜基质层，为角膜旁中心的环形浸润，直至弥散性化脓性角膜溃疡，后弹力膜膨出，角膜穿孔。其病原学诊断可做病灶刮片。

2． 以下因素对病毒影响不正确的有
A．对氧化剂敏感
B．耐热不耐冷
C．高压可使病毒灭活
D．电离辐射可使病毒灭活 E．紫外线可使病毒灭活

正确答案：B
解析：病毒耐冷怕热，高压灭菌(121℃，15 分钟)，干热(160～180℃，1 小时)，和煮沸均可使几乎所有已知病毒灭活，一 40℃或一 70℃低温冷冻可较长期保存病毒。病毒易被酒精、氧化剂、碘等灭活。病毒核酸对紫外线、射线敏感，紫外线、电离辐射均可使病毒灭活。

3． 风湿热的眼部损害不包括
A．眼睑闭合不全
B．白内障
C．眼球运动障碍
D．巩膜炎 E．急性色素膜炎

正确答案：B
解析：风湿热的眼部损害为眼睑闭合不全和眼球运动受限等神经麻痹症状，可出现巩膜炎，急性虹膜睫状体炎及脉络膜炎。

4． 下列关于结核病的说法错误的是

A．X 线检查是诊断的重要手段
B．初次感染后少数发展为活动性结核
C．可致脑膜炎
D．发病情况与人体免疫状态有关 E．葡萄膜组织不利于结核杆菌停留

正确答案：E

解析：结核病是结核杆菌引起的一种慢性传染病。结核病的致病性、病变范围及发病时期，常取决于人体的免疫状态，尤其是根据过敏性与免疫两者之间的平衡状态而定。绝大多数人在初次感染产生结核菌素过敏后，结核灶被包围或钙化，只有其中的 5%～15%可发展为活动性结核，以婴幼儿多见，可发展为急性全身性结核或粟粒性结核及脑膜炎。眼部组织，除晶状体外，均有发生结核的可能，葡萄膜的结核感染相对多见。结核菌素试验是判定人体是否受过结核菌感染的一种方法，其他 X 线检查、红细胞沉降率测定均为诊断结核病的重要参考手段。

5． 致眼部感染最严重的一种常见菌为
A．大肠杆菌
B．肺炎球菌
C．铜绿假单胞菌
D．金黄色葡萄球菌 E．链球菌

正确答案：C

解析：铜绿假单胞菌能够分泌绿脓菌素使培养基带有绿色，其产生的弹性蛋白酶、碱性蛋白酶及外毒素 A 等致病因子，组织破坏力极强，使铜绿假单胞菌成为假单胞菌属中致眼部感染最严重且最常见的革兰阴性杆菌。

6． 某医院眼科门诊于 2003 年 10 月共诊治 3000 例患者，老年性白内障 90 例，占其中的 3．00%，以下说法正确的是
A．老年性白内障的患病率为 3．00%
B．老年性白内障的相对危险度为 3．00%
C．眼科门诊中老年性白内障的构成比为 3．00%
D. 诊断老年性白内障的敏感性为3.00%E. 老年性白内障的发病率为3.00%

正确答案：C

解析：对疾病发生频率的叙述主要有 2 种：患病率是测量某一时间点或时期内人群中，已经发生的某种疾病的可能性。计算时分子是已经发生某种疾病的总数，分母是调查人群总数。发病率是确定暴露于某种危险因素下的健康人在某一特定时间内发生某种疾病的可能性。计算时分子是这一特定时间内可能发生这种疾病的危险人数。敏感性和特异性是评价一项诊断试验真实性的两个基本指标。敏感性是指在患者中用某试验检查得到阳性结果的百分比，可以衡量诊断试验正确地识别患某病的能力。特异性是指在无病者应用该试验获得阴性结果的百分比。构成比是表示某一事物内部的各组成部分的比例和分布，是某一观察单位数占观察单位总数的百分比。

7．　白塞氏综合征(Behcet’s syndrome)的临床指征不包括

A．反复发作的口腔溃疡

B．生殖器溃疡

C．皮肤红斑

D．关节红肿 E．复发性角膜炎

正确答案：E

解析：Behcet 病四项主要指征是：①反复发作的口腔黏膜溃疡；②皮肤结节样红斑，皮下栓塞性静脉炎及皮肤刺激过敏等；③生殖器溃疡；④复发性前房积脓性虹膜睫状体炎和(或)脉络膜炎等。Behcet 病病因不明，复发率高，治疗非常困难，目前仍为眼病发作时给予对症和皮质类固醇或免疫抑制剂。

8．　提上睑肌缩短术治疗上睑下垂的适应证为提上睑肌功能尚未完全丧失，肌力

A．≥4mm

B．≥6mm

C．≥5mm

D．≥3mmE．≥7mm

正确答案：C

解析：先天性上睑下垂以手术治疗为主，如提上睑肌功能尚未完全丧失，肌力≥5mm 时，适合选择提上睑肌缩短术；肌力≤3mm 应选择做额肌提吊术。

9．　下列有关睑腺炎的临床表现，不正确的叙述是

A．外睑腺炎的炎症反应主要位于睫毛根部的睑缘处，初起红肿弥散，有硬结、剧烈疼痛和压痛

B．患处红肿热痛

C．内睑腺炎可见睑结膜面弥散性充血肿胀，有硬结、疼痛和压痛

D．若致病菌毒性强烈或患者抵抗力低下时可发展成为眼睑脓肿甚至败血症或海绵窦血栓形成 E．如感染靠近外眦部，还会引起反应性球结膜水肿

正确答案：C

解析：内睑腺炎可见睑结膜面局限性充血肿胀，有硬结、疼痛和压痛。

10．　以下对毛细血管瘤不正确的描述有

A．是婴幼儿时期最常见的眼睑良性肿瘤

B．位于眼睑较浅层，为稍隆起的鲜红色或紫红色病变，较深者表面皮肤呈暗红色

C．可以在瘤体内注射或瘤体周围注射糖皮质激素

D．无论大小，均不可自行消退 E．根据不同条件及肿瘤的部位选择激光光凝及冷冻治疗

正确答案：D

解析：毛细血管瘤是婴幼儿时期最常见的眼睑良性肿瘤，位于眼睑较浅层，

为稍隆起的鲜红色或紫红色病变，较深者表面皮肤呈暗红色。小的肿瘤可以观察，部分病例可自行消退。可以在瘤体内注射或瘤体周围注射糖皮质激素。根据不同条件及肿瘤的部位选择激光光凝及冷冻治疗。

11． 不符合睑外翻临床表现的有

A．睑裂缩小

B．泪溢

C．暴露性角膜炎

D．结膜干燥 E．睑裂闭合不全

正确答案： A

解析：睑外翻者睑结膜因长期暴露，发生过度角化，干燥肥厚充血；又常因合并眼睑闭合不全，角膜得不到应有的保护，也会发生干燥和上皮脱落或发生角膜溃疡；下睑外翻时，泪小点离开泪湖，不能接收泪液排出，则引起溢泪症。

12． 主要发生在皮肤暴露区，是一种特殊类型的表皮细胞假瘤样增生，多见于男性，单发，此病变为

A．传染性软疣

B．毛细血管瘤

C．皮脂溢性角化病

D．角化棘皮瘤 E．黄色瘤

正确答案：D

解析：角化棘皮瘤主要发生在皮肤暴露区，是一种特殊类型的表皮细胞假瘤样增生，多见于男性，单发；传染性软疣好发于青少年；毛细血管瘤是婴幼儿时期最常见的眼睑良性肿瘤；皮脂溢性角化病好发于中老年人；黄色瘤好发于 40～50 岁妇女，也可发生于男性。

13． 以下哪种元素缺乏会引发睑部睑缘炎

A．维生素 B1

B．维生素 A

C．维生素 E

D．维生素 B2E．维生素 C

正确答案：D

解析：睑部睑缘炎多由 Morax-Axenfel 双杆菌感染所引起，维生素 B2 缺乏者好本病。

14． 眼睑最常见的恶性肿瘤为

A．基底细胞癌

B．鳞状上皮细胞癌

C．黄色瘤

D．皮脂腺腺癌 E．睑板腺腺癌

正确答案：A

解析：眼睑最常见的恶性肿瘤为基底细胞癌，占眼睑恶性上皮性肿瘤的85%～95%，95%以上病变发生于中老年人，平均年龄60岁，性别无差异。肿瘤由表皮基底细胞分化而来，紫外线照射为其最重要的危险因素。病程较长，最长可达20年。

15. 有关睑板腺囊肿不正确的治疗方法是

A．不能消退的肿块应在局麻下行手术切除

B．早期肿块较小时可做热敷和涂用白降汞或黄降汞眼膏等

C．一般在睑结膜面做与睑缘相平行的切口

D．对于老年人，术后应取样做病理检查以除外睑板腺腺癌 E．应将囊肿内容物与囊壁一起清除干净

正确答案：C

解析：早期肿块较小时可做热敷和涂用白降汞或黄降汞眼膏以促进局部血液循环，有利于病变吸收。不能消退的肿块应在局麻下行手术切除，一般在睑结膜面做与睑缘相垂直的切口，以避免过多破坏睑板腺管，手术时应将囊肿内容物与囊壁一起清除干净以防复发。对于老年人，术后应取样做病理检查以除外睑板腺腺癌。

16. 关于内眦赘皮错误的描述有

A．是上睑皮肤向下延伸到内眦部的垂直性皮肤皱襞

B．常被误认为共同性外斜视

C．可覆盖内眦及泪阜

D．须用交替遮眼法仔细鉴别 E．属于一种先天异常

正确答案：B

解析：内眦赘皮是上睑皮肤向下延伸到内眦部的垂直性皮肤皱襞，可覆盖内眦及泪阜，使部分鼻侧巩膜不能充分暴露，常被误认为共同性内斜视，需要用交替遮眼法仔细鉴别。本病属于一种先天异常，一般不需治疗。

17. 以下有关先天性上睑下垂的临床特点，不正确的是

A．额部皮肤平滑、薄且无皱纹

B．常伴眼球上转运动障碍

C．可伴其他先天异常如内眦赘皮、眼球震颤等

D．患者常将头部后仰 E．常为双眼发病，但不一定对称

正确答案：A

解析：先天性上睑下垂，常为双眼发病，但两侧可不对称，可伴其他先天异常如内眦赘皮、眼球震颤等，常伴眼球上转运动障碍。双眼上睑下垂较明显的患者眼睑皮肤平滑、薄、无皱纹。瞳孔被眼睑遮盖的患者，为克服视力障碍，常将头部后仰，并紧缩额肌，形成较深的横行皮肤皱纹，牵拉眉毛向上呈弓形凸起，借以提高上睑缘位置。

18.　不会引起眼睑闭合不全的病症有
A．睑球粘连
B．面神经麻痹
C．眼睑皮肤全层缺损
D．眼睑皮肤瘢痕 E．副交感神经麻痹

正确答案：E
解析：面神经麻痹可造成眼轮匝肌麻痹，使下睑松弛下坠，形成麻痹性眼睑闭合不全。烧伤、创伤、睑脓肿等可引起眼睑皮肤瘢痕使眼睑缩短，不能遮盖眼球。睑球粘连、眼睑皮肤全层缺损均可导致眼睑闭合不全。

19.　有关眼睑闭合不全，错误的有
A．最常见原因为面神经麻痹
B．中度兔眼会致暴露性角膜炎
C．昏迷或深度麻醉可发生永久性兔眼
D．轻度兔眼会引起结膜充血、干燥、肥厚及过度角化 E．应针对病因进行治疗

正确答案：C
解析：眼睑闭合不全最常见原因为面神经麻痹所致的麻痹性眼睑闭合不全。昏迷或深度麻醉可发生暂时性兔眼。轻度兔眼会引起结膜充血、干燥、肥厚及过度角化，中度兔眼会致导暴露性角膜炎，本病应针对病因进行治疗。

20.　以下不属于睫状肌麻痹剂的有
A．东莨菪碱
B．后马托品
C．去氧肾上腺素(新福林)
D．托品酰胺 E．阿托品

正确答案：C
解析：散瞳剂和睫状肌麻痹剂均可散大瞳孔，散瞳剂如肾上腺素受体兴奋剂——去氧肾上腺素(新福林)有散瞳作用，但无睫状肌麻痹作用。

21.　不会引起眼睑闭合不全的疾病有
A．先天性青光眼
B．眼眶肿瘤
C．老年性白内障
D．角膜葡萄肿 E．面神经麻痹

正确答案：C
解析：眼睑闭合不全最常见原因为面神经麻痹，其次为瘢痕性外翻，其他少见原因可归纳为眼眶容积与眼球大小的比例失调，如甲状腺病性突眼、眼眶肿瘤、先天性青光眼、角膜葡萄肿等。昏迷或深度麻醉可发生暂时性兔眼。

22．　带状疱疹性睑皮炎受累的神经为

A．面神经

B．视神经

C．滑车神经

D．动眼神经 E．三叉神经

正确答案：E

解析：带状疱疹性睑皮炎是水痘．带状疱疹病毒感染三叉神经的半月神经节或三叉神经某 1 支(第 1 支常见，偶见第 2 支)所致。

23．　不符合黄色瘤特点的有

A．可手术切除或激光治疗

B．病变特点为扁平、深黄色、稍隆起、呈不规则斑块状，小则数毫米，大者可达 2～3cm

C．好发于 40～50 岁妇女，亦可见于男性

D．可能与脂质代谢有关 E．大多数累及双上睑外侧皮肤，先后出现大小有别的病变

正确答案：E

解析：黄色瘤好发于 40～50 岁妇女，亦可见于男性，有 30％左右的人伴有全身血脂异常，故可能与脂质代谢有关，大多数累及双眼上睑内侧皮肤，先后出现大小有别的病变。病变特点为扁平、深黄色、稍隆起、呈不规则斑块状，小则数毫米，大者可达 2～3cm，可手术切除或激光治疗。

24．　带状疱疹性睑皮炎的疱疹分布于前头部、额部及上睑皮肤，不超过中线，表示病毒感染了

A．三叉神经的第 1 支

B．三叉神经的第 3 支

C．动眼神经

D．三叉神经的第 2 支 E．面神经

正确答案：A

解析：带状疱疹性睑皮炎是水痘．　带状疱疹病毒感染三叉神经的半月神经节或三叉神经某 1 支(第 1 或第 2 支)所致。若属第 1 支(眼神经支)，疱疹分布于前头部、额部及上睑皮肤，不超过中线。

25．　以下有关乳头状瘤，正确的是

A．好发于上睑睑缘

B．边界模糊，表面呈暗红色，有蒂

C．多由于细菌感染所致

D．为增生的鳞状上皮覆盖血管纤维结 E．是一种少见的眼睑良性病变缔组织，呈指头状突起，表面有角化过度或角化不全

正确答案：D

解析：乳头状瘤是一种最常见的眼睑良性病变，主要为鳞状上皮向外增生，故又称为鳞状上皮乳头状瘤，少数由于乳头状病毒感染。好发于睑缘，下睑尤多，边界清楚，表面呈乳头状与皮肤相似，无蒂，为增生的鳞状上皮覆盖血管纤维结缔组织，呈指头状突起，表面有角化过度或角化不全。

26. 关于青光眼用药不正确的说法有
A．防止视神经进一步损伤
B．主要是降低眼压
C．点药次数并非越多越好
D．可采取个体化治疗 E．只能单独使用

正确答案：E
解析：治疗青光眼的主要目标是降低眼压。治疗青光眼的药物可以单独或联合使用。所用药物的浓度和次数应根据青光眼患者的眼压、视盘和视野的情况采取个体化治疗，原则上应使用最小量的药物来达到控制眼压和防止视神经、视野进一步损伤。

27. Marfan 综合征与 Marchesani 综合征均可有
A．晶状体脱位
B．色素膜炎
C．蜘蛛痣
D．肌肉发达 E．肌张力低

正确答案：A
解析：Marfan．综合征为常染色体显性遗传病，以眼、心血管和全身骨骼的异常为特征。50％～80％的患者眼部表现主要为晶状体脱位，尤其是向上方和颞侧移位。Marchesani 综合征为常染色体隐性遗传，晶状体呈球形，小于正常，常向鼻下方脱位。

28. 眼内注射主要适用于
A．角膜炎
B．感染性眼内炎
C．色素膜炎
D．巩膜炎 E．急性结膜炎

正确答案：B
解析：眼内注射是将药液直接注入眼球内，包括前房或玻璃体腔内。眼球内注射的危险性很大，除非极严重的眼内感染病例，而且其他途径给药的治疗无明显疗效时才考虑使用。

29. 引起沙眼的微生物为
A．衣原体
B．病毒
C．支原体

D．细菌 E．立克次体

正确答案：A
解析：沙眼是由沙眼衣原体感染所致。

30．　多种药物滴眼时，相邻两种药物至少应间隔
A．2 分钟
B．4 分钟
C．5 分钟
D．6 分钟 E．3 分钟

正确答案：　C
解析：多种药物滴眼时，相邻两种药物至少应间隔 5 分钟，否则第 2 种药物会将第 1 种药物冲洗掉。

31．　眼局部给药不包括
A．滴眼剂滴眼
B．球结膜下注射
C．球后注射
D．眼上注射 E．眼内注射

正确答案：D
解析：眼局部给药的途径包括：结膜囊给药、眼周注射、眼内注射 3 种。结膜囊给药最常用的方法是滴眼剂点眼。 眼周注射包括： 球结膜下注射、 球筋膜下注射、球后注射。

32．　滴眼剂有何种特点时，才能通透完整角膜
A．低浓度
B．脂溶性
C．水溶性和脂溶性
D．低渗透压 E．水溶性

正确答案：　C
解析：角膜是脂质一水．脂质的夹心层，上皮和内皮细胞层脂质含量比基质层大 100 倍。这种结构使脂溶性物质容易通过角膜上皮和内皮细胞层，但水溶性制剂则不能通过。水溶性物质容易通透角膜基质层。药物通透角膜各层能力的差别构成了一种选择性通透屏障，只有药物具有水溶性和脂溶性两种特点时，才能通透完整角膜。

33．　多发性大动脉炎的表现不包括
A．眩晕
B．视力减退
C．头痛
D．幻视 E．下肢无力

正确答案：E

解析：多发性大动脉炎早期常先有眩晕、头痛、耳鸣或语言障碍，也常有阵发性视物模糊，上肢无力，上肢运动或高举时疼痛、麻木，上述症状在体位改变时特别显著。

34．　单纯疱疹病毒 I 型(HSV—I)感染的部位不包括

A．生殖器

B．眼睑皮肤

C．黏膜

D．头部皮肤 E．面部皮肤

正确答案：A

解析：单纯疱疹病毒 I 型(HSV-I)感染后，主要潜伏在三叉神经节感觉神经细胞内，易感部位为腰以上皮肤、黏膜如面、唇、眼部。HSV-Ⅱ主要侵犯生殖器、腰以下皮肤、黏膜。

35．　以下关于重症肌无力错误的是

A．自身免疫性肌病

B．肌无力症状晨轻午重

C．主要损害横纹肌

D．酪氨酸代谢障碍 E．多见上睑下垂

正确答案：D

解析：重症肌无力为自身免疫性肌病，主要损害横纹肌，多出现上睑下垂症状，肌无力的特点是晨轻午重，活动后加重，休息后减轻。

36．　棘阿米巴感染角膜多见于何种情况

A．有发热史

B．有外伤史

C．有结核病史

D．有配戴角膜接触镜病史 E．有紫外线接触史

正确答案：D

解析：棘阿米巴角膜炎常因角膜接触棘阿米巴污染的水源，特别是通过污染了的接触镜或清洗镜片的药液而感染发病。

37．　动脉硬化不包括

A．大动脉硬化

B．老年退化性硬化

C．动脉粥样硬化

D．动脉中层硬化 E．小动脉硬化

正确答案：A

解析：动脉硬化通常包括动脉粥样硬化、动脉中层硬化、老年退化性硬化、小动脉硬化 4 种。

38．　以下对细菌的描述不正确的有
A．为真核细胞型微生物
B．以二分裂方式进行繁殖
C．有细胞壁、细胞膜、细胞质和核质
D．有较完善的生物代谢系统 E．可分需氧菌和厌氧菌

正确答案：A
解析：细菌为原核细胞型微生物，其基本结构有细胞壁、细胞膜、细胞质和核质。细菌有较完善的生物代谢系统，以二分裂方式进行繁殖。根据细胞膜上是否有完善的呼吸链系统，细菌可分需氧菌和厌氧菌。

39．　表面麻醉剂一般不用于
A．去除角膜异物
B．眼底镜检查
C．前房角镜检查
D．三面镜检查 E．测量眼压

正确答案：B
解析：表面麻醉剂可用于去除角膜异物、前房角镜检查、三面镜检查、测量眼压等检查。眼底镜检查不需表面麻醉。

40．　关于糖尿病性视网膜病变的微血管瘤正确的是
A．中期的特征性眼科所见
B．多分布在鼻侧
C．大小、形态一致
D．位于视网膜内核层 E．荧光血管造影不可发现

正确答案：D
解析：微血管瘤用检眼镜和荧光血管造影的方法可以检查出最早期的糖尿病性视网膜病变，这种改变虽然可见于高血压或视网膜静脉阻塞等视网膜病变，但以糖尿病视网膜病变发生率最高，数量也最多，颇具有特征性。微动脉瘤通常先见于视网膜内核层，逐渐扩散至内网状层，常表现为圆形红色小点，类似于视网膜深层的小出血点，常先出现在眼底后极部，尤其在黄斑区，并多在颞侧。随病程延长，则分布于视网膜各处并常常密集成群。

41．　不符合真菌特点的是
A．属真核细胞微生物
B．对石炭酸较敏感
C．正常情况不致病
D．对干燥耐受性差 E．对紫外线耐受性强

正确答案：D

解析：真菌是以寄生或腐生方式大量存在于自然界的真核细胞微生物。对于干燥、紫外线的耐受性较强，对于石炭酸、碘酊、升汞及甲醇较敏感。正常情况下不致眼病，完整的眼黏膜上皮屏障对外来真菌有明显的抑制作用。

42． 流行病学研究中病例报告属于

A．分析性研究

B．观察性研究

C．描述性研究

D．队列研究 E．实验性研究

正确答案：C

解析：流行病学研究分：为描述性研究和分析性研究两大类。描述性研究的主要种类有病例报告、疾病发生的流行病学描述、描述性横断面研究或社区普查。分析性研究分为观察性研究和实验性研究两大类。常用的观察性研究有、分析性横断面研究、病例对照研究、队列研究。

43． 下列有关人类免疫缺陷病毒(HIV)错误的描述有

A．继发多系统疾病

B．致机体免疫功能抑制

C．感染的靶细胞主要是 B 淋巴细胞

D．为单链 RNA 病毒 E．继发恶性肿瘤

正确答案：C

解析：HIV 为单股 RNA 逆转录病毒，对细胞膜有 CD4 受体的细胞有亲和力，主要感染 T 细胞亚群中 T 辅助细胞(TH)。机体感染 HIV 后，出现严重免疫系统损害，以细胞免疫缺陷为主，常合并恶性肿瘤。

44． 先天性梅毒的眼部表现不包括

A．基质性角膜炎

B．角膜新生血管

C．虹膜睫状体炎

D．视力下降 E．视网膜脱离

正确答案：E

解析：先天性梅毒的眼部表现有：①基质性角膜炎；②虹膜睫状体炎、葡萄膜炎；③脉络膜视网膜炎；④视神经炎、视神经周围炎、视神经视网膜炎、视神经萎缩；⑤斜视、上睑下垂、瞳孔异常；⑥单纯性结膜炎、巩膜炎、上巩膜炎等。

45． 使用标准差和均数可全面描述以下何种资料的分布特征

A．正态分布

B．对称分布

C．右偏态分布

D．左偏态分布 E．中间分布

正确答案：A
解析：使用标准差和均数可全面描述正态分布资料的分布特征。

46． 关于病例对照研究不正确的是
A．是回顾性观察性研究
B．是“从因到果”的研究
C．研究效率相对高
D．所需样本相对少 E．适于研究潜伏期长的疾病

正确答案：B
解析：病例对照研究：比较一组患者(研究性)与一组或几组未患此病者(对照组)的过去或现在的暴露危险因素，从中分析危险因素与发病及联系程度，以便确定病因，是从“果”到“因”的研究，是回顾性研究，优点是适于研究潜伏期长的疾病，所需要样本相对少，研究效率相对高。

47． 视网膜动脉对高血压的反应不正确的为
A．血管痉挛
B．动脉壁纤维化
C．动脉反光增强
D．小动脉口径增大 E．视网膜棉绒斑

正确答案：D
解析：在病程的早期，升高的血压刺激柔软和未硬化的视网膜动脉血管，经自我调节作用使其张力增高。视网膜血管愈年轻和富有弹性，这种反应愈大，表现为血管收缩而出现视网膜动脉痉挛、局限性狭窄，若病程持久则出现普遍性狭窄；高血压再继续持续一段时间则发生动脉硬化改变，表现为动脉变狭窄，动脉管壁反光增强，管壁肌纤维渐有透明样变和纤维化；病变持续进展，视网膜的灌注压已超出其生理性自我调节机制，导致了血一视网膜屏障破坏，从循环系统中漏出液体和血细胞，血管壁破损和血流异常，常发生缺血，表现为视网膜出血、硬性蜡样渗出、棉绒斑。

48． 以下关于色苷酸钠滴眼液不正确的说法为
A．可阻止组织胺释放
B．可治疗过敏性结膜炎
C．可抑制过敏原诱发的肥大细胞脱颗粒
D．可完全替代糖皮质激素 E．可用于治疗春季卡他性结膜炎

正确答案：D
解析：色苷酸钠可抑制过敏原诱发的肥大细胞脱颗粒，阻止组胺释放，2%～4%色苷酸钠滴眼液可用于治疗春季卡他性结膜炎和过敏性结膜炎，可减少眼部滴用糖皮质激素的频度，并具有毒副作用低的优点。

49． 下述关于白化病的特点不正确的为

A．常染色体隐性遗传
B．眼部可见羞明
C．视力下降
D．氨基酸代谢障碍 E．眼底色素沉着

正确答案：E
解析：白化病是一种常染色体隐性遗传的氨基酸代谢异常所引起的疾病。因缺乏酪氨酸酶，导致黑色素生成障碍。眼部表现为畏光、视力差、眼震、虹膜薄、色灰兰、瞳孔透红光，眼底呈不同程度晚霞样改变。

50． 以下关于单纯疱疹病毒不正确的描述有
A．初次感染后处于潜伏状态
B．动物是 HSV 的自然宿主
C．可造成角膜感染
D．主要有 HSV-I 和 HSV-Ⅱ两种血清型 E．原发感染常见于幼儿

正确答案：B
解析：根据生物学及免疫学特征，HSV 有 HSV-I、HSV-Ⅱ两种主要的血清型。人是 HSV 的自然宿主，初次感染在 6 个月至 5 岁之间发生，初次感染后病毒处于潜伏状态，80％以上的成年人曾有过感染，但多数无明显的临床症状。HSV 可造成眼睑、结膜、角膜、葡萄膜、小梁组织及视网膜等组织的感染。

患者，男，25 岁。反复发生虹膜睫状体炎与前房积脓，有口腔溃疡及阴部溃疡。

51． 可能性最大的诊断是
A．寻常性天疱疮
B．Behcet 病
C．Graves 病
D．急性风湿热 E．Reiter 综合征

正确答案：B
解析：Behcet 病四项主要指征是：①反复发作的口腔黏膜溃疡；②皮肤结节样红斑，皮下栓塞性静脉炎及皮肤刺激过敏等；③生殖器溃疡；④复发性前房积脓性虹膜睫状体炎和(或)脉络膜炎等。

52． 合适的治疗
A．青霉素
B．土霉素
C．糖皮质激素
D．多黏菌素 E．金霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448011123125006036