

学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

药理学考试题含答案

1、合成去甲肾上腺素的限速酶

- A、儿茶酚氧位甲基转移酶
- B、多巴胺脱羧酶
- C、酪氨酸羟化酶
- D、单胺氧化酶
- E、苯乙醇胺-N-甲基转移酶

答案：C

2、对支气管哮喘和心源性哮喘都适用的平喘药物是

- A、异丙肾上腺素
- B、氨茶碱
- C、吗啡
- D、肾上腺素
- E、异丙托溴铵

答案：B

3、糖皮质激素对血液成分的影响正确的描述是

- A、减少血中中性粒细胞数
- B、减少血中红细胞数
- C、抑制红细胞在骨髓中生成
- D、减少血中淋巴细胞数
- E、血小板数减少

答案：D

4、沙丁胺醇治疗哮喘的作用机制是

- A、激动 β_1 受体
- B、激动 β_2 受体
- C、阻断 β_1 受体
- D、阻断 β_2 受体
- E、阻断 M 受体

答案：B

5、吗啡中毒的解救用药为

- A、纳洛酮
- B、美沙酮
- C、肾上腺素
- D、去甲肾上腺素
- E、尼可刹米

答案：A

6、毛果芸香碱引起调节痉挛的原因是

- A、兴奋虹膜括约肌上的 M 受体
- B、兴奋虹膜辐射肌上的 M 受体
- C、兴奋睫状肌上的 M 受体
- D、兴奋睫状肌上的 N 受体
- E、兴奋虹膜辐射肌上的 N₂ 受体

答案：C

7、严重肝功能不全的病人不宜用

- A、氢化可的松
- B、甲泼尼松龙
- C、泼尼松龙
- D、泼尼松
- E、地塞米松

答案：D

8、磺胺嘧啶的主要特点是

- A、杀菌药
- B、血浆蛋白结合率高
- C、脑脊液中药物浓度高
- D、与 TMP 合用产生拮抗作用
- E、以上都不是

答案：C

9、茶碱的作用不包括

- A、松弛支气管平滑肌
- B、兴奋心肌
- C、兴奋中枢
- D、抗炎作用
- E、肥大细胞膜稳定作用

答案：E

10、长期应用糖皮质激素后，突然停药所产生的反跳现象是由于病人

- A、对糖皮质激素产生了耐药性
- B、对糖皮质激素产生了依赖或病情未能完全控制
- C、肾上腺皮质功能亢进
- D、肾上腺皮质功能减退
- E、ACTH 分泌减少

答案：B

11、机体内参与药物代谢的主要酶系统是

- A、辅酶 II
- B、胆碱酯酶
- C、单胺氧化酶
- D、细胞色素 p450 酶系统
- E、磷酸化酶

答案：D

12、能妨碍利福平吸收的药物是

- A、链霉素
- B、异烟肼
- C、丙硫异烟胺
- D、乙胺丁醇
- E、对氨基水杨酸

答案：E

13、小剂量激动 D1 受体和 β_1 受体，大剂量激动 α_1 受体的药物是

- A、多巴胺
- B、多巴酚丁胺
- C、去甲肾上腺素
- D、麻黄碱
- E、去氧肾上腺素

答案：A

14、治疗阿米巴肝脓肿的首选药是

- A、甲硝唑
- B、氯喹
- C、奎宁
- D、喹碘方
- E、依米丁

答案：A

15、利福平与下列药物合用时，应间隔 8~12 小时的是

- A、异烟肼
- B、利福定
- C、链霉素
- D、对氨基水杨酸
- E、乙胺丁醇

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/455002323243011221>