

助理医师资格《口腔助理医师》测试试卷（附答案）

一、单项选择题（共 130 题，每题 1 分）。

1、胃癌最常发生的转移途径是

- A、直接蔓延
- B、血行转移
- C、种植转移
- D、淋巴转移
- E、沿肠管转移

【参考答案】D

2、患儿，精神较差，面色萎黄，厌食、拒食，进食稍多则大便夹有残渣，容易出汗，舌苔薄白，及脉无力。治法是

- A、健脾益气
- B、养胃育阴
- C、调脾助运
- D、和脾消积
- E、以上都不是

【参考答案】A

3、患者，肠胃燥热，脾津不足，大便秘结，小便频数，舌苔微黄。辨证为脾约证。方剂宜选用

- A、济川煎
- B、十枣汤
- C、舟车丸
- D、温脾汤
- E、麻子仁丸

【参考答案】E

4、如下除哪项外是左心衰的临床表现

- A、劳力性呼吸困难
- B、阵发性夜间呼吸困难
- C、端坐呼吸
- D、带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- E、粉红色泡沫样痰

【参考答案】D

5、治疗婴幼儿腹泻伤食证，应首选

- A、四君子汤
- B、保和丸
- C、葛根芩连汤
- D、藿香正气散
- E、附子理中汤

【参考答案】B

6、患者，女，31岁。大便溏泻，纳谷不香，心悸失眠，用药宜首选()

- A、莲子
- B、芡实
- C、金樱子
- D、山药
- E、磁石

【参考答案】A

7、以下何项不是 H1 受体阻滞药的临床应用 ()

- A、放射病呕吐
- B、过敏性休克
- C、失眠
- D、过敏性鼻炎
- E、荨麻疹

【参考答案】B

8、动脉硬化性闭塞症多发于 ()

- A、20~40 岁男性
- B、20~40 岁女性
- C、20~25 岁男性
- D、20~25 岁女性
- E、45 岁以上男性

【参考答案】E

9、神经衰弱会出现

- A、自主神经功能紊乱
- B、中枢神经功能紊乱
- C、迷走神经功能紊乱
- D、周围神经功能紊乱
- E、以上都不是

【参考答案】A

10、病理性黄疸，下列说法错误的是

- A、黄疸出现时间较早或太晚

- B、黄疸持续时间较短
- C、黄疸进展快
- D、有伴随症状
- E、黄疸程度较重

【参考答案】B

11、临床出现自汗、多尿、出血、遗精等症，是气的哪一种功能减退的表现

- A、推动作用
- B、温煦作用
- C、防御作用
- D、气化作用
- E、固摄作用

【参考答案】E

12、小儿感冒容易出现兼证，多见

- A、挟火、挟痰、挟湿
- B、挟火、挟痰、挟滞
- C、挟风、挟痰、挟滞
- D、挟惊、挟痰、挟滞
- E、挟湿、挟惊、挟滞

【参考答案】D

13、既能消食，又能活血化瘀的药物是

- A、山楂
- B、建曲

- C、麦芽
- D、鸡内金
- E、莱菔子

【参考答案】A

14、患心痹多年，症见心悸，气促，动则尤甚，头晕，神疲乏力咳嗽，颧颊暗红，唇甲紫暗夜寐不安。舌青紫，脉结。治宜

- A、补益心气，活血化瘀
- B、温补心阳，活血化瘀
- C、温阳利水，活血化瘀
- D、温补脾胃，活血化瘀
- E、健脾益气，益肺平喘

【参考答案】A

15、患者陈某，产后血虚受寒，恶露不尽，少腹冷痛，治宜选用()

- A、少腹逐瘀汤
- B、失笑散
- C、生化汤
- D、当归补血汤
- E、温经汤

【参考答案】C

16、患者，女，28岁。口气浊臭，脘腹胀满，不思饮食，呕恶欲吐，大便溏泻，舌质红，舌苔黄厚而腻，脉象润滑，用药宜首选()

- A、苍术
- B、厚朴
- C、佩兰

D、藿香

E、砂仁

【参考答案】C

17、可作“崩漏”诊断的疾病是()

A、分娩后阴道大量出血

B、妊娠后阴道大量出血

C、患子宫肌瘤后阴道大量出血

D、带下色红，淋漓不断

E、以上均不可

【参考答案】E

18、下列叙述错误的是()

A、腹壁静脉曲张可见于上腔静脉梗阻

B、腹壁静脉曲张可见于下腔静脉梗阻

C、腹壁静脉曲张可见于门静脉受阻

D、腹壁静脉曲张可见于肾动脉狭窄

E、门静脉高压时在脐部可听到“营营”音

【参考答案】D

19、生殖器的邻近器官以下正确的是

A、包括阑尾

B、乙状结肠与子宫相邻

C、包括输尿管

D、子宫和阴道均与直肠相邻

E、子宫前邻近膀胱、尿道

【参考答案】D

20、下列哪项不是白术的功效()

- A、益气健脾
- B、益气止汗
- C、燥湿利水
- D、补气安胎
- E、化痰止咳

【参考答案】E

21、初孕妇初感胎动时间一般在

- A、妊娠 12~14 周
- B、妊娠 14~16 周
- C、妊娠 18~20 周
- D、妊娠 20~24 周
- E、妊娠 28 周以上

【参考答案】C

22、麻黄宜用于

- A、肺气不足喘促短气
- B、肾不纳气动则喘甚
- C、脾湿痰壅喘咳胸闷
- D、肺气不宜喘咳气急
- E、以上均非

【参考答案】D

23、慢性肾小球肾炎的中医病因病机有

- A、脾虚湿困
- B、肾气亏虚
- C、肝肾阴虚
- D、湿热蕴结
- E、以上均是

【参考答案】E

24、关于阴道脱垂的说法错误的是()

- A、分为阴道前壁脱垂和后壁脱垂
- B、可无临床症状
- C、脱垂的膀胱随阴道前壁向下突出仍位于阴道内为Ⅱ度后壁脱垂
- D、阴道前壁脱垂腹压增加时常有尿液溢出
- E、本病以手术治疗为主

【参考答案】C

25、鼻渊的主要特征是()

- A、鼻流清涕
- B、鼻翼煽动
- C、偶流浊涕
- D、浊涕腥臭
- E、鼻腔出血

【参考答案】D

26、患者男性，25岁，排便后肛门疼痛3个月，大便出血，有便秘史1年，诊断首先应考虑()

- A、血栓性外痔

- B、肛裂
- C、肛隐窝炎
- D、肛周脓肿
- E、肛周感染

【参考答案】B

27、患者，女，25岁，未婚。每次行经期间，小腹冷痛拒按，得热则舒，月经量少，色黯有块，畏寒身痛，舌淡黯，苔白腻，脉沉紧。其中医治法是

- A、理气活血，化瘀止痛
- B、理气行滞，化瘀止痛
- C、疏肝行气，缓急止痛
- D、温经祛寒，活血止痛
- E、益气补血，活血止痛

【参考答案】D

28、硬膜外阻滞麻醉的适应证不包括

- A、横膈以下的腹部手术
- B、腰部手术
- C、下肢手术
- D、脊椎结核
- E、上肢手术

【参考答案】D

29、用于寒病见寒象的治疗原则是

- A、寒者热之
- B、热者寒之

- C、虚则补之
- D、寒因寒用
- E、以上均不是

【参考答案】A

30、针灸治疗腰痛的主穴是()

- A、委中、昆仑、太溪
- B、阿是穴、肾俞、太溪
- C、阿是穴、大肠俞、委中
- D、阿是穴、背俞穴、太溪
- E、命门、昆仑、委中

【参考答案】C

31、引起非淋菌性尿道炎的病原体是

- A、沙眼衣原体及解脲支原体
- B、阴道滴虫
- C、白色念珠菌
- D、兰氏鞭毛虫
- E、以上答案均正确

【参考答案】E

32、患儿感冒，证见发热轻，咳嗽重，微恶寒，有汗头痛，鼻塞流涕，咽红，舌苔薄黄，脉浮稍数。适用方剂是

- A、桂枝汤
- B、麻黄汤
- C、银翘散

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

D、桑菊饮

E、桑杏汤

【参考答案】D

33、木火刑金的咳血，治疗首选

A、龙胆泻肝汤

B、四生丸

C、泻白散

D、咳血方

E、凉膈散

【参考答案】D

34、温脾汤与败毒散共有的药物是

A、当归

B、川芎

C、枳壳

D、人参

E、桔梗

【参考答案】D

35、患者，女，35岁，已婚。患子宫肌瘤2年，精神抑郁，经前乳房胀痛，胸胁胀闷，心烦易怒，小腹胀痛，时有刺痛，舌边有瘀点苔白，脉细弦。治疗应首选

A、桂枝茯苓丸

B、膈下逐瘀汤

C、少腹逐瘀汤

D、补阳还五汤

E、逐瘀止血汤

【参考答案】B

36、脾虚气滞，寒热互结，心下痞满，不欲饮食，倦怠乏力，大便不调者，治宜选用()

A、健脾丸

B、半夏泻心汤

C、枳实消痞丸

D、旋覆代赭汤

E、枳实导滞丸

【参考答案】C

37、叩诊发现心影呈梨形增大，是由于()

A、右室、左室增大

B、左房增大

C、左房增大，肺动脉段膨出

D、右室、右房增大

E、左室增大，主动脉弓突出

【参考答案】C

38、胆怯易惊，虚烦不宁，失眠多梦，呕吐呃逆，癫痫；方剂选用

A、滚痰丸

B、温胆汤

C、二陈汤

D、止嗽散

E、桂枝汤

【参考答案】B

39、病人，男，16岁。因多饮、多尿伴消瘦乏力1个月就诊。检查：空腹血糖 16.3mmol/L ，空腹胰岛素水平 0.72mmol/L 。诊断为胰岛素依赖型糖尿病。治疗应首选

- A、先用磺脲类降糖药
- B、应用免疫抑制剂
- C、首先饮食控制4周
- D、立即开始胰岛素治疗
- E、先用双胍类降糖药

【参考答案】D

40、术前常规禁食的主要目的是

- A、避免胃膨胀而妨碍手术
- B、防止术后腹胀
- C、防止围手术期的呕吐及误吸
- D、防止术后肠麻痹
- E、防止术后便秘

【参考答案】C

41、证实体内红细胞生成所需铁开始减少的是

- A、血清铁减少
- B、血清铁蛋白减低
- C、血清总铁结合力增高
- D、红细胞游离原卟啉增高
- E、血象可见血红蛋白降低

【参考答案】D

42、五积散与防风通圣散二方中含有的相同药物是

- A、麻黄、防风、白芷
- B、荆芥、桔梗、枳壳
- C、白术、厚朴、甘草
- D、当归、川芎、芍药
- E、大黄、干姜、肉桂

【参考答案】A

43、女，54 岁。突然出现言语不清，右侧肢体无力 6 小时。体检：运动性失语，右鼻唇沟浅，伸舌偏右，右侧肢体肌张力低，肌力 2 级，病理反射未引出。血压 160 / 90mmHg，心率 80 次 / 分。有冠心病、房颤、糖尿病史多年。此时的处理为

- A、使用止血剂
- B、20%的甘露醇，辅以预防性抗感染治疗
- C、使用辅酶 A，ATP
- D、华法令抗凝治疗
- E、溶栓治疗

【参考答案】B

44、患者张某。女性，21 岁，甲状腺肿大半年，有时心悸、多汗、食欲亢进、大便次数增多每天 2~3 次，查甲状腺 II 度肿大，无触痛，可闻及血管杂音，¹³¹I 摄取率 3 小时 25%，24 小时，75%，T3 抑制实验抑制率 50%。治疗首选()

- A、立即手术治疗、
- B、普萘洛尔
- C、他巴唑
- D、复方碘液

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

E、放射性核素治疗

【参考答案】C

45、既能够治疗胸痹结胸，又能够治疗肺热咳嗽的药物是()

A、半夏

B、瓜蒌

C、薤白

D、桂枝

E、枳实

【参考答案】B

46、患儿，女，1岁。多汗夜惊，烦躁不安数日，现筋骨萎弱，立迟行迟，肋串明显，鸡胸，面色不华，全身乏力，舌淡苔白，指纹淡。查：血钙磷乘积明显降低，碱性磷酸酶明显增高。其病证诊断应为()

A、佝偻病活动早期，肾精亏损型

B、佝偻病活动早期，肺脾气虚弱

C、佝偻病活动期，肾精亏损型

D、佝偻病活动期，肾虚骨弱型

E、佝偻病后遗症期，肾虚骨弱型

【参考答案】B

47、十二指肠球部溃疡的直接x线征象是()

A、球部变形

B、球部激惹征

C、穿孔

D、龛影

E、肠腔狭窄

【参考答案】D

48、滑胎的主要证型有()

- A、肾气亏损与气血两虚
- B、气虚与血虚
- C、脾肾两虚与瘀痕伤胎
- D、脾虚与肾虚
- E、脾肾两虚与瘀血阻滞

【参考答案】A

49、下列哪项符合胆道蛔虫病的早期体征

- A、剑突右下方明显压痛，轻度肌紧张和反跳痛
- B、剑突右下方明显压痛，伴寒热和黄疸
- C、剑突右下方轻压痛，无肌紧张和反跳痛
- D、剑突右下方明显压痛，显著肌紧张和反跳痛
- E、剑突右下方明显压痛，肝区明显叩痛

【参考答案】C

50、主要体现按五行学说确立抑强扶弱兼用治则的治法是

- A、抑木扶土法
- B、佐金平木法
- C、培土制水法
- D、泻南补北法
- E、以上都不是

【参考答案】A

51、气血虚弱型痛经首选方是

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

- A、八珍益母汤
- B、人参养荣汤
- C、归脾汤
- D、补中益气汤
- E、滋血汤

【参考答案】A

52、下列治风湿热痹的最佳选药是

- A、防己
- B、独活
- C、羌活
- D、桑寄生
- E、威灵仙

【参考答案】A

53、下列哪项不是环孢霉素 A 的不良反应

- A、高血压
- B、肝肾毒性
- C、高尿酸血症
- D、出血性膀胱炎
- E、多毛、齿龈增生

【参考答案】D

54、维生素 D 缺乏性手足搐搦症发病时间是()

- A、1~5 个月以下
- B、常见 6 个月以上

C、1～3 岁

D、3～5 岁

E、5～7 岁

【参考答案】B

55、小儿指纹色青者，多见于()

A、外感表证

B、热证

C、惊风

D、气血两虚

E、食积

【参考答案】C

56、首次产前检查，下列哪个时间最合适()

A、妊娠 6 周

B、妊娠 12 周

C、妊娠 14 周

D、妊娠 20 周

E、确诊早孕时

【参考答案】E

57、由茯苓、白术、白芍、生姜、炮附子组成的方剂名为

A、实脾散

B、真武汤

C、理中丸

D、五苓散

E、济生肾气丸

【参考答案】B

58、IgM增高常见于()

A、类风湿性关节炎

B、支气管哮喘

C、多发性骨髓瘤

D、巨球蛋白血症

E、获得性体液免疫缺陷病

【参考答案】D

59、为观察肾的分泌排泄功能应做的检查是()

A、静脉胆道造影

B、口服胆囊造影

C、T管造影

D、静脉肾盂造影

E、逆行肾盂造影

【参考答案】D

60、下列哪项不属于局部麻醉

A、表面麻醉

B、局部浸润麻醉

C、硬膜外麻醉

D、区域阻滞

E、神经阻滞

【参考答案】C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/455022232002012040>