

2023-24 年广西壮族自治区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题真题【名师系列】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 维生素 C 缺乏时引起

- A: 脚气病
- B: 坏血病
- C: 角膜软化症
- D: 成人佝偻病

答案：B

2. 通过降低血管平滑肌内钠离子浓度，使细胞内钙离子减少的是

- A: 肼屈嗪
- B: 拉贝洛尔
- C: 卡托普利
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

3. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是

- A: 对于不同的手术，选择疗程不同
- B: 用药过量可导致出血并发症
- C: 用药期间需定期测定血红蛋白
- D: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药

答案：D

4. 具有缩小皮脂腺，抑制皮脂腺活性，减少皮脂分泌的药物()

- A: 异维 A 酸
- B: 壬二酸
- C: 阿达帕林
- D: 维 A 酸

答案: A

5. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别骨髓抑制较严重的是

- A: 奥沙利铂
- B: 亚叶酸钙
- C: 卡铂
- D: 顺铂

答案: C

6. 患者，女性，57 岁。高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 苯妥英钠
- D: 阿托品

答案: D

7. 可拮抗阿托品所致的心动过速的是

- A: 地高辛
- B: 普萘洛尔
- C: 地尔硫卓
- D: 美西律

答案：C

8. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

- A: 异维 A 酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 阿达帕林
- D: 维 A 酸

答案：A

9. (2018 年真题) 同时具有短效和长效(双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 普通胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液
- C: 精蛋白锌胰岛素注射液
- D: 预混胰岛素注射液

答案：D

10. 磺胺的抗菌机制是

- A: 抑制细菌细胞壁的合成
- B: 影响叶酸代谢
- C: 抑制蛋白质合成的全过程
- D: 影响胞浆膜的通透性

答案：B

11. 易在甲状腺功能减退患者体内蓄积的药物是()

- A: 利多卡因
- B: 阿托品
- C: 洋地黄毒苷

D: 哌替啶

答案: C

12. 以下适应证与其他四个药物不同的是

A: 联苯苄唑

B: 克霉唑

C: 特比萘芬

D: 制霉菌素

答案: D

13. 维生素 C 的主要适应证是

A: 治疗厌食症

B: 治疗脂溢性皮炎

C: 治疗佝偻病

D: 防治坏血病

答案: D

14. 治疗血吸虫病宜选用

A: 甲苯咪唑

B: 氯喹

C: 甲硝唑

D: 吡喹酮

答案: D

15. 促进尿酸排泄的抗痛风代表药物是

A: 别嘌醇

B: 丙磺舒

C: 塞来昔布

D: 扑热息痛

答案：B

16. (2016 年真题) 属于碳青霉烯类

A: 头孢吡肟

B: 亚胺培南

C: 头孢美唑

D: 氨曲南

答案：B

17. (2016 年真题) 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

A: 二甲双胍

B: 艾塞那肽

C: 那格列奈

D: 阿卡波糖

答案：D

18. 与氯霉素特点不符的是()

A: 适用于伤寒的治疗

B: 口服难吸收

C: 骨髓毒性明显

D: 易透过血脑屏障

答案：B

19. 属于浓度依赖性抗菌药物的是

A: 头孢西丁

B: 氨曲南

C: 庆大霉素

D: 拉氧头孢

答案：C

20. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

A: 与细菌 50S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

B: 干扰细菌细胞壁合成

C: 与细菌 30S 核糖体结合，抑制蛋白质合成

D: 干扰 DNA 的合成

答案：B

21. （2021 年真题）作用机制为抑制合成嘧啶的二氢乳酸脱氢酶，半衰期较长，建议间隔 24 小时给药一次的慢作用抗风湿药物是（）

A: 柳氮磺吡啶

B: 来氟米特

C: 甲氨蝶呤

D: 羟氯喹

答案：B

22. 改善心肌收缩功能，抑制血管肥厚，可以降低血管僵硬程度，改善动脉顺应性抗高血压药是

A: α 受体激动药

B: 利尿降压药

C: 钙离子通道阻滞药

D: 血管紧张素转换酶抑制药

答案：D

23. 甲状腺素的合成需要（）

- A: 蛋白水解酶
- B: 过氧化物酶
- C: 环氧化酶
- D: 碳酸酐酶

答案：B

24. 下列与激素水平无关的肿瘤是()

- A: 乳腺癌
- B: 甲状腺癌
- C: 小细胞肺癌
- D: 前列腺癌

答案：C

25. 可导致新生儿药物性黄疸的是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 头孢他啶
- C: 林可霉素
- D: 阿莫西林

答案：A

26. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素 (NA) 再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 度洛西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 舍曲林

答案：B

27. 下列不属于一线抗结核药的是

- A: 乙硫异烟胺
- B: 吡嗪酰胺
- C: 利福平
- D: 链霉素

答案：A

28. 肝素最大作用时间是

- A: 2min
- B: 5~7 天
- C: 6 天
- D: 3 天

答案：A

29. 不易发生耐药株，是目前治疗原虫和厌氧菌的重要药物是

- A: 克林霉素
- B: 甲硝唑
- C: 呋喃妥因
- D: 多黏菌素

答案：B

30. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 甘精胰岛素注射液
- B: 预混胰岛素注射液
- C: 普通胰岛素注射液
- D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：C

31. 下列哪种头孢菌素为口服剂型

- A: 头孢吡肟
- B: 头孢克洛
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢替安

答案：B

32. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪
- B: 硝酸甘油+美托洛尔
- C: 利血平+氨苯蝶啶
- D: 氨氯地平+氢氯噻嗪

答案：D

33. 属于低危患者可应用 PDE5 抑制剂的是

- A: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- B: 高血压未得到控制者
- C: 轻度、稳定型心绞痛
- D: 中度的充血性心力衰竭

答案：C

34. 属于短效 β_2 受体激动剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 异丙托溴铵

C: 噻托溴铵

D: 特布他林

答案: D

35. 有关阿莫西林特点的说法正确的是()

A: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

B: 口服吸收差，生物利用度小

C: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

D: 耐酸、耐酶

答案: C

36. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

A: 定向力障碍

B: 血尿酸升高

C: 低镁血症

D: 血糖升高

答案: C

37. 连续使用应间隔 4 小时以上()

A: 羟甲唑啉

B: 赛洛唑啉

C: 酚甘油滴耳液

D: 麻黄碱

答案: A

38. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

A: 第二代头孢菌素

- B: 第四代头孢菌素
- C: 第一代头孢菌素
- D: 第三代头孢菌素

答案：B

39. 顺铂

- A: 直接破坏 DNA 结构和功能
- B: 干扰核酸生物合成
- C: 干扰 RNA 转录
- D: 影响蛋白质合成和功能

答案：A

40. 又称为腺嘌呤，是生物体内辅酶与核酸的组成和活性成分，具有刺激骨髓白细胞增生作用的是

- A: 维生素 B4
- B: 丙酸诺龙
- C: 鲨肝醇
- D: 小檗胺

答案：A

41. 纳洛酮治疗的疾病或症状有

- A: 失眠
- B: 惊厥
- C: 阿片中毒
- D: 剧烈疼痛

答案：C

42. 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是()。

- A: 罗红霉素
- B: 利奈唑胺
- C: 头孢他啶
- D: 头孢曲松

答案：C

43. 关于硫黄软膏治疗疥疮的用法，错误的是

- A: 对顽固患者必需 3 个疗程方能根治
- B: 密切接触者应同时接受治疗
- C: 用药期间应勤用热水洗澡
- D: 儿童可使用 5% 的软膏

答案：C

44. 属于利胆类保肝药的是

- A: 熊去氧胆酸
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 甘草酸二铵
- D: 还原型谷胱甘肽

答案：A

45. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

- A: 新霉素
- B: 卡那霉素
- C: 妥布霉素
- D: 链霉素

答案：A

46. 低剂量用药时对中枢和外周多巴胺 D₂，受体有拮抗作用，而高剂量用药时有较弱的 5-HT₂受体阻断作用，可用于化疗所致恶心呕吐的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 氯丙嗪
- C: 劳拉西泮
- D: 帕洛诺司琼

答案：A

47. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

- A: 放射性碘
- B: 甲状腺素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 糖皮质激素

答案：B

48. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素
- C: 红霉素
- D: 克林霉素

答案：C

49. 氨苄西林()

- A: 对 G⁺
- B: 抗菌作用强，对厌氧菌有效
- C: 对 G⁻
- D: 特别对铜绿假单胞菌有效

答案：C

50. 抑制核苷酸还原酶

- A: 阿糖胞苷
- B: 甲氨蝶呤
- C: 羟基脲
- D: 氟尿嘧啶

答案：C

51. 作用于髓袢升支粗段的利尿剂是

- A: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂
- B: 袢利尿剂
- C: 碳酸酐酶抑制剂
- D: 醛固酮受体阻断剂

答案：B

52. 可用于烧伤及伤后感染的是()

- A: 磺胺米隆
- B: 磺胺嘧啶
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 柳氮磺吡啶

答案：B

53. 多柔比星

- A: 干扰核酸生物合成
- B: 干扰 RNA 转录
- C: 影响蛋白质合成和功能
- D: 直接破坏 DNA 结构和功能

答案：B

54. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 抗菌谱与青霉素相似但略广
- B: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- C: 具有肝脏毒性
- D: 属繁殖期杀菌剂

答案：D

55. (2017 年真题) 用药时需关注肺毒性的药物是 ()

- A: 长春新碱
- B: 紫杉醇
- C: 柔红霉素
- D: 博来霉素

答案：D

56. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。

医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 克拉霉素
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 硝苯地平缓释片

D: 埃索美拉唑钠

答案：D

57. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

A: 吲哚关辛

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 塞来昔布

答案：C

58. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是

A: 苯唑西林

B: 匹氨西林

C: 青霉素 V

D: 美西林

答案：D

59. 治疗酮症酸中毒及糖尿病昏迷的药物是

A: 罗格列酮

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: 氢氧化镁

答案：B

60. 以肠内营养乳剂（TPF-D）作为唯一营养来源的患者，推荐剂量为一日

A: 10ml/kg

B: 40ml/kg

C: 30ml/kg

D: 20ml/kg

答案：C

61. 抗酸作用较强、较慢，有导泻作用的是

A: 碳酸钙

B: 氢氧化铝

C: 氢氧化镁

D: 三硅酸镁

答案：C

62. 患者，男，52 岁，BMI28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚 8 点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

A: 碳酸氢钠

B: 别嘌醇

C: 秋水仙碱

D: 非布司他

答案：C

63. 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

A: 拉坦前列素

B: 毛果芸香碱

C: 地匹福林

D: 噻吗洛尔

答案：C

64. 可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

- A: 阿昔莫司
- B: 利血平
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 依折麦布

答案：A

65. 长期大量服用维生素 E 会出现

- A: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- B: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- C: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

答案：C

66. （2016 年真题）哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 吸入性糖皮质激素
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 短效 β_2 受体激动剂

答案：D

67. 阿司匹林与华法林合用

- A: 心源性水肿
- B: 头晕、头痛、血压下降
- C: 诱发胃肠道溃疡出血
- D: 抗凝血作用增强

答案：D

68. 心律失常者慎用的治疗浅表真菌感染的药物是

- A: 制霉菌素
- B: 益康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 咪康唑

答案：D

69. 属于甲状腺激素类药的是

- A: 生长抑素
- B: 醋酸去氨加压素
- C: 左甲状腺素
- D: 甲巯咪唑

答案：C

70. 治疗脑水肿、降低颅内压的首选药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 螺内酯
- C: 阿米洛利
- D: 甘露醇

答案：D

71. 为高渗溶液，静脉给药后可提高血浆渗透压的药物是

- A: 螺内酯
- B: 甘油果糖
- C: 甘露醇
- D: 阿米洛利

答案：C

72. 患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

- A: 赖诺普利
- B: 巴达帕胺
- C: 普萘洛尔
- D: 氨氯地平

答案：C

73. 舒张支气管作用比 β_2 受体激动剂弱且慢，但不易产生耐受性，适用于有吸烟史的老年哮喘患者的药物是

- A: 沙丁胺醇
- B: 噻托溴铵
- C: 孟鲁司特
- D: 吸入性糖皮质激素

答案：B

74. (2016 年真题) 抗乙型肝炎病毒的药品是

- A: 伊曲康唑
- B: 利巴韦林
- C: 拉米夫定
- D: 奥司他韦

答案：C

75. 属于 PD-1 抑制剂，用于食管癌的二线治疗的抗肿瘤药是()

- A: 氟尿嘧啶
- B: 巯嘌呤

C: 纳武利尤单抗

D: 环磷酰胺

答案: C

76. 影响毛细血管通透性的促凝血药是

A: 维生素 K

B: 血凝酶

C: 鱼精蛋白

D: 卡巴克络

答案: D

77. 左炔诺孕酮为

A: 雌激素类

B: 促性腺激素

C: 短效口服避孕药

D: 促性腺激素释放激素类似物

答案: C

78. 属于硝基呋喃类的是

A: 磺胺甲

B: 呋喃妥因

C: 甲硝唑

D: 夫西地酸

答案: B

79. 对丙咪嗪过敏的患者禁用

A: 卡马西平

B: 氨己烯酸

C: 苯妥英钠

D: 丙戊酸钠

答案：A

80. 氟西汀用于治疗神经性贪食症，成人每日用量为

A: 60mg

B: 100mg

C: 20mg

D: 50mg

答案：A

81. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

A: 再生障碍性贫血

B: 缺铁性贫血

C: 神经炎

D: 慢性失血性贫血

答案：C

82. 治疗高脂血症达到中等强度（每日剂量可降低 LDL30%~50%），所需药物剂量最小的是

A: 氟伐他汀

B: 洛伐他汀

C: 辛伐他汀

D: 匹伐他汀

答案：D

83. 为最受推荐的常规避孕药，择期手术和长期卧床者，需在手术前一个月停止使用的是

- A: 雌激素
- B: 短效口服避孕药
- C: 长效避孕药
- D: 孕激素

答案：B

84. 急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

- A: 普萘洛尔
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：D

85. 属于时间依赖性且短 PAE 的大环内酯类药是

- A: 氨曲南
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 阿奇霉素

答案：C

86. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 氨氯地平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/456121231105011030>