

N2 级护理人员理论考核题库及参考答案

一、单选题（共 104 题，每题 1 分，共 104 分）

1. 在高压氧舱内输液有发生气栓症的危险, 主要发生在()

- A、加压过程中
- B、减压过程中
- C、高压氧治疗整个过程中均可发生
- D、0.3MPa 以上的高压氧治疗中
- E、0.2MPa 以下的高压氧治疗中

正确答案：B

2. 尿路刺激征是指()

- A、多尿、尿急、腰痛
- B、尿急、尿痛、腰痛
- C、多尿、尿急、尿痛
- D、多尿、尿频、尿急
- E、尿频、尿急、尿痛

正确答案：E

3. 发生过敏性休克时, 应立即注射 () %肾上腺素()ml

- A、0.1, 0.1
- B、0.01, 1
- C、0.1, 1
- D、0.5, 0.1

正确答案：C

4. 下列哪种情况不需预防应用抗生素

- A、胃癌根治术
- B、结肠手术
- C、慢性阑尾炎阑尾切除术
- D、髂内动脉瘤手术
- E、胰十二指肠切除术

正确答案：C

5. 急性肺水肿病人湿化瓶加入乙醇溶液的浓度：()

- A、40%-50%
- B、20%-30%
- C、50%-60%
- D、30%-50%

正确答案：D

6. 下列关于肺动脉血栓栓塞症血流动力学改变的描述, 正确的是()

- A、左心房压升高引起左向右分流
- B、冠状动脉灌注压降低致右室心肌缺血
- C、血栓阻塞肺动脉致左心功能不全
- D、主动脉内阻力和压力明显升高
- E、血栓阻塞肺动脉致肺动脉内压力降低

正确答案：B

7. 少量咯血是指病人一天咯血量小于()

- A、50ml
- B、150ml
- C、200ml
- D、10ml
- E、100ml

正确答案：E

8. 李某, 男, 53 岁。出院前 6 分钟步行试验, 行走距离为 320 米。该病人的心力衰竭程度为()

- A、重度心力衰竭
- B、极重度心力衰竭。
- C、中度心力衰竭
- D、极轻度心力衰竭
- E、轻度心力衰竭

正确答案：C

9. 不宜用于治疗胃溃疡的药物是()

- A、三钾铋络合铋
- B、阿托品
- C、甲氯咪胍
- D、前列腺合成剂
- E、丙谷胺

正确答案：B

10. 下面关于应用枸橼酸铋钾()错误的叙述是()

- A、可出现便秘和粪便呈黑色
- B、极少数病人可出现急性肾损伤
- C、病人可有恶心、一时性血清转氨酶升高

D、最好在餐后半小时服用

E、可用吸管直接吸入

正确答案：D

11. 按病因学对肺炎进行临床分类, 最常见的肺炎类型是()

A、真菌性肺炎

B、细菌性肺炎

C、免疫因素所致肺炎

D、病毒性肺炎

E、理化因素所致肺炎

正确答案：B

12. 溃疡病病人腹痛剧烈, 疑有穿孔合并症, 禁止使用()

A、西咪替丁

B、吗啡

C、胃肠减压

D、灭吐灵

E、阿托品

正确答案：B

13. 患者出现过敏性休克时应遵医嘱注射地塞米松针()

A、5-10mg

B、10-15mg

C、0.5-10mg

D、10mg

正确答案：A

14. 夏某, 男, 25 岁。上呼吸道感染后发生急进性肾小球肾炎入院, 该病人在实验室指标方面应重点监测()

A、外周血白细胞计数

B、ASO 滴度

C、血肌酐

D、尿蛋白

E、尿菌计数

正确答案：C

15. 预防针头堵塞的具体操作, 以下错误的是: ()

A、对于需要混合的注射药物, 充分混合药液

B、注射时速度缓慢停顿, 避免刺激

- C、注射前检查针头是否通畅
- D、根据药液的性质选用粗细合适的针头

正确答案：B

16. 适宜包扎疗法的烧伤创面是

- A、四肢高压电接触伤
- B、会阴部烧伤
- C、四肢浅Ⅱ度及深Ⅱ度烧伤
- D、Ⅲ度烧伤
- E、面部浅度烧伤

正确答案：C

17. PICC 穿刺置管时送导管困难临床表现()

- A、导管断裂
- B、导管皱起或蛇样弯曲
- C、穿刺处皮肤鼓包
- D、血液外渗

正确答案：B

18. 曹某, 男, 57 岁。慢性肾衰竭病史 5 年, 腹膜透析置管术后 3 天。护士在指导病人腹膜透析过程中如出现透析液引流不畅, 不宜采用的方法是()

- A、服用导泻药
- B、经腹透管内注入抗生素
- C、嘱病人做下楼梯运动
- D、改变体位
- E、排空膀胱

正确答案：B

19. 气管插管前, 对气囊进行漏气检测, 具体方法: 用无菌注射器将气囊充气()放入无菌生理盐水中观察有无漏气现象发生

- A、12-15ml
- B、11-15ml
- C、10-15ml
- D、10-20ml

正确答案：C

20. 血液透析的适应证不包括()

- A、严重高钾血症
- B、急性肾损伤

- C、急性肺水肿
- D、中毒性休克
- E、尿毒症

正确答案：D

21. 下列关于肺癌的叙述, 正确的是()

- A、出现杵状指提示肺癌已进入晚期
- B、小细胞癌对放疗敏感性高
- C、以腺癌最常见
- D、鳞癌与吸烟无关
- E、呈恶病质者首选放疗

正确答案：B

22. 功能性便秘应避免

- A、食物过于精细
- B、高纤维膳食
- C、有充分体力活动
- D、增加饮水量
- E、依赖泻药

正确答案：E

23. 患者出现低血糖反应时严重者遵医嘱给予静脉注射 20%葡萄糖()ml

- A、20-50
- B、40-60
- C、20-30
- D、30-40

正确答案：B

24. 溃疡病人膳食不宜

- A、使用刺激胃酸分泌的调味品
- B、食物切碎、煮软
- C、细嚼慢咽
- D、少量多餐
- E、供给充足热能和蛋白质

正确答案：A

25. 烧伤休克的主要原因是

- A、大量体液从血管内渗出
- B、大量水分蒸发

- C、疼痛
- D、创面感染
- E、大量红细胞丧失

正确答案：A

26. 吸痰管插入的长度为患者有咳嗽或恶心反应即可，有气管插管者，则超过气管插管()cm，避免插入过深损伤黏膜

- A、1-3
- B、1-2
- C、3-4
- D、2-3

正确答案：B

27. 夏某. 男. 61 岁, 诊断为肺癌。病人自觉左侧胸部持续性轻度疼痛。根据该病人目前情况, 适合的镇痛药是()

- A、盐酸哌替啶
- B、强阿片类镇痛药
- C、吗啡
- D、弱阿片类镇痛药
- E、非阿片类镇痛药

正确答案：E

28. 血浆过敏反应发冷、全身发麻，一般在置换后出现()

- A、500ml
- B、800ml
- C、300ml
- D、1000ml

正确答案：D

29. 破伤风最早发生强直性痉挛的肌群是

- A、咀嚼肌
- B、面肌
- C、颈背肌
- D、腹肌
- E、咽肌

正确答案：A

30. 医务人员配制全营养混合液时，注意处方中各成分的配比。由脂肪和糖提供的“双能源”，其热量一般为()，血脂偏高者可适当降低脂肪占

有比例。

A、1:3

B、2:1

C、1:1

D、1:2

正确答案：C

31. 任某, 男, 35 岁。连续加班数天后突然出现咽痛、声音嘶哑伴鼻塞和流涕, 之后频繁咳嗽, 咳少量黏液痰, 并逐渐转为黏液脓性, 痰量逐渐增多, 体温波动在 38.6℃左右, 自觉乏力、胸闷和气促。身体评估: 双肺呼吸音粗, 可闻及散在干、湿啰音及哮鸣音。X 线胸片检查未见明显异常, 初步判断为急性气管-支气管炎。引起该病人胸闷和气促的主要原因是()

A、炎症导致大气道狭窄

B、炎症累及下呼吸道

C、炎症累及气管

D、支气管痉挛

E、炎症导致肺组织弹性减弱

正确答案：D

32. 膀胱肿瘤术后化疗灌注常用药物为()

A、塞替派

B、庆大霉素

C、等渗盐水

D、0.02%呋喃西林。

E、3%硼酸溶液

正确答案：A

33. 姚某, 女, 54 岁。慢性肾衰竭(尿毒症期)入院接受治疗。予 5%碳酸氢钠 200ml 静脉滴注纠正酸中毒后发生抽搐, 最合理而有效的处理措施是()

A、肌肉注射地西洋

B、肌肉注射维生素 D3

C、静脉注射葡萄糖酸钙

D、静脉注射呋塞米

E、肌肉注射山莨菪碱

正确答案：C

34. “T”型引流管又称“T”管, 是指胆总管探查或切开取石后在切开()处留置的“T”形引流管

- A、胆囊膜
- B、胆总管
- C、胆囊壁
- D、胆囊

正确答案：B

35. 糖尿病最常见的神经病变是()

- A、周围神经病变
- B、脊髓病变
- C、脑神经病变
- D、自主神经病变
- E、神经根病变

正确答案：A

36. 脊柱骨折最严重的并发症为

- A、脊髓损伤
- B、骨筋膜室综合征
- C、周围神经损伤
- D、压疮
- E、脂肪栓塞

正确答案：A

37. 药物外渗超过()小时未恢复，局部皮肤由苍白转为暗红，禁止热敷

- A、48
- B、10
- C、24
- D、12

正确答案：C

38. 鼻饲液温度以()最为适宜。

- A、39° -41°
- B、37° -42°
- C、35° -37°
- D、37° -39°

正确答案：B

39. 对急性胃肠炎患者需留置胃管时要谨慎，胃管的前端不要太靠近胃黏膜，以免()而引起感染。

- A、影响消化

- B、穿孔
- C、刺激食道
- D、损伤充血水肿的胃黏膜

正确答案：D

40. 彭某, 女, 38 岁。维持性血液透析治疗 2 年。血液透析过程中出现出冷汗、头晕、心悸, 病人最可能发生了()

- A、低血钙
- B、低血压
- C、感染
- D、心力衰竭
- E、透析器反应

正确答案：B

41. 卢某, 女, 59 岁, 胃溃疡癌变后采用化学治疗。最近因受凉后出现全身乏力, 呼吸困难。身体评估: 体温 39.2°C 脉搏 102 次/分, 呼吸 26 次/分, 血压 116/76mmHg。血常规: 白细胞计数 $13.6 \times 10^9/\text{L}$ 。该病人的护理诊断应为()

- A、肺部感染
- B、体温过高
- C、血白细胞计数升高
- D、胃癌
- E、化学治疗反应

正确答案：B

42. 李某, 男, 36 岁。近 5 个月来于剧烈活动时发生黑矇及短暂意识丧失。身体评估: 胸骨左缘 3、4 肋间可闻及 3/6 级收缩期喷射样杂音。超声心动图示: 舒张期室间隔厚度与左心室后壁之比为 1.6。病人最可能的疾病为()

- A、心肌梗死
- B、先天性心脏病
- C、肥厚型心肌病
- D、主动脉瓣狭窄
- E、原发性高血压

正确答案：C

43. 形某, 男, 48 岁。因“肝炎后肝硬化”3 年, 发热、股痛, 腹胀 3 天, 诊断为“肝炎后肝硬化失代偿期”收入院。身体评估: 体温 38.5°C 。触诊发

现腹壁紧张度增高,伴有轻度压痛、反跳痛,移动性浊音(+)病人般可能出现的并发症是()

- A、肝肾综合征
- B、自发性细菌性腹膜炎
- C、上消化道出血
- D、肠穿孔
- E、腹壁静脉栓塞

正确答案: B

44. 急性肺水肿临床表现患者突发()端坐呼吸。

- A、严重的心律失常
- B、呼吸衰竭
- C、心力衰竭
- D、严重的呼吸困难

正确答案: D

45. 赵某,男,68岁,因“反复腹泻2个月”收入院,针对该病人的护理措施不恰当的是()

- A、常规给予禁食禁饮
- B、可给予腹部热敷
- C、严重时卧床休息
- D、应给予少渣饮食
- E、注意肛周皮肤的护理

正确答案: A

46. 宋某,男,56岁。诊断为慢性肺源性心脏病,血气分析结果示:PaO₂ 53mmHg, PaCO₂ 61mmHg。该病人适宜的氧疗方法是()

- A、持续低流量给氧
- B、间断低流量给氧
- C、间断高浓度给氧
- D、持续中浓度给氧
- E、持续高浓度给氧

正确答案: A

47. 一咯血病人,胸片示右上肺阴影,首先应考虑的诊断是

- A、肺癌
- B、肺结核
- C、肺不张

- D、肺炎
- E、肺脓肿

正确答案：B

48. 采集血气分析标本的方法, 下列哪项不正确()

- A、在严格无菌操作下抽动脉血 2mL 左右
- B、拔出针头后立即送检
- C、抽血后立即用软木塞封闭针头
- D、先抽少许经过稀释的肝素充盈针筒
- E、选用 2mL 干燥注射器

正确答案：B

49. 心搏骤停复苏抢救的有效指征不包括

- A、触到大动脉搏动
- B、上肢收缩压在 8kPa 以上
- C、自主呼吸恢复
- D、瞳孔散大
- E、颜面、口唇转红润

正确答案：D

50. 洗胃时发现误吸、胃内反流时, 立即停止洗胃, 取(), 立即通知医生紧急处理, 用纤维支气管镜或气管插管将异物引出

- A、平卧位
- B、左侧卧位
- C、半卧位
- D、头低右侧卧位

正确答案：D

51. 氧中毒的特点是()改变, 如肺泡壁增厚、出血

- A、肝脏
- B、心脏
- C、肺实质
- D、大脑

正确答案：C

52. 李某, 男, 64 岁。8 年前胃肠钡剂造影检查发现胃小弯溃疡, 上腹部节律性疼痛时好时坏。近来中上腹有饱胀感, 粪便隐血试验多次阳性, 有贫血体征。护士在家庭随访时首先应指导病人()

- A、立即就医

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/456132041024011003>