

2023-24 年广西壮族自治区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题真题题库及参考答案（突破训练）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列药物中,属于抗乙型肝炎病毒的药物是()

- A: 奥司他韦
- B: 齐多夫定
- C: 喷昔洛韦
- D: 阿德福韦酯

答案: D

2. 对焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者可选用的苯二氮?类镇静催眠药是

- A: 非苯二氮?类药物
- B: 苯二氮?类药物
- C: 地西洋
- D: 氟西洋

答案: D

3. 长期大量服用维生素 E 会出现

- A: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- C: 严重神经感觉异常,进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：D

4. 代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性

A: 卡莫司汀

B: 巯嘌呤

C: 氟尿嘧啶

D: 环磷酰胺

答案：D

5. 减少胃肠道对氢氯噻嗪的吸收，应在口服该药 1 小时前或 4 小时后服用氢氯噻嗪，该药是

A: 拟交感药

B: 多巴胺

C: 考来烯胺

D: 胺碘酮

答案：C

6. 与林可霉素类抗菌药物存在交叉耐药性的是

A: 大环内酯类

B: 四环素类

C: 头孢菌素类

D: 氨基糖苷类

答案：A

7. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

A: 己烯雌酚

B: 氟他胺

C: 托瑞米芬

D: 他莫昔芬

答案: B

8. 硫脲类药物用于甲状腺功能亢进内科治疗的正确给药方式是

A: 开始给治疗量，基础代谢正常后继续给 3~6 个月停药

B: 开始给大剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

C: 开始给小剂量，以后逐渐加大剂量，直至基础代谢率正常，改用维持量

D: 开始给小剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

答案: B

9. 弥散性血管内凝血症的晚期可选用

A: 氨甲环酸

B: 低分子肝素

C: 维生素 K

D: 尿激酶

答案: A

10. 铜绿假单胞菌性结膜炎常用

A: 多黏菌素 B 滴眼液

B: 1% 泼尼松滴眼液

C: 夫西地酸滴眼剂

D: 金霉素眼膏

答案: A

11. 对 α 受体和 β 受体均有强大的激动作用的是

A: 多巴胺

B: 肾上腺素

C: 可乐定

D: 去甲肾上腺素

答案: B

12. 下述利尿药中，不宜与氨基糖苷类抗生素合用的是

A: 氢氯噻嗪

B: 呋塞米

C: 螺内酯

D: 氨苯蝶啶

答案: B

13. (2017 年真题) 治疗青光眼宜选用 ()

A: 托吡卡胺滴眼剂

B: 氯霉素滴眼剂

C: 碘苷滴眼剂

D: 拉坦前列素滴眼剂

答案: D

14. 可能导致跟腱断裂和血糖异常的抗菌药物是

A: 多西环素

B: 甲砒霉素

C: 庆大霉素

D: 加替沙星

答案: D

15. 对凝血各环节均有作用，体内外均有抗凝作用，可防止急性血栓形成而成为对抗血栓的首选的抗凝血药是 ()。

A: 磺达肝葵钠

- B: 水蛭素
- C: 依诺肝素
- D: 阿哌沙班

答案：C

16. 由于严重的肾毒性，仅限于局部应用的是()

- A: 万古霉素
- B: 去甲万古霉素
- C: 杆菌肽
- D: 替考拉宁

答案：C

17. 临床用于军团菌病、支原体肺炎、空肠弯曲菌肠炎等首选的治疗药物是

- A: 红霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 头孢米诺
- D: 四环素

答案：A

18. 仅适用于少数敏感菌，衣原体属，立克次体等不典型病原体所致感染的药物是

- A: 甲硝唑
- B: 链霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 四环素

答案：D

19. 羟基脲属于()

- A: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- B: DNA 多聚酶抑制剂
- C: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案: D

20. 下述属于外周性多巴胺 D2 受体阻断剂的是

- A: 多潘立酮
- B: 莫沙必利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 西沙必利

答案: A

21. (2021 年真题) 患者，男，65 岁。患有 2 型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片(100mg/d) 预防心脑血管疾病。近期拟行髋关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是()。

- A: 无需停用阿司匹林，在手术日加用维生素 K1 预防出血
- B: 无需停用阿司匹林，也无需加用其他药物预防出血
- C: 停用阿司匹林 7-10 天后，再行手术
- D: 停用阿司匹林 3 天后，再行手术

答案: C

22. (2017 年真题) 可能导致牙龈增生的药物是()

- A: 普伐他汀
- B: 拉西地平
- C: 依诺肝素
- D: 普萘洛尔

答案：B

23. 脂溶性强，能透过血—脑屏障，可通过阻断 M1 受体产生镇静、失眠、意识混乱和认知障碍等不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

- A: 托特罗定
- B: 索利那新
- C: 奥昔布宁
- D: 黄酮哌酯

答案：C

24. 常作为根除幽门螺杆菌治疗的抗菌药物之一的是

- A: 红霉素
- B: 克林霉素
- C: 万古霉素
- D: 克拉霉素

答案：D

25. 治疗勃起功能障碍药的是

- A: 他达拉非
- B: 氯地孕酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 达那唑

答案：A

26. 艾司奥美拉唑的活性形式是

- A: 美沙拉嗪
- B: 奥沙拉嗪

C: 巴柳氮

D: 亚磺酰胺

答案: D

27. 下列可用于治疗哮喘的是

A: 氯苯那敏

B: 氯雷他定

C: 氮革斯汀

D: 孟鲁司特

答案: D

28. 患者，女，12 岁，身高 140cm，体重 32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

A: 替考拉宁

B: 左氧氟沙星

C: 克林霉素

D: 万古霉素

答案: D

29. 呋喃妥因主要用于

A: 呼吸道感染

B: 消化道感染

C: 尿路感染

D: 全身感染

答案: C

30. (2015 年真题) 属于血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是 ()。

- A: 阿司匹林
- B: 氯吡格雷
- C: 奥扎格雷
- D: 替罗非班

答案：D

31. 与细菌核糖体 50S 亚单位结合，抑制 mRNA 与核糖体连接，阻止 70S 起始复合物的形成，从而抑制细菌蛋白质的合成的是

- A: 利奈唑胺
- B: 美罗培南
- C: 磷霉素
- D: 万古霉素

答案：A

32. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)高检出率的医疗机构,进行人工瓣膜置换术时,为预防 MRSA 感染,可选用()

- A: 氨曲南
- B: 头孢唑林
- C: 万古霉素
- D: 青霉素 G

答案：C

33. 有明显耳毒性的药物是()

- A: 链霉素
- B: 青霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 四环素

答案：A

34. 噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

- A: 血钾
- B: 血氯
- C: 血氨
- D: 血钠

答案：C

35. 可用于金黄色葡萄球菌等革兰阳性菌所致严重感染的是

- A: 磷霉素氨丁三醇
- B: 磷霉素钠+万古霉素
- C: 利奈唑胺+哌替啶
- D: 利奈唑胺+苯丙醇胺

答案：B

36. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用()

- A: 2%酚甘油滴耳液
- B: 2%过氧化氢溶液
- C: 3%酚甘油滴耳液
- D: 3%过氧化氢溶液

答案：D

37. 扁平疣可选用

- A: 阿达帕林
- B: 酮康唑
- C: 林旦霜
- D: 维 A 酸

答案：D

38. (2019 年真题) 患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是 ()

- A: 颠茄
- B: 奥美拉唑
- C: 多潘立酮
- D: 甲氧氯普胺

答案: B

39. 酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是 ()

- A: 血压升高
- B: 心肌损伤
- C: 骨髓抑制
- D: 痤疮样皮疹

答案: D

40. 适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰的患者，但不宜长期使用，用药 7 日症状未缓解应停药的恶性祛痰药物是

- A: 氯化铵
- B: 氨溴索
- C: 溴己新
- D: 乙酰半胱氨酸

答案: A

41. 氯霉素的下述不良反应中，哪项是与剂量和疗程无关的严重反应

- A: 二重感染
- B: 不可逆的再生障碍性贫血

C: 可逆的各类血细胞减少

D: 灰婴综合征

答案: B

42. 患者,男,52岁,BMI28kg/m²,既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病,患者诉昨晚8点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

A: 碳酸氢钠

B: 别嘌醇

C: 非布司他

D: 秋水仙碱

答案: D

43. 长期大量应用双嘧达莫治疗缺血性心脏病时,可能导致患者缺血加重,甚至病情恶化可能的原因是 ()

A: 抗血小板药物继发失效

B: 双嘧达莫抵抗

C: 冠状动脉窃血

D: 治疗反应变异

答案: C

44. 通过抑制 A 型单胺氧化酶,减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解,增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能,发挥抗抑郁作用的药物是

A: 度洛西汀

B: 阿米替林

C: 舍曲林

D: 吗氯贝胺

答案：D

45. 导致胃肠道溃疡及出血风险较其他传统非甾体抗炎药低的是

- A: 吲哚美辛
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 布洛芬
- D: 塞来昔布

答案：D

46. 属于选择性 5-HT

- A: 莫沙必利
- B: 多潘立酮
- C: 昂丹司琼
- D: 甲氧氯普胺

答案：A

47. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效

- A: 结核杆菌
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 革兰阴性菌
- D: 厌氧菌

答案：D

48. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是

- A: 地尔硫革
- B: 胺碘酮
- C: 美托洛尔
- D: 维拉帕米

答案：B

49. 具有负性肌力、负性频率、负性传导作用的药物是

A: 维拉帕米

B: 哌唑嗪

C: 卡托普利

D: 硝酸甘油

答案：A

50. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

A: 3%过氧化氢溶液

B: 3%酚甘油滴耳液

C: 2%过氧化氢溶液

D: 2%酚甘油滴耳液

答案：A

51. 洋地黄毒苷的半衰期是()

A: 7 天以上

B: 48 小时

C: 72 小时

D: 5 天

答案：A

52. 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

A: 噻吗洛尔

B: 毛果芸香碱

C: 拉坦前列素

D: 地匹福林

答案：D

53. 患者，女，55 岁。经皮冠状动脉介入治疗（PCI）术后一直服用他汀类药物，但是低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）未达标，医师增加了他汀类药物的剂量后，患者的 ALT 升至 120U/L，故医师拟恢复原他汀药物的剂量，并联用其他调血脂药，该患者宜联用的药物是

- A: 非诺贝特
- B: 氟伐他汀同德
- C: 依折麦布
- D: 辛伐他汀

答案：C

54. 下述哪种疾病不适合外用糖皮质激素治疗

- A: 固定性药疹
- B: 异位性皮炎
- C: 钱币状湿疹
- D: 未根治的体股癣

答案：D

55. 硫酸亚铁的适应症是

- A: 巨幼细胞贫血
- B: 缺铁性贫血
- C: 恶性贫血
- D: 产后大出血

答案：B

56. 可拮抗维生素 B

- A: 雌激素

B: 丙磺舒

C: 糖皮质激素

D: 异烟肼

答案: D

57. 可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻, 具有固定和清除多种病原体和毒素药物是()

A: 地芬诺酯

B: 蒙脱石

C: 洛哌丁胺

D: 番泻叶

答案: B

58. 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是

A: 纳洛酮

B: 阿托品

C: 氟马西尼

D: 苯甲酸钠咖啡因

答案: B

59. 容易引起周围神经炎的抗结核药物是

A: 利福平

B: 异烟肼

C: 乙胺丁醇

D: 链霉素

答案: B

60. 血浆蛋白结合率低，易透过血脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是()

- A: 甲氧苄啶
- B: 磺胺多辛
- C: 磺胺嘧啶
- D: 复方新诺明

答案：C

61. 解热镇痛药的作用机制是

- A: 抑制尿酸生成
- B: 激动中枢阿片受体
- C: 抑制前列腺素合成
- D: 激动 M 受体

答案：C

62. 联用治疗布氏杆菌感染的是

- A: 青霉素和磺胺嘧啶
- B: 链霉素和磺胺嘧啶
- C: 青霉素和链霉素
- D: 链霉素和异烟肼

答案：B

63. 可见头晕、耳鸣、视力减退、出汗等不良反应的是

- A: 氨基己酸
- B: 甲萘氢醌
- C: 卡巴克络
- D: 蛇毒血凝酶

答案：C

64. 可替代氯霉素用于治疗伤寒的药物是()

- A: 氟喹诺酮类
- B: 青霉素类
- C: 四环素类
- D: 氨基糖苷类

答案: A

65. 下列何药对心房颤动无治疗作用

- A: 奎尼丁
- B: 利多卡因
- C: 普萘洛尔
- D: 胺碘酮

答案: B

66. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 罗格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 瑞格列奈

答案: C

67. (2019 年真题) 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药是()

- A: 十一酸睾酮 (40mg)
- B: 复方醋酸环内孕酮 (35 μ g/2mg)
- C: 左炔诺孕酮 (1
- D: 炔雌醇去氧孕烯 (30 μ g/150 μ g)

答案：C

68. 可选择性抑制 MAO-B，用于帕金森病对症治疗的药物是

- A: 苯海索
- B: 左旋多巴
- C: 司来吉兰
- D: 恩他卡朋

答案：C

69. 分泌氮皮质激素的是

- A: 束状带和网装带
- B: 球状带
- C: 束状带
- D: 网状带

答案：D

70. 用于青霉素敏感金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染且青霉素过敏者的药物是

- A: 红霉素
- B: 克拉霉素
- C: 克林霉素
- D: 万古霉素

答案：A

71. 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为()

- A: 瑞夷综合征

- B: 青霉素脑病
- C: 金鸡纳反应
- D: 赫氏反应

答案：D

72. 关于米力农使用的叙述，错误的是

- A: 不宜用于严重瓣膜狭窄病变，肥厚型梗阻性心肌痛
- B: 用药期间应监测心率、血压，必要时调整剂量
- C: 长期使用可降低死亡率
- D: 对心房扑动、心房颤动患者，宜先用强心苷制剂控制心室率

答案：C

73. (2019 年真题) 可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物 ()

- A: 大环内酯类
- B: 氨基糖苷类
- C: 四环素类
- D: 氟喹诺酮类

答案：D

74. 下列关于胺碘酮的叙述，错误的是 ()

- A: 降低窦房结和普肯耶纤维的自律性
- B: 对室上性和室性心律失常均有效
- C: 阻滞心肌细胞钠、钙及钾通道
- D: 对 α 、 β 受体有激动作用

答案：D

75. 下述药物中，不属于促动力药的是

- A: 甲氧氯普胺

- B: 多潘立酮
- C: 莫沙必利
- D: 氢氧化铝

答案: D

76. (2021 年真题) 常与 ACEI 联用，在协同降压的同时，兼具防治高钾血症的中效利尿剂是 ()

- A: 甘油果糖
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案: C

77. 长春碱使细胞有丝分裂停止于

- A: M 期
- B: G0 期
- C: G1 期
- D: S 期

答案: A

78. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 妊娠及哺乳期妇女
- B: 腰椎间盘突出
- C: 严重心脏病
- D: 骨髓功能抑制

答案：B

79. (2015 年真题) 治疗细菌性结膜炎宜选用 ()。

- A: 左氧氟沙星滴眼液
- B: 碘苷滴眼液
- C: 复方托吡卡胺滴眼液
- D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：A

80. 对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是

- A: 头孢吡肟
- B: 拉氧头孢
- C: 头孢西丁
- D: 氨曲南

答案：D

81. 抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反是 ()。

- A: 急性肾衰竭
- B: 急性肝衰竭
- C: 肺部纹理加重
- D: 胰腺坏死

答案：A

82. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是 ()。

- A: 替米沙坦
- B: 依那普利
- C: 坦洛新(坦索罗辛)

D: 哌唑嗪

答案: A

83. 关于阿奇霉素使用的叙述，错误的是

A: 阿奇霉素一天一次口服即可

B: 若需服含铝或镁的抗酸药，阿奇霉素应在服用上述药物前 1 小时或后 2 小时给予

C: 治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素的疗程为 5 天

D: 治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素首次剂量为后续剂量的 3 倍

答案: D

84. 兰索拉唑属于

A: H^+ , K^+ -ATP 酶抑制剂

B: 胃泌素受体阻断药

C: M 受体阻断药

D: H_2 受体阻断药

答案: A

85. 术后复发的甲状腺功能亢进症选用

A: 格列齐特

B: 放射性碘

C: 大剂量碘剂

D: 丙硫氧嘧啶

答案: B

86. 有或曾有充血性心力衰竭病史的心室功能障碍患者禁用()

A: 氟康唑

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 氟胞嘧啶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/457100152056010024>