

2024 年广东省盐田区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题真题题库带答案（B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 叶酸可用于巨幼细胞贫血治疗时，为改善神经症状，应同时并服

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 B6
- C: 叶酸
- D: 烟酸

答案：A

2. 是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘 9%~12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

- A: 过氧乙酸
- B: 聚维酮碘
- C: 氯己定
- D: 依沙吖啶

答案：B

3. 作用强而持久，不仅对子宫底，而且对子宫颈部都有很强的收缩作用，剂量稍大即产生强直性收缩，不适用于催产或引产，主要用于产后子宫出血或子宫复原不佳的是

- A: 地诺前列酮

- B: 麦角新碱
- C: 缩宫素
- D: 普拉睾酮

答案：B

4. 可与小剂量糖皮质激素合用，能降低排异反应及感染的发生率，提高存活率的是()

- A: 环孢素
- B: 硫唑嘌呤
- C: 环磷酰胺
- D: 甲泼尼龙

答案：A

5. 糖皮质激素临床用于治疗()

- A: 肺结核
- B: 胃溃疡
- C: 血小板减少症
- D: 低血压

答案：C

6. 5 α -还原酶抑制剂的作用特点不包括

- A: 降低血清前列腺特异抗原 (PSA) 水平
- B: 无心血管不良反应
- C: 减小增大的前列腺体积
- D: 可以松弛前列腺平滑肌

答案：D

7. (2016 年真题) 具有成瘾性的中枢性镇咳药是

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 氯化铵
- D: 苯丙哌林

答案：B

8. (2019 年真题) 能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中，渗入结核菌体，在菌体内特定酶的作用下转化，且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是 ()

- A: 链霉素
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：B

9. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 枸橼酸他莫昔芬
- B: 巯嘌呤
- C: 紫杉醇
- D: 吉非替尼

答案：A

10. 袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是 ()

- A: 托拉塞米
- B: 呋塞米
- C: 布美他尼
- D: 依他尼酸

答案：C

11. 关于氨基糖苷类和第三代头孢菌素类联合应用，错误的是

A: 可在身体同一部位给药

B: 治疗急性感染通常疗程不宜超过 7~14 日

C: 两类药不能混入同一容器内

D: 联合应用治疗败血症、肺炎等革兰阴性杆菌引起的严重感染

答案：A

12. 应用高剂量的 β

A: 低钾血症

B: 低镁血症

C: 高钙血症

D: 低钙血症

答案：A

13. 可用于习惯性流产的药品是()

A: 他莫昔芬

B: 戊酸雌二醇

C: 地屈孕酮

D: 依普黄酮

答案：C

14. 有性激素样副作用的是()

A: 氨苯蝶啶

B: 呋塞米

C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

答案：C

15. 属于促凝血因子合成药的是

- A: 鱼精蛋白
- B: 甲萘氢醌
- C: 酚磺乙胺
- D: 氨甲环酸

答案：B

16. 氨基糖苷类抗菌药无效的是

- A: 结核杆菌
- B: 厌氧菌
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 需氧革兰阴性菌

答案：B

17. 临床常用的以原型药从尿液中排出的中效强心苷类药是

- A: 洋地黄毒苷
- B: 毛花苷丙（西地兰 C）
- C: 地高辛
- D: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

答案：C

18. 易通过血脑屏障的抗真菌药物是

- A: 克霉唑
- B: 咪康唑
- C: 氟康唑
- D: 酮康唑

答案：C

19. 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 喉头水肿、尿潴留
- B: 头痛、胸闷、气急、出汗
- C: 发热、血管扩张、面色潮红
- D: 血压升高或降低、心率加快调

答案：A

20. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

- A: 治疗剂量下不会引起血小板减少
- B: 可预测抗凝效果，无需监测国际标准化比值(INR)
- C: 选择性高
- D: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶

答案：D

21. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的药物是

- A: 氯喹
- B: 奎宁
- C: 青蒿素
- D: 伯氨喹

答案：C

22. (2020 年真题) 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

- A: 预防癌症复发
- B: 预防过敏反应

C: 预防粒细胞缺乏

D: 预防出血过多

答案: C

23. 渗透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

A: 阿达帕林

B: 壬二酸

C: 异维 A 酸

D: 维 A 酸

答案: B

24. 与唑来膦酸合用可使颌骨坏死的发生率升高的药物是

A: 抗血管生成药

B: 高钙食品

C: 萘普生

D: 沙利度胺

答案: A

25. (2018 年真题) 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性, 临床应用的解毒方案是 ()

A: 在用柔红霉素同时, 使用柔红霉素等量的右雷佐生

B: 在用柔红霉素后 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生

C: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼

D: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

答案: D

26. 患者, 男, 35 岁, 农民。感觉头昏乏力入院。查体: 粪中钩虫卵(+++), 血红蛋白 60g/L, 诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 驱钩虫+亚叶酸钙
- B: 输血+注射右旋糖酐铁
- C: 驱钩虫+口服铁剂
- D: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁

答案：C

27. 主要用于疟疾预防的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 氯喹
- C: 吡喹酮
- D: 甲硝唑

答案：A

28. (2020 年真题) 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 更昔洛韦
- C: 阿德福韦酯
- D: 拉米夫定

答案：A

29. 用于治疗骨质疏松的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 胰岛素
- C: 甲状腺素
- D: 依替膦酸二钠

答案：D

30. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素

- A: 心肝肾功能严重障碍者
- B: 骨髓功能抑制者
- C: 慢性胃炎
- D: 妊娠期妇女

答案：C

31. 属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

- A: 克罗米通
- B: 酮替芬
- C: 过氧化氢
- D: 麻黄碱

答案：D

32. 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

- A: 拉米夫定
- B: 更昔洛韦
- C: 利巴韦林
- D: 阿德福韦酯

答案：C

33. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向选用

- A: 氨甲环酸
- B: 尿激酶
- C: 低分子肝素
- D: 维生素 K

答案：D

34. 药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

- A: 沙丁胺醇
- B: 喷托维林
- C: 氨溴索
- D: 噻托溴铵

答案：D

35. 控制癫痫持续状态，可静脉注射

- A: 氯丙嗪
- B: 地西泮
- C: 阿司匹林
- D: 硫喷妥钠

答案：B

36. 禁用于妊娠期高血压疾病者的是

- A: 氯化钾
- B: 硫酸镁
- C: 氯化钙
- D: 氯化钠

答案：D

37. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为

- A: 阿托品
- B: 酚妥拉明

C: 糖皮质激素

D: 右旋糖酐

答案: C

38. 患者，女，49 岁。身高 164cm，体重 55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

A: 克林霉素

B: 头孢西丁

C: 左氧氟沙星

D: 阿奇霉素

答案: B

39. 高血压伴有肾功能不全者最好选用

A: 利血平

B: 胍乙啶

C: 氢氯噻嗪

D: 卡托普利

答案: D

40. 属于治疗中枢性尿崩症用药的是

A: 甲巯咪唑

B: 醋酸去氨加压素

C: 生长抑素

D: 左甲状腺素

答案: B

41. 静脉溶栓首选的药物是

A: 达比加群酯

B: 阿替普酶

C: 重组人促红素

D: 维生素 K

答案: B

42. 抗菌药物联合用药的目的不包括

A: 扩大抗菌范围

B: 提高疗效

C: 减少耐药性的发生

D: 延长作用时间

答案: D

43. 下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

A: 阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药

B: 奈替芬是丙烯胺类抗真菌药

C: 环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药

D: 酮康唑为咪唑类抗真菌药

答案: A

44. 选择性沉积在牙齿和骨骼中,不可用于 8 岁以下患儿的药物是

A: 大环内酯类

B: 氟喹诺酮类

C: 氨基糖苷类

D: 四环素类

答案: D

45. 可作为氨基糖苷类的替代品,与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

- A: 氨曲南
- B: 亚胺培南
- C: 阿莫西林
- D: 克拉维酸

答案：A

46. 下列药物中，与维生素 D 合用能出现高钙血症的药物是

- A: 硫糖铝
- B: 矿物油
- C: 考来烯胺
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

47. 下列不属于局麻药物作用特点的是

- A: 可暂时、完全阻断神经传导
- B: 可逆性阻断神经冲动产生和传导
- C: 作用消失后神经功能不可完全恢复
- D: 对各类组织无损伤性影响

答案：C

48. 治疗心绞痛急性发作的首选药物是()

- A: 硝酸甘油
- B: 普萘洛尔
- C: 地尔硫
- D: 维拉帕米

答案：A

49. 庚酸炔诺酮()

- A: 抑制排卵作用
- B: 抗着床
- C: 减少精子数目
- D: 促进蛋白质合成

答案：A

50. 强心苷最常见的早期心脏毒性反应是()

- A: 房性期前收缩
- B: 二联律
- C: 房颤
- D: 室性期前收缩

答案：D

51. (2020 年真题) 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 头痛、胸闷、气急、出汗
- B: 喉头水肿、尿潴留
- C: 发热、血管扩张、面色潮红
- D: 血压升高或降低、心率加快调

答案：B

52. 下列主要用于防治遗传性血管神经水肿的药物是

- A: 黄体酮
- B: 司坦唑醇
- C: 米非司酮
- D: 环孢素

答案：B

53. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

- A: 四环素
- B: 利福平
- C: 环孢素
- D: 苯巴比妥

答案：C

54. (2019 年真题) 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

- A: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭伴高钾血症（血 K⁺5
- B: 患者，男，47 岁，诊断为难治性高血压，使用依那普利、氢氯噻嗪、氨氯地平治疗仍未达标
- C: 患者，男，47 岁，诊断为高血压，生活方式干预无效，随机血压 155/95mmHg
- D: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭，LVEF=35%，血压 120/65mmHg

答案：D

55. 双膦酸盐类药物的作用机制不包括

- A: 抑制骨吸收性
- B: 与骨基质理化结合，干扰骨吸收
- C: 增加小肠和肾小管对钙的重吸收
- D: 直接改变破骨细胞的形态学

答案：C

56. 下列哪项不能提高镇静催眠药用药安全性

- A: 应尽量避免长期使用同一种镇静催眠药
- B: 与易成瘾的药物合用不会产生依赖性
- C: 服用后应避免高速高空作业

D: 镇静催眠药可交替使用

答案: B

57. 过量会引起严重心脏毒性的药物是()

A: 哌唑嗪

B: 卡托普利

C: 地高辛

D: 氨氯地平

答案: C

58. 阿司匹林抗血栓形成的机制是

A: 直接对抗血小板聚集

B: 激活抗凝血酶

C: 环氧酶失活，减少 TXA₂ 生成，产生抗血栓形成作用

D: 降低凝血酶活性

答案: C

59. 与磺胺甲噁唑具有协同抑菌和杀菌作用的是()

A: 呋喃唑酮

B: 磺胺嘧啶

C: 诺氟沙星

D: 甲氧苄啶

答案: D

60. 需慎用司坦唑醇的是()

A: 肝、肾病患者

B: 低血压患者

C: 高血压患者

D: 代谢性酸中毒患者

答案：A

61. 米非司酮避孕的主要机制是()

A: 抑制受精卵着床

B: 促进子宫内膜充血增厚

C: 抑制胚胎发育

D: 抑制乳腺泡发育

答案：A

62. (2016 年真题) 铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是

A: 罗红霉素

B: 头孢他啶

C: 利奈唑胺

D: 头孢曲松

答案：B

63. 口服可用于肠道感染的药物是

A: 妥布霉素

B: 奈替米星

C: 庆大霉素

D: 链霉素

答案：C

64. 已发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁加以预防的抗肿瘤药是

A: 紫杉醇注射液

B: 注射用柔红霉素

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 注射用硫酸长春新碱

D: 注射用盐酸博来霉素

答案：A

65. 与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是()。

A: 硝酸甘油

B: 丙酸睾酮

C: 甲睾酮

D: 非那雄胺

答案：A

66. α 肾上腺素受体分布占优势的效应器是

A: 冠状血管

B: 肾血管

C: 皮肤黏膜血管

D: 骨骼肌血管

答案：C

67. 作用与第二代头孢菌素相似，对大多数超广谱 β -内酰胺酶稳定的药物是

A: 阿奇霉素

B: 四环素

C: 头孢米诺

D: 红霉素

答案：C

68. 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 预防过敏反应
- B: 预防癌症复发
- C: 预防粒细胞缺乏
- D: 预防出血过多

答案：C

69. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

- A: 阿莫西林
- B: 四环素类
- C: 氧化镁
- D: 噻嗪类利尿剂

答案：D

70. 与唑来膦酸合用可增加多发性骨髓瘤患者发生肾功能不全风险的谷氨酸衍生物是

- A: 沙利度胺
- B: 萘普生
- C: 抗血管生成药
- D: 高钙食品

答案：A

71. (2016 年真题) 减少钠离子内流而使神经细胞稳定，属于乙内酰脲类的是抗癫痫药

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 苯妥英钠
- D: 苯巴比妥

答案：C

72. 洛伐他汀的作用是

- A: 影响脂蛋白合成、转运及分解的药物
- B: 主要影响胆固醇合成
- C: 主要影响甘油三酯合成
- D: 主要影响胆固醇吸收

答案：B

73. 小剂量碘主要用于

- A: 黏液性水肿
- B: 抑制甲状腺素的释放
- C: 单纯性甲状腺肿
- D: 呆小病

答案：C

74. 属于长效 β_2 受体激动剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 异丙托溴铵
- C: 噻托溴铵
- D: 特布他林

答案：A

75. 长期大量使用林旦后会导致的不良反应是

- A: 眼部水肿
- B: 中枢神经系统毒性
- C: 肝脏损害
- D: 白细胞减少

答案：B

76. 安全性高，几乎无不良反应的是

- A: 多沙唑嗪
- B: 十一酸睾酮
- C: 非那雄胺
- D: 舍尼通

答案：D

77. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

- A: 克拉霉素
- B: 克林霉素
- C: 万古霉素
- D: 红霉素

答案：A

78. 肝素可增强抗凝血酶III活性，灭活下列哪组凝血因子

- A: IIa、VIa、VIIa、VIIIa、IXa
- B: IIa、VIIa、VIIIa、IXa、Xa
- C: IIa、IXa、Xa、XIa、XIIa
- D: IIa、IIIa、IVa、Va、VIIa

答案：C

79. 患者，女 75 岁，既往有 2 型糖尿病史 18 年，有青霉素过敏史，因车祸导致左下肢开放性骨折，术后发生骨髓炎，给予克林霉素治疗 10 余天，临床应关注的典型不良反应是

- A: 肌肉震颤
- B: 抗生素相关性腹泻
- C: 急性溶血性贫血

D: 红人综合征

答案: B

80. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时, 接听病房咨询电话, 得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者, 出现高热、肺纹加重, 患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

A: 15mg/kg

B: 5mg/kg

C: 60mg/kg

D: 40mg/kg

答案: D

81. (2017 年真题) 用药时需关注肺毒性的药物是 ()

A: 博来霉素

B: 紫杉醇

C: 柔红霉素

D: 长春新碱

答案: A

82. 可分解出新生态氧, 杀菌除臭 ()

A: 阿达帕林

B: 异维 A 酸

C: 过氧苯甲酰

D: 维 A 酸

答案: C

83. 羟基脲属于 ()

A: DNA 多聚酶抑制剂

- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：D

84. 患者,男,60 岁诊断为房性心律失常,医生给予胺碘酮治疗。近日,因胃溃疡开始用西咪替丁,出现窦性心动过缓症状。合用西咪替丁,出现窦性心动过缓,原因()

- A: 西咪替丁诱导 CYP2C9,升高胺碘酮血浆药物浓度
- B: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2C19,减慢胺碘酮的代谢
- C: 西咪替丁抑制 CYP3A4,升高胺碘酮血浆药物浓度
- D: 西咪替丁抑制 CYP1A2,升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：C

85. 是第一个 P2Y₁₂ 拮抗剂,可抑制血小板聚集的是()

- A: 噻氯匹定
- B: 尿激酶
- C: 肝素
- D: 华法林

答案：A

86. 易引起刺激性干咳的抗高血压药是()

- A: 卡托普利
- B: 非洛地平
- C: 厄贝沙坦
- D: 阿托伐他汀

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/457136136052010024>