掌心博阅电子书重点名校考研专业课精品资料系列

【强化】2024年电子科技大学100300口腔医学《352口腔综合之口腔正畸学》考研强化模考5套卷

主编：掌心博阅电子书

青岛掌心博阅电子书 出品

特别说明

本书严格按照该科目今年考研专业课真题题型、试题数量和考试难度出题，结合本专业考研大纲整理编写，由考研学长严格审核校对。其内容涵盖了本科目考研常考试题及重点试题，针对性强，是报考本校该科目考研专业课复习的重要资料。

版权声明

青岛华研教育旗下掌心博阅电子书依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

【强化】2024 年电子科技大学 100300 口腔医学《352 口腔综合之口腔正畸学》考研强化模考 5 套卷(一)
.....4
【强化】2024 年电子科技大学 100300 口腔医学《352 口腔综合之口腔正畸学》考研强化模考 5 套卷(二)
.....8
【强化】2024 年电子科技大学 100300 口腔医学《352 口腔综合之口腔正畸学》考研强化模考 5 套卷(三)
.....12
【强化】2024 年电子科技大学 100300 口腔医学《352 口腔综合之口腔正畸学》考研强化模考 5 套卷(四)
.....16
【强化】2024 年电子科技大学 100300 口腔医学《352 口腔综合之口腔正畸学》考研强化模考 5 套卷(五)
.....21

【强化】2024 年电子科技大学 100300 口腔医学《352 口腔综合之口腔正畸学》考研强化模考 5 套卷（一）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、单项选择题

1．**矫治前必须有记录患者牙牙合情况的模型，称之为_____**

A.记存模型

B.石膏模型

C.上颌模型

D.初模型

E.终模型

【答案】A

2．**下列哪项是错牙合畸形的病因_____。**

A.牙列缺失

B.楔状缺损

C.四环素牙

D.氟斑牙

E.遗传因素

【答案】E

3．**口腔不良习惯不包括_____。**

A.吮指习惯

B.舌习惯

C..唇习惯

D.咬物习惯

E.异常吞咽习惯

【答案】E

4．**上下前牙切端的前后距离超过 3mm 以上者，称为深覆盖，分为三度，Ⅲ度深覆盖为_____**

A.3～5mm

B.5～8mm

C.8mm

D.1～mm

E.0～1mm

【答案】C

5．**下齿槽座点为_____**

A.S 点

B.关节点

C.B 点

D.Gn 点

E.D 点

【答案】C

6. **以理想正常为准，错畸形的发病率是：_____**

A.20%
B.40%
C.60%
D.80%
E.1.2%

【答案】E

二、名词解释

7. **邻面去釉**

【答案】作为非拔牙矫治方法之一，可单独使用，也可以与其他矫治措施联合。

8. **Moyers 预测法**

【答案】Moyers 提出的用下颌恒切牙的牙冠宽度总和来预测替牙列期未萌出的上下颌尖牙与前磨牙牙冠宽度的方法。

9. **阻断性矫治**

【答案】是对乳牙列期及替牙列期因遗传、先天或后天因素所导致的，正在发生或已初步表现出的牙、牙列、咬合关系及骨发育异常等，采用简单的矫治方法进行治疗，或采用矫形的方法引导其正常生长。

10. **SNA 角**

【答案】由蝶鞍中心、鼻根点及上齿槽座点所构成的角。反应上颌相对于颅部的前后位置关系。当此角过大时，上颌前突、面部侧貌可呈凸面型，反正上颌后缩面部呈凹面型。

11. **正常覆 he**

【答案】上前牙覆盖过下前牙唇面不超过切 1/3 且下前牙切缘咬在上前牙舌面切 1/3 以内者。

12. **假性近中错位/假性下颌前突**

【答案】在第一恒磨牙萌出之前，多数乳磨牙缺失，迫使患儿多用前牙咀嚼，下颌则可能逐渐向前移位，形成近中错牙合，久之可造成~。如乳磨牙全部缺失，则下颌必须前伸完全利用前牙咀嚼，这样，日久就形成真性下颌前突。

三、病例分析题

13. **患者，女，19 岁。主诉：上前牙外伤 3 小时**

现病史: 3 小时前奔跑时与他人相撞，当时感觉上前牙痛，触碰时加重，牙松动，有伸长感，牙龈出血，上唇肿胀。

检查: 上唇肿胀，并逐渐加重，右上中切牙处可见粘膜下淤血。11 龈沟出血，叩痛（++），松动 I 度，牙髓活力测试无反应，牙无明显的移位。X 线片示：11 牙周膜增宽，牙槽骨无异常。

病例分析：

（1）主诉疾病的诊断？

（2）诊断依据？

（3）鉴别诊断？

（4）治疗设计？

【答案】（1）主诉疾病的诊断

①11 脱位

②上唇粘膜挫伤

（2）诊断依据

①局部外伤史

②上唇肿胀，黏膜下淤血

③11 叩痛（++），松动 I 度；X 线片示：牙周膜增宽

（3）鉴别诊断

牙槽突骨折：如为骨折，检查患牙时，邻近数牙及骨折片随之移动。

（4）治疗设计：

①上唇冷敷。

②11 固定 3~4 周。

③确定牙髓坏死后行根管治疗。

14．**患者，男，26 岁,主诉：因交通事故造成面部外伤而来就诊。**

检查: 耳鼻出血，并证实有脑脊液鼻漏，面部两侧不对称，右侧眶下区肿胀、淤血，右侧下颌骨下垂，后牙早接触，X 线片显示：右侧上颌骨骨折，骨折线自鼻额缝向两侧横过鼻梁、眶内侧壁、眶底，经颧上颌缝达翼板。

病例分析：

主诉疾病的诊断？

诊断依据？

鉴别诊断？

治疗设计？

【答案】（1）主诉疾病的诊断：上颌骨右侧 LeFortII 型骨折。

（2）主诉疾病的诊断依据：

①骨折线自鼻额缝向两侧横过鼻梁、眶内侧壁、眶底，经颧上颌缝达翼板。

②右侧下颌骨下垂，后牙早接触。

③右侧眶下区肿胀，右下眼睑肿胀、淤血。

④伴有脑脊液鼻漏。

（3）主诉疾病的鉴别诊断：

①LeFortI 型骨折：由梨状孔下方、牙槽突上方（基部）向两侧水平后延至上颌翼突缝；摇动骨折块上的牙齿，整个骨块皆动；伤区疼痛、肿胀、鼻出血、牙龈粘膜撕裂。可无右下眼睑肿胀、淤血；患侧牙齿早接触，健侧开牙合，或后牙早接触，前牙开牙合等不同的错牙合；一般不伴有脑脊液鼻漏。

②LeFortIII 型骨折（高位骨折）：骨折线横过鼻根、眶部，经颧额缝向后达翼板；眶周皮下淤血，眼

球运动障碍、复视；面中部塌陷、变长；常合并颅脑损伤、脑脊液漏。

（4）治疗设计：

①应首先处理颅脑损伤。

②需切开复位，进行骨间内固定，同时辅以颅颌固定。

③有牙合关系问题者，增加颌间固定。

④选用抗生素抗感染治疗。

⑤骨折固定时间一般为 3 周左右。

四、简答题

15．**什么是预防性矫治？**

【答案】预防性矫治是在畸形发生前用简单的矫治方法预防畸形的发生，使之发展成正常或引导其向正常而面为正常。

16．**临床适宜矫治力的表征：**

【答案】（1）无明显的自觉疼痛，只有发胀感觉。

（2）叩诊无明显反应。

（3）松动度不大。

（4）移动的牙位或颌位效果明显。

（5）下线片显示，矫治牙的根部及牙周无异常。

17．**乳牙滞留导致何种错牙合畸形？**

【答案】乳牙滞留，能引起错位萌出、深覆盖、深覆、反、双重牙列。

18．**恒牙早失导致何种错牙合畸形？**

【答案】恒牙早失，能引起邻牙向缺隙倾斜、对牙伸长、前牙深覆、颜面两侧不对称。

【强化】2024年电子科技大学100300口腔医学《352口腔综合之口腔正畸学》考研强化模考5套卷（二）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、单项选择题

1．**上前牙冠覆盖下前牙冠超过1/3者称为深覆牙合，其分为三度，Ⅰ度深覆牙合为_____**

A.覆盖为3～5mm

B.上前牙冠覆盖下前牙超过冠1/3而不足1/2者

C.上前牙冠覆盖下前牙超过冠1/2而不足2/3者

D.上前牙冠覆盖下前牙超过冠2/3者

E.以上都不是

【答案】B

2．**安氏Ⅱ类亚类错是指：_____**

A.双侧磨牙为远中关系

B.一侧磨牙为远中关系，另一侧为中性关系

C.一侧磨牙为近中关系，另一侧为中性关系

E.以上都不对

【答案】B

3．**错畸形矫治的标准是：_____**

A.理想正常

B.理想

C.个别正常

D.平衡

E.正常

【答案】C

4．**Ⅲ度深覆，是指_____**

A.上前牙牙冠覆盖下前牙不足冠1/3者

B.上前牙牙冠覆盖下前牙超过冠1/3而不足1/2者

C.上前牙牙冠覆盖下前超过冠1/2而不足2/3者

D.上前牙牙冠覆盖下前牙超过冠2/3者

E.以上都不对

【答案】D

5．**安氏Ⅱ类亚类错是指：_____**

A.双侧磨牙为远中关系

B.一侧磨牙为远中关系，另一侧为中性关系

C.一侧磨牙为近中关系，另一侧为中性

D.双侧磨牙为近中关系

E.以上都不对

【答案】D

6. **佝偻病主要是因为缺乏：_____**

A.维生素 A.

B.维生素 B

C.维生素 C

D.维生素 D

E.维生素 E.

【答案】E

二、名词解释

7. **反覆盖**

【答案】下前牙切端位于上前牙切端之唇侧，常在严重的下颌前突、前牙反 he 时呈现。

8. **记存模型**

【答案】是矫正前、矫正过程中某些阶段及矫正完成后患者牙合状况的记录，应制作精确，长久保存。

9. **记存模型**

【答案】是矫正前、矫正过程中某些阶段及矫正完成后患者牙牙合状况的记录，应制作精准，长久保存。

10. **差动力支抗（Differentialanchorage)**

【答案】同样大小的力作用于两个或两组不同的牙齿,根据其产生的组织反应不同，使需要移动的牙得以移动，不需移动的牙很少移动甚至不动。其基础是牙周膜面积的差异。

11. **正畸扩展**

【答案】指当腭中缝骨改建效应缺乏时，通过扩弓器释放的力主要作用在两侧后牙，使之向颊侧倾斜移动而扩大牙弓。正畸扩展虽没有中缝效应，但后牙的颊向移动可能在某种程度上能刺激该区域牙槽骨的生长，其长期效果也是稳定的。

12. **下中切牙一眼耳平面角（FMIA)**

【答案】下中切牙长轴与眶耳平面的交角。

三、病例分析题

13. **患者，男性，28 岁。主诉：左下后牙拔除术 5 天，拔牙创疼痛 1 天**

现病史：5 天前，在门诊行“左下智齿拔除术”，术后前 3 天伤口轻度疼痛，一天前疼痛加重，呈持续性、并向头顶部放射。

检查：左下第三磨牙拔牙窝内空虚，有腐败坏死的残留凝块，用棉球蘸取内容物嗅之有恶臭，左下第二磨牙远中有龋坏，深达牙本质深层，探诊酸痛，冷、热诊敏感，叩诊（-）。

病例分析：

主诉疾病的诊断？

诊断依据？

鉴别诊断？

治疗设计？

【答案】（1）主诉疾病的诊断：左下第三磨牙干槽症。

（2）主诉疾病的诊断依据：有拔牙史，术后 3~4 天出现剧痛，拔牙窝空虚。

（3）主诉疾病的鉴别诊断：拔牙后疼痛。

（4）治疗设计：在局麻下，彻底清除拔牙窝内的腐败坏死物质，3%过氧化氢和生理盐水冲洗，填入碘仿纱条，数日后复诊更换碘仿纱条直至肉芽组织覆盖。

14．**患者，男，18 岁,主诉：上前牙外伤后牙齿变短半小时**

现病史：半小时前骑自行车不慎摔倒，嘴唇先着地，发现牙齿变短，但不松动。

既往史：否认有全身系统性疾病、传染性疾病及药物过敏史等。

检查：11、21 牙龈红肿，龈沟渗血，牙冠完整，内倾，但比邻牙短 2mm，叩痛（++），松动（+）。中切牙开合。上唇粘膜红肿，约有 1cm 长的裂口，渗血。X 线片示：11、21 根尖周膜间隙消失，未见根折线，38、48 地位垂直阻生，龈瓣红，水肿，覆盖咬合面远中，盲袋无分泌物。

病例分析：

（1）：诊断？

（2）：诊断依据？

（3）：主诉疾病的治疗原则？

（4）：全口其他疾病的治疗原则？

【答案】（1）主诉疾病的诊断

①11,21 嵌入性脱位；上唇挫裂伤。

②非主诉疾病的诊断：38，48 冠周炎。

（2）主诉疾病的诊断依据：

①患牙有外伤史，11,21 牙龈红肿，龈沟渗血，牙冠完整，内倾，但比邻牙短 2mm，叩痛（++），松动（+）。中切牙开牙合。

②上唇粘膜红肿，约有 1cm 长的裂口，渗血。

③X 线片示：11,21 根尖周膜间隙消失，未见根折线。

（3）非主诉疾病的诊断依据：38,48 低位垂直阻生，龈瓣红、水肿，覆盖咬合面远中，盲袋无分泌物。

（4）主诉疾病治疗原则：

①局麻下复位、固定。

②局麻下行上唇挫裂伤缝合。

③观察牙髓症状，酌情行根管治疗。

（5）全口其他疾病的治疗设计：38,48 龈瓣切除术。

四、简答题

15．**何谓口腔正畸学、错畸形？**

【答案】口腔正畸学是口腔医学的一个分科，它的学科内容是研究错畸形的病因机制、诊断分析及其

预防和治疗。

错畸形是指儿童在生长发育过程中，由先天的遗传因素，如疾病、口腔不良习惯、替牙异常等导致的牙齿、颌骨、颅面的畸形，如牙齿排列不齐、上下牙弓间的关系异常、颌骨大小形态位置异常等。

16．**什么是阻断性矫治和预防性矫治?**

【答案】阻断性矫治是对正在发生或刚发生的畸形用简单的矫治方法阻断畸形的发展，使之自行调整成为正常或采用矫治方法引导其正常生长而成为正常。

预防性矫治是在畸形发生前用简单的矫治方法预防畸形的发生，使之发展成正常或引导其向正常而面为正常。

17．**增加支抗的方法有:**

【答案】（1）增加支抗牙的数目；

（2）将支抗牙连成一整体；

（3）增大活动矫治器的基托面积，保持与组织面的密贴；

（4）在应用颌内或颌间支抗的同时，加用颌外支抗来增强支抗；

（5）上颌第一磨牙间加横腭杆；

（6）上颌第一磨牙间加 Nance 弓；

（7）下颌第一磨牙间加舌弓；

（8）种植体支抗

18．**牙齿的拥挤度及分类**

【答案】一、牙齿的拥挤度: 牙冠宽度的总和与牙弓现有弧形的长度之差即为拥挤度，一般分为三度。1 度拥挤，相差 2~4mm；11 度拥挤，相差 4~8mm；111 度拥挤，相差 8mm 以上。

【强化】2024年电子科技大学100300口腔医学《352口腔综合之口腔正畸学》考研强化模考5套卷（三）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、单项选择题

1．**在正畸治疗过程中，最常见的牙齿移动类型为_____**

A.整体移动

B.控根移动

C.伸长移动

D.旋转移动

E.倾斜移动

【答案】E

2．**牙冠与牙根作相反方向的移动，是那种移动_____**

A.整体移动

B.伸长移动

C.旋转移动

D.压低移动

E.倾斜移动

【答案】E

3．**aS点为_____**

A.硬腭后部骨棘之尖

B.上齿槽座点

C.上中切牙切缘之最前点

D.下颌角的后下点

E.蝶鞍影像的中心

【答案】E

4．**SNB角_____**

A.反映上颌相对于颅部的前后位置关系

B.反映下颌相对于颅部的位置关系

C.反映上下颌角对颅部的相互位置关系

D.越大表示下颌越前突

E.越大表示上颌的相对突度越大

【答案】B

5．**上颌第一磨牙在下颌第一磨牙之前萌出，容易形成：_____**

A.近中

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/457140022001006122