

## 康复医学疼痛科护士规范化培训自学理论测试五试题及答案

基本信息： [矩阵文本题] \*

姓名：	_____
科室：	_____

能反映急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的典型症状是() [单选题]\*

- A 脉搏浅快
- B 血压下降
- C 浮现神经精神症状
- D 进行性呼吸艰难(正确答案)

慢性肺心病右心衰竭，为降低肺动脉压，减轻右心负荷，下列治疗中应选用()

[单选题] \*

- A、地高辛
- B、速尿
- C、改善通气，吸氧(正确答案)
- D、异丙肾上腺素吸入

女性，突发胸部疼痛3小时，面色苍白，大汗，血压180/100mmHg，超声心动图提示主动脉根部扩张、升主动脉呈真假双腔征() [单选题]\*

- A、 主动脉夹层
- B、 急性心肌梗死
- C、 肺栓塞(正确答案)
- D、 肠系膜动脉栓塞

属于肺栓塞溶栓禁忌症的是() [单选题] \*

- A、 有活动性内出血
- B、 近期自发性颅内出血
- C、 2周内的大手术、分娩、器官活检
- D、 以上都是(正确答案)

协助慢性阻塞性肺疾病患者训练腹式呼吸时，护士一手放在患者的() [单选题] \*

- A 腹部(正确答案)
- B 腰部
- C 背部
- D 上胸部

肺栓塞最常见的栓子() [单选题] \*

- A、 血栓(正确答案)
- B、 羊水
- C、 空气
- D、 脂肪

考核肺结核化疗效果的主要指标是：() [单选题] \*

- A、x 线好转
- B、症状好转
- C、血沉下降
- D、痰结核菌转阴性(正确答案)

慢性肺心病急性加重期的最常见诱因是() [单选题] \*

- A、过劳
- B、大量利尿
- C、使用镇静剂
- D、呼吸道感染(正确答案)

慢性肺心病并发心律失常最多表现为() [单选题] \*

- A、室性期前收缩
- B、房性期前收缩(正确答案)
- C、心房扑动
- D、心房颤动

COPD 的标志性症状 B [单选题] \*

- A 慢性咳嗽(正确答案)
- B 气短或者呼吸艰难
- C 喘息和胸闷

D 咳嗽、咳痰

胸部叩击合用于() [单选题] \*

A 久病体弱，长期卧床、排痰无力者(正确答案)

B 未经引流的气胸

C 肋骨骨折、有骨折史

D 咯血病人

结核性与癌性胸腔积液鉴别要点是() [单选题] \*

A.胸水颜色

B.胸水细胞学与细菌学检查(正确答案)

C.胸水蛋白质含量

D.胸水 LDH 含量

肺癌中恶性程度最高的是() [单选题] \*

A.小细胞未分化癌(正确答案)

B.大细胞未分化癌

C.腺癌

D.鳞状上皮细胞癌

慢性肺心病最常见的并发症是() [单选题] \*

A、 肺性脑病(正确答案)

B、 休克

C、上消化道出血

D、 DIC

外源性支气管哮喘，浆细胞产生使人体致敏的抗体是：() [单选题]\*

A、 IgA

B、 IgG

C、 IgE (正确答案)

D、 IgM

在支气管哮喘的治疗中，哪种药物既能抑制炎症反应，又能增加  $\beta$  受体数量，抑制组胺酸脱羧酶：() [单选题]\*

A、 吸入异丙基肾上腺素

B、 吸入色甘酸二钠

C、 静脉缓注氨茶碱

D、 大量静点糖皮质激素(正确答案)

哮喘严重发作时，下列哪项是通气不足的可靠指标：() [单选题]\*

A、 弥漫性哮鸣音

B、 PaCO<sub>2</sub> 50mmHg(正确答案)

C、 呼气性呼吸艰难；

D、 PaO<sub>2</sub> 60mmHg

主要作用于  $\beta_2$  肾上腺素能受体的支气管解痉药是：() [单选题]\*

- A、肾上腺素
- B、沙丁胺醇(正确答案)
- C、氨茶碱
- D、麻黄素；

下列情况可不入院治疗的() [单选题] \*

- A 症状显著加剧
- B 浮现新的体征
- C 高龄慢性阻塞性肺疾病患者稳定期(正确答案)
- D 新近发生的心律失常

慢性阻塞性肺疾病的危 ( wei ) 险因素不包括 () [单选题] \*

- A 吸烟
- B 感染
- C 空气污染
- D 糜蛋白酶含量增高(正确答案)

慢性阻塞性肺疾病患者通过吹蜡烛来训练缩唇呼气，错误的是() [单选题] \*

- A 蜡烛与口唇的距离 15 ~ 20cm 处
- B 缩唇的大小程度要适合
- C 要使蜡烛火焰熄灭(正确答案)
- D 蜡烛与口唇等高

不利于慢性阻塞性肺疾病患者换气的姿式是 () [单选题] \*

A 全身松弛、上身略前倾的坐位

B 端坐位挺胸(正确答案)

C 全身松弛、上身略前倾的站位

D 上身前倾趴在桌上的坐位

慢性阻塞性肺疾病患者家庭氧疗的时间(小时/天)是：() [单选题] \*

A > 15(正确答案)

B > 10

C > 8

D > 6

以下有关慢性阻塞性肺疾病患者氧疗的目的描述错误的() [单选题] \*

A 使肺功能恢复正常(正确答案)

B 提高血氧饱和度

C 提高动脉血氧分压

D 提高肺泡内氧分压 E

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)初期的临床特点是() [单选题] \*

A 有严重低氧血症

B 深度昏迷

C 有明显肺部体征

D 呼吸困难(正确答案)

对 ARDS 的诊断和病情判断有重要意义的检查是() [单选题]\*

A 血气分析(正确答案)

B 呼吸功能监测

CX 线检查

D 血流动力学监测

患者，28岁，发热3天，今晨起呼吸困难，鼻导管吸氧未见好转。查体：体温39℃，脉搏110次/分，呼吸28次/分，血压110/70mmHg。双肺闻及细湿啰音及管状呼吸音。动脉血气分析：PaO<sub>2</sub> 50mmHg，PaCO<sub>2</sub> 40mmHg。胸部X线：双肺可见大片阴影。诊断为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。患者此时最主要的护理问题是

() [单选题]\*

A 活动无耐力

B 清理呼吸道无效

C 气体交换受损(正确答案)

D 知识缺乏

患者女，60岁。确诊为急性呼吸窘迫综合征，赋予面罩吸氧。为了使吸入氧能够达到53%需将氧流量调制() [单选题]\*

A10L/min

B6L/min

C4L/min

D8L/min(正确答案)

患者，男，65岁，心脏瓣膜置换术后并发急性呼吸窘迫综合征，需使用呼吸机治疗。患者家庭经济负担大，其家属很担心费用问题，询问护士是否可以不使用呼吸机。护士的最佳做法是() [单选题] \*

A 强调使用呼吸机的重要性(正确答案)

B 告知使用呼吸机的费用

C 让其直接去问医生

D 告诉其若抛却治疗则后果自负

急性呼吸衰竭患儿护理措施正确的除外() [单选题] \*

A 密切观察病情变化

B 遵医嘱给予吸氧

C 让患儿取半卧位或者坐卧位

D 不断吸痰以保持呼吸道通畅(正确答案)

中枢性呼吸衰竭的主要表现是() [单选题] \*

A 心律不齐

B 面色潮红

C 呼吸增快

D 潮式呼吸(正确答案)

患者，男，62岁，患COPD12年。近3天因急性上呼吸道感染病情加重，体温38.2℃，神志恍惚、昼睡夜醒，气促、不能平卧，痰色黄、粘稠、不易咳出。血气

分析示 PaO<sub>2</sub> 56mmHg、PaCO<sub>2</sub> 67mmHg。该患者浮现了呼吸衰竭，应禁用()

[单选题] \*

Aβ<sub>2</sub>受体激动剂

B 氨茶碱

C 镇静催眠剂(正确答案)

D 呼吸兴奋剂

呼吸衰竭的患者，呼吸中枢兴奋性下降，应使用的药物是() [单选题]\*

A 沙丁胺醇

B 酚妥拉明

C 头孢曲松

D 可拉明(正确答案)

患者，女，68岁。有慢性哮喘史15年。近日感冒后病情加重，夜间咳嗽频繁，痰量多。以急性呼吸衰竭入院治疗。经治疗后病情缓解，准备出院，但 PaO<sub>2</sub> 仍低(55mmHg)。为防止心脏进一步受累，最有效的措施是() [单选题]\*

A 作腹式呼吸加强膈肌运动

B 避免吸入有害气体

C 保持室内清洁

D 进行家庭氧疗(正确答案)

某慢性肺源性心脏病患者近两日来因感冒后呼吸艰难加重，血气分析示

PaO<sub>2</sub>52mmHg，PaCO<sub>2</sub>76mmHg，此时给氧宜采用() [单选题] \*

- A 间歇给氧
- B 低浓度持续给氧(正确答案)
- C 高浓度持续给氧
- D 高压给氧

II型呼吸衰竭时不可能浮现() [单选题] \*

- A 球结膜水肿
- B 精神、神经症状
- C 头痛、头晕
- D 皮肤干燥(正确答案)

患者，男性，73岁，慢性呼吸衰竭，护士观察到患者在应用辅助呼吸和呼吸兴奋药过程中，浮现了恶心、呕吐、烦躁、面颊潮红、肌肉颤动等现象。该护士考虑患者可能的原因是() [单选题] \*

- A 肺性脑病先兆
- B 呼吸性酸中毒
- C 痰液阻塞
- D 呼吸兴奋药过量(正确答案)

慢性呼吸衰竭最常见的病因是() [单选题] \*

- A 慢性阻塞性肺疾病(正确答案)
- B 慢性支气管炎
- C 充血性心竭

D 支气管扩张

II型呼吸衰竭患者的血气分析结果是() [单选题]\*

APaO<sub>2</sub><60mmHg,PaCO<sub>2</sub> 正常

BPaO<sub>2</sub><60mmHg,PaCO<sub>2</sub><50mmHg

CPaO<sub>2</sub><60mmHg,PaCO<sub>2</sub>>50mmHg(正确答案)

DPaO<sub>2</sub>>60mmHg,PaCO<sub>2</sub><50mmHg

患者，男，70岁，诊断为COPD并发呼吸衰竭。血气分析：PaO<sub>2</sub>47mmHg，PaCO<sub>2</sub>50mmHg，pH7.25，为呼吸性酸中毒，纠正酸中毒的主要措施为() [单选题]\*

A 增加通气(正确答案)

B 静滴碱性药物

C 控制感染

D 使用激素

患者，男，70岁，肺心病20余年，高血压10年。3天前受凉，咳嗽、咳痰、呼吸艰难加重，喘息严重呈端坐呼吸，双下肢水肿。今晨护士发现：患者嗜睡，球结膜水肿，口唇发绀，BP170/60mmHg，R28次/分，P120次/分。引起该患者意识障碍最可能的原因是() [单选题]\*

A 脑出血

B 高血压脑病

C 细菌性脑膜炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/457166060120006041>