

品备考资料

（知识点/试题卷/真题）

考前多练习
考后多得分
精准抓考点
快速冲高分

2022 年职业技能《医院急救技能护理》 知识考试试题与答案

目录简介

一、多选题：共 100 题

二、简答题：共 5 题

一、多选题

1、 防止输血时发生溶血反应的措施包括（ ）

- A 认真核对献血者和受血者姓名
- B 核对血型鉴定和交叉配血结果
- C 取血后勿剧烈震荡
- D 库血不能加温后输入
- E 库血保存不超过 3 周

正确答案：ABCDE

2、 以下哪些患者不宜洗胃（ ）

- A 胃癌 B 幽门梗阻
- C 食道静脉曲张 D 误服强酸

E 消化道溃疡

正确答案：ACDE

3、救护车内的各种药械应该做到（ ）

A 定期使用 B 固定基数

C 固定位置 D 定时消毒

E 定时维修

正确答案：BCDE

4、急救护士的素质要求是（ ）

A 有较好的团结协作精神

B 较好的检伤分诊技术

C 掌握常见的急症救护技术

D 熟悉急救药的作用机制

E 坚守岗位，纪律性强

正确答案：ABCDE

5、实施 BLS 包括（ ）

A 开放气道 B 人工呼吸

C 包扎止血 D 胸外心脏按压

E 开放静脉通道

正确答案：ABD

6、常用的止血方法有（ ）

- A 加压包扎法 B 指压止血法
- C 放平肢体止血法 D 填塞止血法
- E 止血带止血法

正确答案：ABDE

7、不宜使用止血带止血的部位是（ ）

- A 前臀 B 上臂
- C 小腿 D 大腿 E 头部

正确答案：ACE

8、关于伤口包扎正确的是（ ）

- A 从上向下，从左到右
- B 从远心端到近心端
- C 固定绷带打结应在肢体内侧
- D 不可在伤口处打结
- E 不可随便还纳外露的肠内容物

正确答案：BDE

9、骨折固定常用的夹板有（ ）

- A 木制夹板 B 冲气夹板
C 钢丝夹板 D 可塑性夹板
E 颈部固定夹板

正确答案：ABCDE

10、固定的作用有（ ）

- A 保护创面 B 压迫止血
C 减轻疼痛 D 减少并发症
E 方便转运

正确答案：CDE

11、包扎的作用有（ ）

- A 保护创面 B 压迫止血
C 骨折固定 D 减轻疼痛
E 减少并发症

正确答案：ABCD

12、下列属于非感染性高热的是（ ）

- A 疟疾 B 中暑
C 伤寒 D 甲亢危象 E 流行性感

正确答案：BD

13、吸气性呼吸困难半三凹症，可见于（ ）

- A 急性肺炎 B 急性喉炎
- C 气道异物 D 支气管哮喘
- E 急性水肿

正确答案：BC

14、中心性紫绀的特点为（ ）

- A 紫绀限于末梢部位
- B 紫绀处皮肤温暖
- C 加热后紫绀消失
- D 按摩后紫绀可减轻或消失
- E 吸入高流量氧气后紫绀减轻

正确答案：BCE

15、周围性紫绀的特点为（ ）

- A 紫绀限于末梢部位
- B 紫绀处皮肤温暖
- C 加温后紫绀不消失
- D 按摩后紫绀可减轻或消失
- E 吸入高流量氧气后紫绀减轻

正确答案：AD

16、引起心源性呼吸困难的疾病有（ ）

- A 左心衰竭 B 右心衰竭
C 气管内异物 D 一氧化碳中毒
E 糖尿病酮症酸中毒

正确答案：AB

17、引起咯血的常见疾病有（ ）

- A 肺结核 B 肝硬化
C 支气管扩张 D 支气管肺癌
E 高血压

正确答案：ACD

18、呕血最常见的疾病有（ ）

- A 肺结核 B 消化道溃疡
C 胃癌 D 食管胃底静脉曲张 E 高血压

正确答案：BCD

19、双侧瞳孔缩小如针尖样，可见于（ ）

- A 吗啡中毒 B 有机磷中毒
C 阿托品中毒 D 脑疝 E 脑桥出血

正确答案：ABE

20、晕厥的分类有（ ）

- A 反射性晕厥 B 脑源性晕厥
- C 心源性晕厥 D 血液成分异常
- E 心因性晕厥

正确答案：ABCDE

21、瘫痪的分类包括（ ）

- A 周围性瘫痪 B 肌源性瘫痪
- C 神经—肌肉传导障碍性瘫痪 D 中间性瘫痪
- E 中心性瘫痪

正确答案：ABCE

22、下列对深昏迷判断正确的是（ ）

- A 全身肌肉松弛 B 对强烈的疼痛有反应
- C 各种反射均消失 D 生命体征发生障碍
- E 对声，光刺激无反应

正确答案：ACDE

23、引起鼻出血的原因有（ ）

- A 维生素K缺乏 B 维生素C缺乏

C 维生素 D 缺乏 D 肾慢性疾病

E 汞，苯中毒

正确答案：ABDE

24、呼吸困难的常见类型包括（ ）

A 心源性呼吸困难 B 肺源性呼吸困难

C 中毒性呼吸困难 D 血源性呼吸困难

E 神经源性呼吸困难

正确答案：ABCDE

25、胸痛常见的原因有（ ）

A 心肌梗塞 B 炎性病变

C 贲门痉挛 D 胸部外伤

E 白血病

正确答案：ABCDE

26、腹痛伴有便血常见于（ ）

A 痢疾 B 肠套叠

C 直肠癌 D 肝炎 E 胃癌

正确答案：ABCE

27、下列疾病能引起神经性呼吸困难的是（ ）

A 脑出血 B 脑损伤

C 癫痫 D 瘰病 E 白血病

正确答案：ABCD

28、心搏呼吸骤停的主要表现有（ ）

A 突然神志消失 B 大动脉摸不到搏动

C 心音听不清 D 无呼吸动作 E 浑身出汗

正确答案：ABD

29、心脏骤停时常见的心电图表现是（ ）

A 室颤 B 传导阻滞

C 心室静止 D 电-机械分离

E 室性心动过速

正确答案：ACDE

30、BLS 又称基础生命支持，包括（ ）

A 判断心跳，呼吸骤停 B 开放气道

C 人工通气 D 胸外心脏按压 E 机械通气

正确答案：ABCD

31、人工呼吸可采用的方法有（ ）

A 口对口 B 口对鼻

C 口对面罩 D 口对气管造口处

E 口对鼻导管

正确答案：ABCD

32、在 ALS 中，开放气道的方法有（ ）

A 口咽气道 B 鼻咽气道

C 食道气道 D 气管内插管

E 环甲膜切开术

正确答案：ABCDE

33、心跳骤停不复苏的指征为（ ）

A 病人心跳、呼吸停止 10min 以上

B 家属拒绝复苏要求

C 呼吸停止

D 癌症晚期发生心跳骤停

E 瞳孔散大

正确答案：ABD

34、口对口人工呼吸的操作正确的是（ ）

A 首次吹气 4 次

B 每次吹气量 800~1200ml

- C 保持肺膨胀压大于 20CmH2O
- D 保持病人吸入的氧浓度为 16%
- E 保持呼吸频率为 12 次/分

正确答案：BDE

35、具有正性肌力作用的复苏药是（ ）

- A 肾上腺素 B 去甲肾上腺素
- C 异丙肾上腺素 D 利多卡因 E 多巴胺

正确答案：ABCE

36、治疗心跳骤停后造成的缺氧性脑损伤常用的方法为（ ）

- A 头部降温 B 应用大量激素
- C 脱水疗法 D 高压氧治疗
- E 抗自由基治疗

正确答案：ABCDE

37、引起心源性休克的机制有（ ）

- A 严重心肌功能障碍 B 血液动力学改变
- C 微循环改变 D 心率失常 E DIC

正确答案：ABD

38、引起梗阻性休克的常见原因是（ ）

A 急性心肌梗塞 B 急性心脏压塞

C 急性肺栓塞 D 张力性气胸 E 急性肺不张

正确答案：BCD

39、下列指标说明已补充血容量的是（ ）

A 动脉血压接近正常，脉压 $\geq 30\text{mmHg}$

B 尿量 $>30\text{ml/h}$

C 中心静脉压 $>12\text{cmH}_2\text{O}$

D 口唇红润、肢端变暖

E 心率正常

正确答案：ABCDE

40、下列属于休克的一般观察指标的是（ ）

A 意识 B 尿量

C 血压及脉压 D 皮肤黏膜的色泽及温暖

E 中心静脉压

正确答案：ABCD

41、休克液体复苏常用的晶体液包括（ ）

A 生理盐水 B 乳酸林格液

C 右旋糖酐 D 白蛋白

E 高渗氯化钠溶液

正确答案：ABE

42、急性左心衰的临床表现不包括（ ）

A 呼吸困难 B 肺底部湿罗音

C 颈静脉怒张 D 肝肿大和压痛 E 紫绀

正确答案：CD

43、在急性左心衰竭时，减轻心脏负荷的方法有（ ）

A 病人取坐位，双下肢下垂 B 吗啡

C 利尿药 D 血管扩张药 E 正性肌力药

正确答案：ABCD

44、急性左心功能衰竭的治疗，正确的（ ）

A 取坐位或半卧位，两腿下垂

B 高流量酒精湿化吸氧

C 无禁忌者皮下或肌肉注射吗啡或度冷丁

D 静脉给予速效利尿剂和氨茶碱

E 给予大量液体静脉点滴

正确答案：ABCD

45、呼吸衰竭病人的急救措施包括（ ）

A 给氧

B 清除呼吸道分泌物，保持气道通畅

C 开放静脉，祛除诱因

D 必要时，使用呼吸机辅助呼吸

E 应用支气管扩张药

正确答案：ABCDE

46、少尿——无尿性急性肾衰的少尿期常见的水，电解质紊乱有（ ）

A 水过多 B 高血钾症

C 低钾血症 D 低钠血症

E 高钙血症

正确答案：ABD

47、预防急性肾功能衰竭的措施有（ ）

A 及时补充血容量 B 静脉输入碱性溶液

C 及时应用利尿剂和脱水剂 D 应用血管收缩剂

E 及时应用升压药

正确答案：ABC

48、急性肾功能衰竭多尿期重要的并发症（ ）

A 低钾血症 B 消化道出血

C 感染 D 低钙血症 E 高钠血症

正确答案：AC

49、急性肾衰患者少尿或无尿期的治疗原则是（ ）

A 控制水入量 B 使用抗生素以预防感染

C 纠正酸中毒 D 纠正低钾血症 E 采用透析疗法

正确答案：ABCE

50、对急性肾衰病人护理时应注意（ ）

A 记录出入量。特别是记录每小时尿量及其比重

B 限制蛋白质摄入量

C 定时做血电解质测定及血气分析

D 每天测量体重

E 根据肾功能及时调整用药剂量

正确答案：ACDE

51、急性肝衰竭常见的并发症（ ）

A 肝性脑病 B 出血

C 肾功能衰竭 D 心律失常 E 代谢紊乱

正确答案：ABCDE

52、下列护理肝性脑病患者的措施，正确的是（ ）

- A 饮食中蛋白质控制在 20~40g
- B 注意胃肠道有无出血征象
- C 防止便秘 D 新霉素治疗
- E 应用利尿剂

正确答案：ABCD

53、降低颅压的护理措施包括（ ）

- A 平卧位
- B 补足液体入量，防止血容量不足
- C 给氧 D 控制感染
- E 使用降低颅压的药物

正确答案：CDE

54、下列因素造成颅内压骤然升高的是（ ）

- A 呼吸道梗阻 B 剧烈咳嗽
- C 癫痫发作 D 意识障碍
- E 血压降低

正确答案：ABC

55、心脏复跳后病人呈现休克状态一般与（ ）因素有关

- A 心脏收缩力低下 B 酸中毒

C 感染 D 心律失常

E 过敏

正确答案：ABD

56、低钾血症的常见原因是（ ）

A 长期禁食 B 排出过多

C 细胞内转移 D 肾外途径丧失

E 肾功能衰竭

正确答案：ABCD

57、属于低钾血征的表现为（ ）

A 嗜睡，软瘫 B 腹胀恶心

C 血压升高，心电图 T 波高耸

D 常伴碱中毒

E 可有肢体痉挛

正确答案：ABD

58、低钾血症时补钾，错误的是（ ）

A、5%葡萄糖溶液 500ml 加入氯化钾 1、5g 静脉点滴

B 滴入速度在每分钟 60 滴以下

C 严重缺钾者当尿量达到 15ml/小时即应开始静脉补钾

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/458017062141006064>