题目答案

1 护理程序的步骤为： C

A.评估.计划.实行

B.评估.计划.实行.评论

C.. 评估.诊疗.计划.实行.评论

D.评估.整理.诊疗.计划.实行.评论

2 重生儿病室适合的温度.湿度应保持在多少?

A.温度 22—24℃， 湿度 50%一 60%

B.温度 18—22℃， 湿度 50%一 60%

C.温度 22—24℃， 湿度 60%一 70%

D.温度 18—22℃， 湿度 60%一 70%

A

3 一般病室温度.湿度应保持在多少?

A.温度 22—24℃， 湿度 50%一 60%

B.温度 18—22℃， 湿度 50%一 60%

C.温度 22—24℃， 湿度 60%一 70%

D.温度 18—22℃， 湿度 60%一 70%

4 高血压患者平常生活中限制钠盆摄人，做到

A.<2g/d

B

B.<5g/d

C.<6g/d

D.<8g/d

5 缓解支气管哮喘急性发生的药物是

A. α 受体激动剂.茶碱类和抗胆碱类药

B. β 受体激动剂.茶碱类和抗胆碱类药

C.H 受体激动剂.茶碱类和抗胆碱类药

D.M 受体激动剂.茶碱类和抗胆碱类药

C

6 系统性红斑狼疮最常有的死亡原由是什么

A.感染.呼吸衰竭.心力弱竭

B. 出血.感染.脑伤害

C.呼吸衰竭. 出血.

D.感染. 肾衰竭.脑伤害和心力弱竭

7 痛风病人的饮食原则

B

A. 低嘌呤.低脂肪.高热量 .低盐和多饮水

B. 低嘌呤.低脂肪.低热量 .低盐和多饮水

C.低嘌呤.低脂肪.低热量 D.低嘌呤.高脂肪.低热量 .低盐和少饮水 .低盐和多饮水

8 脑出血最严重的并发症是 A

A. 脑疝

B. 窒息

C. 昏倒

D

D.心力弱竭

9 简述腰椎穿刺术的体位要求 D

A. 患者膝胸卧位，屈颈抱膝

B. 患者膝胸卧位，屈颈抱膝

B

C.患者侧卧，背齐床沿，屈颈抱膝

D.患者去枕侧卧，背齐床沿，屈颈抱膝

10 腰椎穿刺术后并发症最常有的是 C

A. 脑疝

B. 感染

C.头痛

D.腰痛

11 颅内动脉瘤血管栓塞治疗的术后穿刺部位加压包扎制动 C

A.2h

B.6h

C.24h

D.48h

12 对于呼吸衰竭给氧原则表达正确的选项是 A

A.I 型呼吸衰竭可给子高浓度 (>35%)吸氧， II 型呼吸衰竭应赐予低浓度 (<35%)吸氧

B.I 型呼吸衰竭可给子低浓度 (<35%)吸氧， II 型呼吸衰竭应赐予高浓度 (>35%)吸氧

C.I 型呼吸衰竭可给子高浓度 (>25%)吸氧， II 型呼吸衰竭应赐予低浓度 (<25%)吸氧

D.I 型呼吸衰竭可给子低浓度 (<25%)吸氧， II 型呼吸衰竭应赐予高浓度 (>25%)吸氧

13 应用 0—5 文字描绘法评估痛苦，达到扰乱睡眠，需用麻醉止痛药程度，属于 B

A.2 级中度痛苦

B.3 级重度痛苦

C.4 级强烈痛苦

D.5 级没法忍耐

14 输液中发生空气栓塞时患者应采纳何种体位 A

A. 左边卧位，头低足高位

B. 右边卧位，头低足高位

C.左边卧位，头高足低位

D.右边卧位，头高足低位

15 对于 AB 型血，表达正确的选项是 C

A.红细胞膜上只有 A 抗原者

B.红细胞膜上只有 B 抗原者

C.红细胞膜上有 A,B 两种抗原者

D.红细胞膜上既无 A 抗原，也无 B 抗原者

16 属于下肢深静脉血栓形成的临床表现的是 B

A.Allis 征阳性

B.Humans 征阳性

C.trendelenburg 征阳性

D.Thomas 征阳性

17 护理人员常用颜色分诊法对成批伤员进行快速分诊，属于第一优先 (红色标记)是： A

A. 伤员有生命危险，需立刻办理

B. 伤员可能有生命危险，需尽早办理

C.伤员有稍微的伤害，能行走

D.伤员已死亡

18 经口气管插管的深度表达正确的选项是 A

A.导管尖端至门齿的距离，往常成人为 22cm 士 2cm

B.导管尖端至门齿的距离，往常成人为 27cm 士 2cm

C.导管尖端至鼻尖的距离，往常成人为 22cm 士 2cm

D.导管尖端至鼻尖的距离，往常成人为 27cm 士 2cm

19 经鼻气管插管的深度表达正确的选项是 D

A.导管尖端至门齿的距离，往常成人为 22cm 士 2cm

B.导管尖端至门齿的距离，往常成人为 27cm 士 2cm

C.导管尖端至鼻尖的距离，往常成人为 22cm 士 2cm

D.导管尖端至鼻尖的距离，往常成人为 27cm 士 2cm

20 依据血压高升的水平，高血压可分为 1,2,3 级，以部下于高血压 2 级的是 C

A.缩短压 120—139mmHg 和(或)舒张压 80—89mmHg

B.缩短压 140—159mmHg 和(或)舒张压 90—99mmHg

C.缩短压 160— 179mmHg 和(或)舒张压 100— 109mmHg

D.缩短压>180mmHg 和(或)舒张压>110mmHg

21 结素的纯蛋白衍化物实验结果为为阳性的是 C

A.硬结直径<4mm

B.硬结直径 5---9mm

C.硬结直径 10--19mm

D.硬结直径>20mm 或局部有水泡和淋巴管炎

22.类风湿关节炎患者的关节表现表达正确的选项是 A

A. 对称性多关节炎，主要入侵小关节

B. 对称性多关节炎，主要入侵大关节

C.非对称性多关节炎，主要入侵小关节

D.非对称性多关节炎，主要入侵大关节

23 若血小板不可以实时输注，应将放在 22℃振荡器上保存，最长时间不超出 B

A.6h

B.12h

C.24h

D.48h

24 脑血管病的预防中最重点一环是 A

A.一级预防

B.二级预防

C.三级预防

D. 四级预防

25WHO1999 年的糖尿病诊疗标准表达错误的选项是 D

A.有糖尿病典刑症状者，随机血浆葡萄糖≥ 11.1mmol/L(200mg/dl)

B.有糖尿病典刑症状者，空肚血浆葡萄糖≥ 7.0mmol/L(126mg/dl)

C.有糖尿病典刑症状者，口服葡萄糖耐量试验≥11.1mmol/L(200mg/dl) ,75g 葡萄糖负荷后 2 小时血浆葡萄糖

D.有糖尿病典刑症状者，口服葡萄糖耐量试验≥11.1mmol/L(200mg/dl) ,50g 葡萄糖负荷后 2 小时血浆葡萄糖

26 胰岛素的寄存方法表达错误的选项是： B

A.未启封的胰岛素，储藏温度为 2-8℃冷藏保存

B.未启封的胰岛素，可在室温环境(25℃--30℃)保存

C.启封后.正在使用的瓶装胰岛素或笔芯，可在室温环境(25℃--30℃)保存 4 周

D.启封后.正在使用的瓶装胰岛素或笔芯，寄存在阴凉干燥的地方，无需冷藏，防止光和热

27 重症中暑患者的紧迫降温表达正确的选项是

A.物理降温与药物降温结合进行，往常应在 1h 内使直肠温度降至 38℃左右 A

B.物理降温与药物降温结合进行，往常应在 2h 内使直肠温度降至 38℃左右

C.主张物理降温，往常应在 1h 内使直肠温度降至 38℃左右

D.主张物理降温，往常应在 2h 内使直肠温度降至 38℃左右

28 有关阿托品化表达不正确的选项是 A

A.瞳孔减小

B. 口干，皮肤黏膜干燥。

C.颜面潮红

D.肺部锣音减少或消逝

29 心力弱竭的引发要素众多，此中最常有的感染诱因是 A

A. 呼吸道感染

B. 消化道感染

C.泌尿系统感染

D.生殖系统感染

30 “歇息时无自觉症状，但平常一般活动可出现上述症状，歇息后很快缓解。 ”属于 B

A.心功能 1 级

B.心功能 2 级

C.心功能 3 级

D.心功能 4 级

31 大批痰为每天痰量超出 B

A.50ml

B.100ml

C.200ml

D.500ml

32 以下对于痰液察看的内容，表达错误的选项是 D

A. 痰液恶臭常见于厌氧菌感染

B. 棕褐色痰常见于阿米巴肺脓肿

C.铁锈色痰常见于肺炎球菌性肺炎

D.烂桃样痰常见于支原体感染

34 慢性堵塞性肺疾病患者缩唇呼吸的重点错误的选项是 C

A. 闭口经鼻吸气

B. 缩唇(吹口哨样)迟缓呼气

C.吸气与呼气时间比 1:4

D.呼气流量以能使距口唇 15—20cm 处并与口唇等高的蜡烛火焰轻轻倾斜而不熄灭为宜

35 恶性淋巴瘤肿瘤压迫组织器官产生相应的症状和体征不包含 A.上腔静脉压迫综合征

B

B. 肝脾肿大

C.肠堵塞

D.黄疸

36 慢性堵塞性肺疾病并有肺动脉高压患者的家庭氧疗正确的选项是 C

A. 间歇吸氧，吸氧流量 3-5L/min ，每天吸氧 6h

B. 间歇吸氧，吸氧流量 3-5L/min ，每天吸氧 12h

C.鼻导管连续低流量吸氧，吸氧流量 1-2L/min ，每天吸氧 15h 以上

D.鼻导管连续低流量吸氧，吸氧流量 1-2L/min ，每天吸氧 8h 以上

37 糖尿病运动治疗的运动时间应放在 B

A.餐前 1-2h 进行

B.餐后 1-2h 进行

C.餐前 0.5h 进行

D.餐后 0.5h 进行

38 脉搏短绌的患者丈量脉率方法正确的选项是 C

A. 两人同时丈量，一人听心率，另一人测脉率，由听心率者发出“起”“停”口令，计时 30 秒

B. 两人同时丈量，一人听心率，另一人测脉率，由听脉率者发出“起”“停”口令，计时 30 秒

C.两人同时丈量，一人听心率，另一人测脉率，由听心率者发出“起”“停”口令，计时 I 分钟

D.两人同时丈量，一人听心率，另一人测脉率，由听脉率者发出“起”“停”口令，计时 I 分钟

39 测血压应做到四定，即 D

A. 定室温.定部位.定体位 .定血压计

B. 定室温.定部位.定体位 .定听诊器

C.准时间.定部位.定体位 D.准时间.定部位.定体位 .定听诊器 .定血压计

40 丈量血压时袖带对测得的血压影响表达正确的选项是 A

A. 袖带缠得过松，测得的血压值偏高；袖带缠得过紧，测得的血压值偏低

B. 袖带缠得过松，测得的血压值偏高；袖带缠得过紧，测得的血压值偏高

C.袖带缠得过松，测得的血压值偏低；袖带缠得过紧，测得的血压值偏低

D.袖带缠得过松，测得的血压值偏低；袖带缠得过紧，测得的血压值偏高

41 潮式呼吸的表现特色是： B

A.有规律地呼吸几次后,忽然停止呼吸, 间隔一个短时期后又开始呼吸,这样频频交替

B. 呼吸由浅慢到深快，而后再由深快到浅慢，经过一段时间的呼吸暂停后，又重复以上周期性呼吸，循环往复

C.呼吸由浅慢到深快，而后再由深快到浅慢，频频交替

D.有规律地呼吸几次后，呼吸由浅慢到深快，忽然停止呼吸，频频交替，循环往复

42 李先生， 60 岁，因“脑血栓形成”后 3 周，右边上下肢能在床面上平移，但不可以抬起，判断其肌力为 C

A.0 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

43 万女士，因“脑出血” 3H，当前昏倒，其机体活动功能为

A.1 度

D

B.2 度

C.3 度

D.4 度

44 对于口服给药，以下说法错误的选项是

A.缓释片.肠溶片.胶囊吞服时不行嚼碎

B. 对牙步有腐化作用的药物，如酸类和铁剂，应用吸管吸服后漱口以保护牙齿

C.抗生素及磺胺类药物应准时服药，以保证有效的血药浓度

D

D.一般状况下，健胃药宜在饭后服

45 按压疮的发展次序分为以下四期

A. ①炎性浸润期;②淤血红润期;③浅度溃疡期 ;④坏死溃疡期

B. ①炎性浸润期;②浅度溃疡期;③淤血红润期 ;④坏死溃疡期

C.①淤血红润期;②浅度溃疡期;③炎性浸润期 ;④坏死溃疡期

D.①淤血红润期;②炎性浸润期;③浅度溃疡期 ;④坏死溃疡期

46 大剂量甲氨蝶呤化疗致口腔溃疡可使用以下哪项来来预防及护理 B

D

A. 呋喃西林漱口液

B. 四氢叶酸钙稀释液

C.蛋清

D.锡类散

47 急性尿潴留放尿为了防止膀恍出血，一次放尿量不行超出

A.500ml

B.800ml

C.1000ml

D.1200ml

48 糖皮质激素服药时期应赐予

A.低盐.高蛋白.高钾.高钙饮食

B.高热量.高蛋白.低盐.低钾饮食

C.低热量.低蛋白.低热量.低盐饮食

D.低盐.高蛋白.高钾.低钙饮食

49 正常人少尿是指

C

A.24h 尿量少于 400ml

B.24h 尿量少于 100ml

C.每小时尿量少于 10ml

D.12h 内无尿

50 自然光芒下，瞳孔正常直径为

A.1-2mm

B.2-5mm

A

C.5-8mm

D.8-10mm

51 禁用热疗法的状况有

A. 体温不升

B. 结膜炎

A

B

B

C.末梢循环不良

D.肛门手术后

52 肝硬化腹水进水量限制在每天 B

A.500ml 左右

B.1000ml 左右

C.1500ml 左右

D.2000ml 左右

53 不属于减少胰腺外分泌的举措是 C

A. 禁食及胃肠减压

B. 抗胆碱药

C.M 受体拮抗剂

D.胰升糖素

54 患者消化道出血量达到多少即可出现头晕 .心悸.乏力 C

A.50--- 70ml

B.250--300ml

C.400--- 500ml

D.1000ml

55 对于意识阻碍，以下表达错误的选项是 C

A.嗜睡：患者处于连续睡眠状态，但能被语言或轻度刺激唤醒，醒后能正确 .简单而缓慢地回答以下问题，但反响愚钝，停止刺激后又很快人睡。

B.意识模糊：表现为定向力阻碍，思想和语言不连结，可有错觉.幻觉.躁动不安.谵语或精神错杂。

C.浅昏倒：患者处于酣睡状态，不易唤醒。但能被压迫眶上神经.摇起程体等强刺激唤醒，醒后答话含糊或答非所问，停止刺激后又进入酣睡状态。

D.深昏倒：意识完好丧失，对各样刺激均无反响

56 对于成分输血的注意事项错误的选项是 B

A. 白细胞.血小板等，存活期短，以新鲜血为宜，一定在 24h 内输人体内(从采血开始计时)

B.血浆在输入前需进行交错配血试验

C.输血前依据医嘱赐予抗过敏药物

D.如患者在输成分血的同时，还需输全血，则应先输成分血，后输全血

57 某病人吸氧的流量为 3L/min，其吸氧的浓度为 C

A.28%

B.30%

C.33%

D.40%

58 氧气雾化吸入的注意事项错误的选项是 A

A.氧气湿化瓶盛水 1/3—2/3

B.氧气流量 6—8L/min

C.雾化后辅助患者洁净口腔

D.意察看患者痰液排出状况

59 华法林抗凝治疗时期的护理重点错误的选项是 A

A.赐予富含维生素的食品

B.按期抽血监测国际标准化比值

C.尽量防止应用阿司匹林

D.严格按医嘱用药

60 心脏介入术后病人的一般护理举措不正确的 hi

B

A.赐予平淡易消化饮食，防止生冷及产气食品

B.卧床歇息，保持穿刺侧肢体系动 2h

C.卧床时期做好生活护理与基础护理

D.察看伤口及末梢循环状况

61 急性心肌梗死患者急诊惯例实行办理不正确的选项是

A.给氧

B.硝酸甘油舌下含服

D

C.阿司匹林嚼服

D.不稳固型心绞痛的患者赐予吗啡

62 经内镜逆行胰胆管造影术(FRCP)术后并发症不包含

A. 出血

B.穿孔

C.急性胰腺炎

D

D.胆囊结石

63 胰岛素泵输注方式分为

A.正常量和运动量

B.基础量和餐前量

C.基础量和运动量

D.正常量和餐前量

64 低钾血症最早出现的临床表现是

A.恶心

B

B.呼吸困难

C.肌无力

D.腱反射消逝

65 低钾血症时静脉补钾的速度不宜超出

A.20mmol/L

B.30mmol/L

C.40mmol/L

C

D.50mmol/L

66 代谢性酸中毒的典型症状

A.呼吸浅慢

B.心率加速.血压低

C.呼吸深而快，伴有酮味

D.腱反射减弱

67 在休克患者的治疗和护理中，说法正确的选项是

A

A.休克初期脉搏细速或摸不清

B.休克患者的体温均偏低

C.尿量≥30ml/h 时，表示休克已纠正

D.休克克制期的患者可有喜悦或浮躁不安的表现

68 手术前呼吸道准备戒烟时间应选择起码

C

B

C

A.5 日

B.2 周

C.3 周

D.4 周

69 有肺部感染者术前应用有效抗生素 B

A.2~3 天

B.3~5 天

C.5~7 天

D.7~10 天

70 伤口湿性愈合理论的提出者是 D

A.1963Hinman

B.1962Pasteur

C.1958Odland

D.1962Winter

71 休克患者宜采纳何种卧位 B

A. 平卧位

B. 中凹卧位

C.半卧位

D.去枕仰卧位

72 肠鸣音减弱或消逝提示 D

A. 高血钾

B. 机械性肠堵塞

C.急性胃肠炎

D.腹膜炎

73 乳癌患者术后护理举措中，不正确的选项是 B

A. 按摩患侧上肢预防患肢肿胀

B. 平放患侧上肢，防止在患侧上肢抽血.注射

D.可进行握拳.伸肘运动预防患肢肿胀

74 Reynolds 五联征不包含

D

A.寒战高热

B.休克

C. 中枢神经系统受克制

D.恶心.呕吐

75 对于脑室引流的护理重点，表达错误的选项是

A. 引流管最高点需高于侧脑室平面 10~15cm

B.24 小时引流量以不超出 500 为宜

C

C.正常脑脊液为透明橙黄色

D.改换引流瓶(袋)时，应先夹闭引流管

76 对于神经外科患者瞳孔的察看，不正确的选项是 B

A. 初期脑疝对侧瞳孔正常

B. 瞳孔时大时小，对光反射消逝常提示桥脑伤害

C.两侧瞳孔大小交替变化，眼球倾斜提示中脑受损

D.脑疝后期两侧瞳孔散大，眼球固定

77 办理张力性气胸的首选举措是 C

A.配合医生行胸膜腔闭式引流术

B.手术探查

C.粗针头穿刺胸膜腔排气

D.应用抗菌药

78 食管癌的典型临床表现是

A.咽食哽咽感

B.胸骨后炙烤样痛苦

C

C.进行性吞咽困难

D.连续性胸痛

79 食管癌术后饮食护理，不正确的选项是

A.禁食.禁饮 3~4 日

B.术后 5~6 日可给流质

C.进食时采纳半坐卧位

D.防止进食生.冷.硬食品

B

80 符合口瘘多发生在术后

A.7~8 天

B.4~6 天

C.3~5 天

D.5~10 天

81 肺段切除术者，麻醉清醒后首选下述何种体位

A.患侧卧位

D

B.健侧卧位

C.平卧位

D.半卧位

82 肺癌术后归并有支气管瘘管者，应取

A.头低足高仰卧位

B.健侧卧位

C.平卧位

D.患侧卧位

B

83 心包填塞的察看重点，不正确的选项是

A. 引流管内有条索状血块挤出

B.血压降落，心率减慢

C. 中心静脉压高升

D.尿量减少

84 初始血尿提示出血部位在

A.膀胱三角区

D

B.尿道

C.后尿道

D.输尿管

85 良性前列腺增生最常有的初期症状是

A.排尿困难

B.尿潴留

C.尿频

B

D.无痛性血尿

B

C

86 良性前列腺增生最主要的症状是 C

A. 尿频

B. 无痛性血尿

C.排尿困难

D.尿潴留

87 对于心包填塞的察看重点，不正确的选项是 B

A. 引流管内有条索状血块挤出

B. 血压降落，心率减慢

C. 中心静脉压高升

D.X 线检查提示纵膈增宽 .心影增大

88 肾伤害守旧治疗的护理重点，不正确的选项是 A

A.绝对卧床歇息 5~7 天

B.病情恢复后 2~3 个月内不宜参加体力劳动

C.遵医嘱赐予止痛冷静药

D.供给心理护理

89 骨折的特有体征不包含 C

A. 畸形

B. 失常活动

C.弹性固定

D.骨擦音

90 骨折的办理原则除外哪项 C

A. 复位

B. 固定

C.特别饮食

D.初期痊愈治疗

91 胎心音正常值是多少 C

A.100~160 次/分

B.120~140 次/分

C.120~160 次/分

D.100~140 次/分

92 最初进入骨盆进口的胎儿部分称 C

A. 胎产式

B. 胎方向

C.胎先露

D.骨盆轴

93 第二产程是指 B

A. 规律宫缩开始至宫口开全

B. 宫口开全至胎儿娩出

C.规律宫缩开始至胎盘娩出

D.规律宫缩开始至胎儿娩出

94 第三产程不该超出多少时间 B

A.2h

B.30min

C.1h

D.15min

对于早产的表达正确的选

95 项是 D

A.妊娠满 42 周及后来临盆

B.妊娠满 37 周至不满 42足周间临盆

C.妊娠满 36 周至不满 42足周间临盆

D.妊娠满 28 周至不满 37足周间临盆

96 以下对于阴道临盆后产妇会阴护理的表达，不正确的选项是

A.察看会阴伤口有无硬结 .水肿.溢出物

B. 改换会阴垫前要洗手

C.每天用 0.1%碘伏溶液冲刷会阴2 次 C

D.指导产妇取会阴伤口对侧卧位

97 疑有腹腔内出血的病人首选哪一种简单 .靠谱的诊疗方法

A.HCG 测定

B.B 超

C.双合诊

D. 阴道后穹窿穿刺 D

98 以下不属于胎盘早剥的并发症的是

A.DIC

B. 重生儿窒息

C.完好流产

D.早产

99 应用硫酸镁治疗妊娠高血压疾病时必备的解毒剂是 C

A. 肾上腺素

B. 硫代硫酸钠 C

C.10%葡萄糖酸钙

D.可拉明

100 以下对于多胎妊娠临盆期护理的表达，不正确的选项是 C

A. 增强生活护理和心理护理

B. 严实监测胎心变化.宫缩状况。

C.第一胎儿娩出后应立刻在腹部固定第二胎儿为纵产式

D.胎儿娩出后立刻使用宫缩剂

101 产妇心力弱竭时给氧流量和氧气湿化液为

A.2~4L/min50%乙醇

B.6~8L/min75%乙醇

C.6~8L/min50%乙醇

D.4~6L/min75%乙醇

102 以下哪项疾病不属于妊娠期糖尿病所致

A. 妊娠期高血压疾病

B. 胎儿畸形

C.羊水过少

D.重生儿呼吸窘况综合症

103 产后出血是指

A.产褥期阴道出血达 500ml 以上

B.胎儿娩出后 24h 内失血量超出 500ml

C

C

B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458076006056006060