

一、单选题

1、发生突触后抑制时可见到的现象是()

- (A)突触前膜递质释放减少
- (B)突触后膜递质水解酶失活
- (C)突触后膜受体数量减少
- (D)突触后膜超极化

2、下列属于肠系膜下动脉分支的是【】

- (A) 回结肠动脉
- (B) 右结肠动脉
- (C) 左结肠动脉
- (D) 中结肠动脉
- (E) 空肠动脉

3、下列关于皮质醇升高血糖机制的描述，正确的是（）

- (A)减少细胞对葡萄糖的利用
- (B)增加外周组织摄取葡萄糖
- (C)使肝糖异生酶的活性降低
- (D)增加葡萄糖转运体的活性
- (E)减少肝糖异生原料的供应

4、维持机体稳态的生理意义是（）

- (A)保证细胞的各种酶促生化反应
- (B)抑制条件反射和非条件反射
- (C)保证可兴奋细胞正常的兴奋性

(D)使正反馈效应不断加强

(E)是机体自由和独立生存的首要条件

5、衡量细胞兴奋性大小的常用指标是()

(A)静息电位大小

(B)阈强度大小

(C)动作电位幅度

(D)动作电位宽度

6、呼吸的全过程不包括（）

(A)肺牵张反射

(B)细胞内氧化代谢

(C)组织换气

(D)肺通气和肺换气

(E)气体在血液中的运输

7、触及左锁骨上窝硬而无痛的肿大淋巴结时，首先考虑的病因为【】

(A) 鼻咽癌

(B) 甲状腺乳头状癌

(C) 原发性肝癌

(D) 贲门黏液细胞癌

(E) 右侧小细胞肺癌

8、胸外心脏按压时，正确的按压部位是（）

(A)胸骨中、上 1/3 处

(B)胸骨左缘第 3 肋间

(C)胸骨左缘第 4 肋间

(D)左锁骨中线第 4 肋间

(E)胸骨中、下 1/3 交界处

9、下列属于脑高级功能活动的是【】

(A) 非条件反射

(B) 视听觉

(C) 饥渴觉

(D) 平衡觉

(E) 短时记忆

10、增加冠脉血流量最主要的因素是（）

(A)交感神经兴奋

(B)迷走神经兴奋

(C)血管紧张素 II 分泌增多

(D)心肌代谢增强

(E)血管升压素分泌增多

11、呕血与咯血最重要的鉴别点是（）

(A)是否为大出血

(B)是否伴有恶心

(C)是否伴有黑便

(D)是否伴有发热

(E)是否混有胃内容物

12、汇合形成上腔静脉的是()

(A)颈内静脉与锁骨下静脉

(B)左、右头臂静脉

(C)颈内静脉与奇静脉

(D)颈外静脉与锁骨下静脉

13、下列监测值中不正确的是（）

(A)CVP的正常值为 5~12cmH₂O

(B)心排血量的正常值为 4~6L/min

(C)PCWP 的正常值为 6~15cmH₂O

(D)动脉血乳酸盐的正常值为 1~15mmol/L

(E)血 pH 的正常范围为 7.35~7.45

14、休克代偿期的临床表现有（）

(A)皮肤、黏膜明显发绀

(B)兴奋或烦躁不安

(C)精神紧张

(D)心率加快、脉压减小

(E)尿少甚至无尿

15、男性患者有尿道外括约肌环绕尿道的部位是（）

(A)尿道内口

(B)尿道外口

(C)尿道前列腺部

(D)尿道球部

(E)尿道膜部

16、关于外科感染，叙述不正确的是（）

(A)疖是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(B)急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染

- (C)脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染
- (D)痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (E)甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

17、关于复苏后处理的原则，不正确的是（）

- (A)维持良好的呼吸功能
- (B)确保循环功能稳定
- (C)持续应用抗菌药物
- (D)防治肾功能衰竭
- (E)防治脑水肿

18、造成心室前负荷增大的因素是（）

- (A)心肌收缩力增强
- (B)静脉回流速度下降
- (C)心室充盈量增大
- (D)心率增快
- (E)心室顺应性减小

19、男，2岁。玩耍中突发呼气性呼吸困难半小时急诊就诊。最可能出现的肺部体征是【】

- (A)肺部局限性干啰音
- (B)双肺布满哨笛音
- (C)双肺粗大湿啰音
- (D)胸膜摩擦音
- (E)双肺底捻发音

20、可做向前和向后运动的关节是（）

- (A)踝关节

(B)肘关节

(C)桡腕关节

(D)肩关节

(E)颞下颌关节

21、防止子宫脱垂的主要结构是()

(A)子宫圆韧带

(B)子宫主韧带

(C)子宫阔韧带

(D)子宫骶韧带

22、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN 6.0mmol/L ，总胆红素 $12.7\mu\text{mol/L}$ ，

空腹血糖 6.0mmol/L ，总胆固醇 7.5mmol/L 。临床的诊断是（）

(A)肾功能不全伴黄疸

(B)肝功能异常伴血脂异常

(C)肝功能衰竭伴黄疸

(D)糖尿病伴肾功能不全

(E)糖尿病伴血脂异常

23、两侧同时收缩，使脊柱后伸的肌是（）

(A)背阔肌

(B)竖脊肌

(C)胸大肌

(D)斜方肌

(E)腹直肌

24、腹部移动性浊音不正确的检查方法是（）

- (A)变换体位后继续原方向叩诊
- (B)叩诊音变浊音后改变体位
- (C)自腹中部沿脐水平面叩诊
- (D)变换体位时板指不应移动
- (E)受检者首先需采取平卧位

25、男，70 岁。近 1 周间断排黑便，近期体重下降 4kg。为明确诊断应首选的检查方法是

【】

- (A) 腹部 B 超
- (B) 胃镜+活组织病理
- (C) 消化道钡剂造影
- (D) 粪便常规
- (E) 腹部 CT

26、与阴道后穹后方相邻的腹膜间隙是（）

- (A)卵巢窝
- (B)膀胱上窝
- (C)膀胱子宫陷凹
- (D)直肠膀胱陷凹
- (E)直肠子宫陷凹

27、注入乳糜池的淋巴干是（）

- (A)左颈干
- (B)右锁骨下干
- (C)左锁骨下干
- (D)右颈干

(E)肠干

28、正常时肾小球不能滤过的物质是（）

(A)尿素

(B)氨基酸

(C)大分子蛋白质

(D)葡萄糖

(E)电解质

29、测量血压时舒张压的判定为（）

(A)听到声音变短促前的压力

(B)听到柔和吹风样杂音时的压力

(C)听到响亮拍击音时的压力

(D)拍击音重新出现时的压力

(E)声音消失时的压力

30、Brudzinsk征阳性的表现是（）

(A)趾背伸四趾屈曲

(B)颈部抵抗增强

(C)股四头肌收缩

(D)伸膝受阻伴疼痛

(E)髋关节及膝关节屈曲

31、引起肝颈静脉回流征阳性的常见病症是（）

(A)右心衰竭

(B)下腔静脉阻塞

(C)门脉高压症

(D)左侧胸腔积液

(E)肝功能衰竭

32、参与脂肪消化和吸收的主要胆汁成分是【】

(A) 胆盐

(B) 阴离子

(C) 胆固醇

(D) 胆色素

(E) 磷脂酰胆碱

33、肾窦内含有的结构有（）

(A)肾静脉的属支

(B)肾大盏

(C)肾小盏

(D)肾动脉的分支

(E)肾盂

34、下列属于腺垂体激素的是【】

(A) 生长激素

(B) 甲状腺素

(C) 缩宫素

(D) 血管升压素

(E) 生长抑素

35、激素经血液循环被运行后作用于靶细胞的作用方式是（）

(A)远距分泌

(B)内在分泌

(C)自分泌

(D)旁分泌

(E)神经分泌

36、自身调节情况下对刺激产生反应的类型是【】

(A) 应激反应

(B) 旁分泌反应

(C) 自分泌反应

(D) 应急反应

(E) 适应性反应

37、下列监测值中不正确的是（）

(A)CVP的正常值为 5~12cmH₂O

(B)心排血量的正常值为 4~6L/min

(C)PCWP 的正常值为 6~15cmH₂O

(D)动脉血乳酸盐的正常值为 1~15mmol/L

(E)血 pH 的正常范围为 7.35~7.45

38、具有上行唤醒作用的神经结构被称为（）

(A)特殊感觉传入纤维

(B)本体感觉传入通路

(C)内脏感觉传入神经

(D)感觉的非特异性投射系统

39、胸膜下界的体表投影在腋中线相交于（）

(A)第 8 肋

(B)第 9 肋

(C)第 10 肋

(D)第 11 肋

40、提高心肌传导性的因素是 ()

(A)静息电位减小

(B)钠电流被阻断

(C)钠通道数量减少

(D)动作电位除极化速度增大

(E)阈电位水平抬高

二、多选题

41、男，57 岁。患心脏瓣膜病 10 年。查体：BP140/50~30mmHg，双侧桡动脉可触及水冲脉，主动脉瓣区可闻及舒张期叹气样杂音。还可能出现的体征有 ()

(A)Duroziez 双重杂音

(B)股动脉枪击音

(C)奇脉

(D)毛细血管搏动征

42、等渗性脱水的临床表现有 ()

(A)口渴

(B)乏力、少尿

(C)恶心、呕吐

(D)皮肤干燥

43、营养状态评定方法有 【】

(A) 氮平衡试验

(B) 人体测量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465010034201011340>