

# 2024 年北京市大兴区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题完整版往年题考

## 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 表现为"牛肉样舌"的疾病为

- A: 巨幼细胞性贫血
- B: 淋巴瘤
- C: 缺铁性贫血
- D: 再生障碍性贫血

答案：A

2. 容易引湿的药物是

- A: 青霉素类
- B: 阿扑吗啡
- C: 胃蛋白酶
- D: 牛痘菌苗

答案：C

3. 可能影 D 向儿童骨骼发育的药物是

- A: 诺氟沙星
- B: 阿莫西林
- C: 头孢克洛
- D: 华法林

答案：A

4. 下列药物中属于溶栓药物的是 ( )

- A: 利伐沙班
- B: 血凝酶
- C: 阿替普酶
- D: 华法林

**答案: C**

5. 较易导致肾损伤的药物是

- A: 布洛芬
- B: 酮康环孢素唑
- C: 比沙可啶
- D: 环孢素

**答案: A**

6. 患者，女，48 岁，因急性气管一支气管炎发作，出现“咳嗽、咳黄痰、喘息”症状就诊。患者无其他基础疾病，不应出现在患者用药处方中的是

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 氨溴索溶液
- C: 阿莫西林胶囊
- D: 美敏伪麻溶液

**答案: C**

7. 乙型肝炎的辅助治疗药物不包括

- A: 谷胱甘肽
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 维生素
- D: CB 维生素 D

**答案：D**

8. 阿昔洛韦可导致

- A: 肾间质纤维化
- B: 阻塞肾小管、肾小球
- C: 前列腺素合成障碍
- D: 肾小管坏死

**答案：B**

9. 有关血红蛋白的叙述正确的是

- A: 血红蛋白常被称为"血色素"，是组成血液的主要成分
- B: 血红蛋白减少是诊断贫血的重要指标，并能确定贫血的类型
- C: 缺铁性贫血时红细胞计数的减少程度较血红蛋白的减少程度明显
- D: 血红蛋白承担着机体向器官组织运输氧气和运出二氧化碳的功能

**答案：D**

10. 用药错误 I 级（9 级）的标准

- A: 差错导致患者永久性伤害
- B: 客观环境或条件可能引发差错
- C: 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用
- D: 差错导致患者死亡

**答案：D**

11. 指明其资料来源通过超链接指向其材料来源

- A: 合理性
- B: 权威性
- C: 归因性
- D: 新颖性

**答案：C**

12. 某女性，45 岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5 个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

- A: 2 型糖尿病
- B: 肥胖症
- C: 甲状腺功能亢进症
- D: 1 型糖尿病

**答案：A**

13. 患者，女，47 岁，出现一侧颜面部骤然发作性闪痛，诊断为三叉神经痛，应选用的药物是（）

- A: 麦角胺咖啡因
- B: 布洛芬
- C: 山莨菪碱
- D: 卡马西平

**答案：D**

14. 抑制细胞色素氧化酶损害中枢神经系统的是

- A: 氯化钠
- B: 磷化氢
- C: 氯化锌
- D: 磷化锌

**答案：B**

15. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂（他汀类）所致药源性损伤为

- A: 肺损害
- B: 肝损害

C: 胃肠系统损害

D: 肾损害

**答案: B**

16. 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是

A: 乙酰唑胺

B: 氢氯噻嗪

C: 依他尼酸

D: 布美他尼

**答案: C**

17. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 糖皮质激素

B: 阿司匹林

C: 抗菌药物

D: 布洛芬

**答案: A**

18. 患者，男，57 岁，患有冠心病、抑郁症、2 型糖尿病，用药包括二甲双胍、阿托伐他汀、圣约翰草提取物、阿卡波糖、阿司匹林。近日患者在家人陪同下去郊区旅游，日晒后暴露部位的皮肤出现红斑、丘疹，伴灼热、痒痛感，疑与用药有关。最可能引起该过敏反应的药物是

A: 阿托伐他汀

B: 圣约翰草提取物

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

**答案：B**

19. 引起急性细菌性扁桃体炎最常见的致病菌是

- A: 肺炎链球菌
- B: A 组  $\beta$  溶血性链球菌（化脓性链球菌）
- C: 金黄色葡萄球菌
- D: 大肠埃希菌

**答案：B**

20. （2019 年真题）患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温  $39.1^{\circ}\text{C}$ ，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数  $11.2 \times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 肺炎链球菌
- B: 支原体
- C: 衣原体
- D: 铜绿假单胞菌

**答案：D**

21. 关于现代药学的发展，以药品供应为中心阶段的特征是

- A: 以促进合理用药为主
- B: 以药品工业化生产为中心
- C: 以新药研制为中心
- D: 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作

**答案：D**

22. （2017 年真题）下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是（）

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗
- B: 老年人和酗酒者为高危人群
- C: 可静脉滴注维生素 B<sub>12</sub>100~500 μg
- D: 恶性贫血者需要终生维持治疗

**答案：C**

23. 避免用于儿童退热，可能引起 Reye's 综合征的药物是

- A: 塞来昔布
- B: 布洛芬
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

**答案：C**

24. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 药动学相互作用
- B: 药物的使用
- C: 药物制剂因素
- D: 药理作用

**答案：C**

25. 异烟肼+维生素 B<sub>6</sub> 治疗结核病属于

- A: 治疗多种疾病
- B: 减少药物不良反应
- C: 延缓细菌耐药性的产生
- D: 提高药物疗效

**答案：B**

26. 原发性蛛网膜下腔出血的常见病因为()

- A: 动脉炎
- B: 高血压性动脉硬化
- C: 脑血管畸形
- D: 颅内动脉瘤

**答案：D**

27. 患者，男，28 岁，主诉：发作性四肢抽搐 2 年，加重 2 月，化验结果显示 TSH 增高，FT<sub>3</sub>，FT<sub>4</sub> 减低，临床诊断为甲状腺功能减退，欲使用左甲状腺素钠治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是

- A: 100mg，qd，晚餐后顿服
- B: 100mg，qd，睡前顿服
- C: 100 μg，qd，早餐后半小时，顿服
- D: 100 μg，qd，早餐前半小时，顿服

**答案：D**

28. 处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A: 用法、用量或联合用药不适宜
- B: 无适应证用药
- C: 未使用药品规范名称
- D: 有配伍禁忌

**答案：C**

29. 庆大霉素可引起

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 听神经障碍
- B: 癫痫发作
- C: 再生障碍性贫血
- D: 锥体外系反应

**答案：A**

30. 主要检查性状一致、色泽均匀、片面光滑、无毛糙起孔现象的是

- A: 胶囊剂
- B: 软膏剂
- C: 片剂
- D: 糖浆剂

**答案：C**

31. 处方中“餐后给药”的外文缩写是

- A: po
- B: pc
- C: qn
- D: Ac

**答案：B**

32. 治疗高血压伴稳定性心绞痛何种药物为宜

- A:  $\beta$ -受体阻滞剂
- B: 甲基多巴
- C: 利血平
- D: 硝苯地平

**答案：A**

33. 常用抗消化性溃疡药的合理应用应于早餐前 30 分钟服用的是 ( )

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: 瑞巴派特
- B: 吉法酯
- C: 替普瑞酮
- D: 质子泵抑制剂

**答案：D**

34. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力。正确妥善地应对投诉的重要意义是

- A: 警惕与防范用药错误
- B: 提高用药顺应性
- C: 增进患者对药师工作的信任
- D: 使患者获得有关用药的指导

**答案：C**

35. (2018 年真题) 射击运动员使用后, 可减慢心率, 减少心肌耗氧量, 消除比赛前紧张心理, 因此被列入兴奋剂管理的药物是 ( )

- A: 呋塞米
- B: 缬沙坦
- C: 硝苯地平
- D: 普萘洛尔

**答案：D**

36. 用于胆囊炎患者控制感染症状的药物是

- A: 头孢曲松与甲硝唑联用
- B: 脂肪乳
- C: 复方阿嗪米特
- D: 匹维溴铵

**答案：A**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

37. 癌症患者化疗出现腹泻合并中性粒细胞核左移时，需给予的预防性治疗药物是

- A: 药用炭
- B: 莫沙必利
- C: 广谱抗生素
- D: 洛哌丁胺

**答案：C**

38. 有关药学服务的“基本要素”，以下说法最正确的是

- A: 提供药学专业知识
- B: 提供药物信息和知识
- C: 为公众服务
- D: “与药物有关”的服务

**答案：D**

39. 可卡因属于

- A: 麻醉药品
- B:  $\beta$  受体阻断剂
- C: 利尿剂
- D: 精神刺激剂

**答案：D**

40. 以下咨询问题的分类属于药品名称的是

- A: 这药能治我这种病吗
- B: 中午忘吃药了怎么办
- C: 这种药需要服用多久
- D: 这次拿的“×××”(商品名)是我以前一直服用的“格列齐特”吗

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

**答案：D**

41. 新生儿应用氯霉素可引起

- A: 灰婴综合征
- B: 高胆红素血症
- C: 核黄疸
- D: 新生儿溶血

**答案：A**

42. 饮酒可使其代谢加快、药效减弱的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 维生素 B
- C: 利血平
- D: 卡马西平

**答案：A**

43. 归属公共网络资源的是

- A: [www.merck.com](http://www.merck.com)
- B: [www.cmt.com.cn](http://www.cmt.com.cn)
- C: [www.google.com](http://www.google.com)
- D: [www.ashp.org](http://www.ashp.org)

**答案：C**

44. 不宜与茶叶合用的药物是

- A: 左旋多巴
- B: 磺胺类药物
- C: 辛伐他汀
- D: 硫酸亚铁

**答案：D**

45. (2019 年真题) 患者，女，29 岁，孕 29+6 周，血压 160/100mmHg，尿蛋白(-)，该患者降压药应选用

- A: 甲基多巴
- B: 氨氯地平
- C: 厄贝沙坦
- D: 卡托普利

**答案：A**

46. 中成药舒肝丸具有舒肝和胃、理气止痛的功效，与其合用会导致作用相反、降低药效的药物是

- A: 氯苯那敏
- B: 复方利血平
- C: 地高辛
- D: 甲氧氯普胺

**答案：D**

47. (2016 年真题) 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是 ( )。

- A: 纳洛酮
- B: 乙酰胺
- C: 氟马西尼
- D: 青霉胺

**答案：D**

48. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

- A: 阿卡波糖

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- B: 氨氯地平
- C: 氯吡格雷
- D: 二甲双胍

**答案: C**

49. 非杓型高血压患者的合理给药时间是

- A: 清晨给药
- B: 早、晚给药
- C: 一日三餐后给药
- D: 睡前给药

**答案: D**

50. 苯妥英、地塞米松、地西洋在妊娠 26~29 周时游离药物浓度达高峰，是由于

- A: 胃肠活动程度减弱，使吸收减慢
- B: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多
- C: 妊娠期药物分布容积明显增加
- D: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低

**答案: D**

51. 和缓医疗总的原则不包括（）

- A: 不伤害
- B: 无痛苦
- C: 有益
- D: 尊重

**答案: B**

52. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A:  $\beta$  受体阻断剂
- B: 利尿剂
- C: 钙通道阻断剂
- D: 精神刺激剂

**答案：C**

53. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差（）

- A: 右旋糖酐铁（2 价铁）
- B: 乳酸亚铁（2 价铁）
- C: 琥珀酸亚铁（2 价铁）
- D: 枸橼酸铁（3 价铁）

**答案：D**

54. 应将该药倒入 50ml 温水中充分稀释，摇匀服用，可用于 IBS 患者止泻的药物是

- A: 环孢素 A
- B: 地芬诺酯
- C: 蒙脱石散
- D: 匹维溴铵

**答案：C**

55. （2016 年真题）患者接受顺铂化疗时，药师应重点监测的不良反是（）。

- A: 心脏毒性
- B: 肝脏毒性
- C: 肾脏毒性
- D: 肺纤维化

**答案：C**

56. 患者，男，72 岁，因“冠心病、高血压、2 型糖尿病”长期用药治疗，服用药物包括阿司匹林肠溶片、马来酸依那普利片、辛伐他汀片、富马酸比索洛尔片、盐酸二甲双胍缓释片、格列美脲片、硝酸甘油片。近日患者出现一些药物不良反应症状，前来药店咨询药师。

- A: 盐酸二甲双胍
- B: 马来酸依那普利
- C: 富马酸比索洛尔
- D: 阿司匹林

**答案：B**

57. 慢性功能性便秘

- A: 开塞露
- B: 乳果糖
- C: 比沙可啶
- D: 羧甲基纤维素钠

**答案：B**

58. 某女性，19 岁，2 年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血 T

- A: 单纯性甲状腺肿
- B: 亚急性甲状腺炎
- C: 甲状腺功能减退
- D: 甲状腺功能亢进

**答案：D**

59. 高血压伴痛风患者慎用的药物是（）

- A: 氢氯噻嗪

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- B: 硝苯地平
- C: 卡托普利
- D: 普萘洛尔

**答案：A**

60. (2017 年真题) 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

- A: 维生素 B6 缺乏
- B: 维生素 B12 缺乏
- C: 维生素 A 缺乏
- D: 维生素 B2 缺乏

**答案：B**

61. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- B: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西洋，其药理效应增强
- C: 慢乙酰化者服用异烟肼后，其半衰期延长至 2~4.5h
- D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

**答案：A**

62. 患者，女，26 岁，临床诊断为“甲状腺功能亢进症”，给予丙硫氧嘧啶 450mg / d 治疗，应嘱咐患者定期复查以下哪项指标

- A: 红细胞

B: 嗜酸粒细胞

C: 白细胞

D: 血红蛋白

**答案: C**

63. 由于药物的利尿作用，服用后需要大量饮水以防止脱水的是

A: 氨茶碱

B: 依替膦酸二钠

C: 莫西沙星

D: 苯溴马隆

**答案: A**

64. 甲巯咪唑的初治剂量是一日

A: 5~15mg

B: 15~60mg

C: 25~80mg

D: 30~60mg

**答案: D**

65. 左旋多巴的禁用范围是

A: 3 岁以下幼儿

B: 12 岁以下儿童

C: 1 岁以下婴儿

D: 8 岁以下儿童

**答案: A**

66. 维生素 D3 用于

A: 防治夜盲症

- B: 防治坏血病
- C: 习惯性流产的辅助治疗
- D: 防治佝偻病

**答案：D**

67. 属于核苷酸类逆转录酶抑制剂的抗 HIV 药物是

- A: 利托那韦
- B: 替诺福韦
- C: 阿德福韦
- D: 拉替拉韦

**答案：B**

68. 下列药源性疾病中，其诱因主要是"性别因素"的是

- A: 灰婴综合征是氯霉素在新生儿体内蓄积所致
- B: 老年人应用普萘洛尔可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应
- C: 口服避孕药致阿米替林清除率下降
- D: 羟化酶缺乏者服用一半剂量的苯妥英钠呈现引起神经毒性

**答案：C**

69. 甲状旁腺素制剂属于

- A: 激素替代剂
- B: 骨形成刺激剂
- C: 促进骨矿化剂
- D: 骨吸收抑制剂

**答案：B**

70. 患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素 (TSH)  $< 0.1 \text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是 ()

- A: 碘化钾治疗，定期复查
- B: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗
- C: 选用  $^{131}\text{I}$  治疗
- D: 甲状腺次全切除手术

**答案：B**

71. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 肝脏
- B: 肾脏
- C: 肺
- D: 胃肠系统

**答案：A**

72. 能使人长时间忍受肌肉等疼痛

- A: 利尿剂
- B: 肽激素类
- C: 麻醉药品
- D: 蛋白同化制剂

**答案：C**

73. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 硝苯地平

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 多索茶碱

C: 西地兰

D: 硝普钠

**答案: C**

74. 根据英国 Cochrane 中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准，同质病例对照研究的系统评价在循证医学评价中的证据级别属于

A: IIIa 级

B: V 级

C: I a 级

D: II a 级

**答案: A**

75. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/mr，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

A: 加巴喷丁胶囊

B: 吗啡控释片

C: 颠茄片

D: 双氯芬酸钠缓释片

**答案: D**

76. 消化不良患者宜选用

A: 乳果糖

B: 干酵母

C: 小檗碱

D: 阿苯达唑

**答案：B**

77. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高 160cm，体重 70kg。实验室检查：白细胞  $8.0 \times 10^9 / L$ ，红细胞  $4.0 \times 10^{12} / L$ ，总胆红素  $11 \mu mol / L$ ，总胆固醇  $6.0 mmol / L$ ，空腹血糖  $7.6 mmol / L$ 。

- A: 糖尿病
- B: 高脂血症
- C: 肝炎
- D: 感染性疾病

**答案：A**

78. 下列药物属于容积性泻药的是

- A: 乳果糖
- B: 欧车前
- C: 聚乙二醇
- D: 多库酯

**答案：B**

79. 治疗头痛的非处方药应首选

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 布洛芬
- C: 谷维素
- D: 阿司匹林

**答案：A**

80. 处方常见的外文缩写中“生理盐水”的英文缩写是

- A: OU

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: Aa

C: OL

D: NS

**答案: D**

81. H

A: 法莫替丁

B: 铝碳酸镁

C: 多潘立酮

D: 埃索美拉唑

**答案: A**

82. 亚硝酸盐中毒解救药物

A: 氯磷定

B: 亚甲蓝

C: 纳洛酮

D: 青霉胺

**答案: B**

83. 应用抗生素头孢哌酮时宜

A: 少食醋

B: 不吸烟

C: 少食盐

D: 不饮酒

**答案: D**

84. 患者，女，28 岁，妊娠 6 个月，出现轻度外阴烧灼感、尿痛、尿急，就医后确诊为滴虫性阴道炎合并尿路感染，首选用药方案是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 咪康唑栓，阴道给药，每晚 1 粒（200mg），连用 7 日
- B: 口服甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日
- C: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日
- D: 1: 2 服克林霉素 300mg，每日 2 次，连用 7 日

**答案：B**

85. 黄体酮用于输尿管结石

- A: 无适应证用药
- B: 超适应证用药
- C: 盲目联合用药
- D: 过度治疗用药

**答案：B**

86. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50 $\mu$ mol / L(正常参考区间 45~84 $\mu$ mol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 不必限盐
- B: 适当运动
- C: 控制体重
- D: 减少脂肪摄入

**答案：A**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

87. 可有效治疗功能性消化不良的药物是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/465113212123012033>