北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿骨科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：腰椎间盘突出常见的临床症状是（　）。A.腰僵硬

B.腰部活动受限

C.双下肢发紫

D.腰痛伴坐骨神经痛

E.大小便失禁

2、单项选择题：关于原发性脊柱侧凸，下列哪项是错误的（　）。A.占脊柱侧凸畸形的80%

B.多发生于儿童及青少年，女性较多见

C.多发生在胸段或胸腰段，脊柱多凸向右侧

D.在原发性曲度上下可发生代偿性次发曲度

E.脊柱除侧凸外，不伴有纵轴旋转

3、单项选择题：有关髋臼的构成，以下正确的是（　）。A.由髂骨、坐骨及耻骨共同构成

B.由髂骨及耻骨共同构成

C.由坐骨及耻骨共同构成

D.由髂骨与坐骨共同构成

E.仅有髂骨参与构成

4、单项选择题：22岁男患，运动中摔倒，诉左髋痛，检查左髋部叩痛，患肢无外旋畸形，X线片示左股骨颈中段骨折，患侧股骨颈略短，Pauwels角60°，侧位片远折端无移位。本例为下列哪种类型（　）。A.左股骨颈，经颈内收型骨折

B.左股骨颈，经颈外展型骨折

C.左股骨颈，无移位完全型骨折

D.左股骨颈经颈内收、嵌插型骨折

E.左股骨颈中段不完全内收型骨折

5、单项选择题：高处坠落致脊髓损伤的患者，来院后哪项检查最能准确地确定脊髓损伤平面（　）。A.检查感觉平面

B.检查肢体的运动

C.检查肢体的温度

D.MRI检查

E.X线平片

6、单项选择题：股骨颈骨折可能发生（　）。A.动静脉损伤

B.缺血性肌挛缩

C.损伤性骨化

D.缺血性骨坏死

E.周围神经损伤

7、单项选择题：12岁男孩，跌跤后当晚自觉全身不适，发热，左膝部疼痛，经青霉素治疗3日无效来院。检查左股骨下端肿胀，有局限性压痛，膝关节内少量积液，活动障碍，体温39．5℃，白细胞计数18×109／L，中性90%，血沉80mm／h。进一步治疗中，下列哪项是最关键的（　）。A.联合应用大剂量的抗生素

B.患肢制动

C.全身支持治疗，注意水、电解质平衡

D.局部减压引流

E.避免外伤骨折

8、单项选择题：肱骨闭合性骨折出现桡神经损伤症状的处理原则是（　）。A.给予大剂量神经营养药物

B.立即手术探查

C.处理骨折后观察2～3个月

D.先手术吻合神经再处理骨折

E.物理疗法

9、单项选择题：人工髋关节置换时，髋臼前倾角应为（　）。A.40～50

B.大于60

C.小于40

D.40～60

E.10～15

10、单项选择题：化脓性膝关节炎的早期诊断中，最有价值的方法是（　）。A.关节肿胀与压痛

B.浮髌试验阳性

C.X线摄片检查

D.关节液检查

E.CT检查

11、单项选择题：X线片上成人的椎体结核和椎体肿瘤的主要鉴别点是（　）。A.椎体的破坏程度

B.是否有死骨形成

C.椎旁软组织阴影

D.椎间隙是否狭窄或消失

E.椎体骨质疏松的程度

12、单项选择题：儿童股骨干骨折复位标准中不允许的是（　）。A.对位为0%

B.成角15

C.重叠缩短2cm

D.旋转15

E.以上都不允许

13、单项选择题：下述哪项检查为阳性结果即可确诊新生儿的先天性髋脱位（　）。A.Barlow试验阳性

B.Ortolani试验阳性

C.Allis征阳性

D.Telescoping征阳性

E.Trendelenburg征阳性

14、单项选择题：骨折的血管并发症方面，下列哪一项不对（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/466040104021010123