

甘肃省西固区内部使用《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题真题题库及参考答案（培优 A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 双香豆素与维生素 K

- A: 与其竞争结合血浆蛋白
- B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- C: 竞争性对抗
- D: 产生协同作用

答案：C

2. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用()

- A: 2%过氧化氮溶液
- B: 3%过氧化氢溶液
- C: 2%酚甘油滴耳液
- D: 3%酚甘油滴耳液

答案：B

3. 葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

- A: 高钠血症
- B: 低钾血症
- C: 低钠血症
- D: 高钾血症

答案：D

4. 关于维生素用药时间的说法正确的是

- A: 水溶性维生素应该在餐后服用，脂溶性维生素应该在餐中服用
- B: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐前服用
- C: 水溶性维生素应该在餐前服用，脂溶性维生素应该在餐后服用
- D: 水溶性维生素和脂溶性维生素都应该在餐后服用

答案：A

5. 有性激素样副作用的是()

- A: 氨苯蝶啶
- B: 呋塞米
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：D

6. (2017 年真题) 长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是 ()

- A: 颅内压升高
- B: 血栓性静脉炎
- C: 高胆红素血症
- D: 高钙血症

答案：D

7. 紧急降低眼压首选的药物是

- A: 拟 M 胆碱药
- B: 20%甘露醇
- C: 碳酸酐酶抑制剂
- D: β -受体阻断剂

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

8. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

- A: 甲巯咪唑
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 普萘洛尔
- D: 碳酸锂

答案：A

9. 可影响胞浆膜通透性，引起细胞内重要物质外漏的药物是

- A: 多黏菌素
- B: 环丙沙星
- C: 特比萘芬
- D: 庆大霉素

答案：A

10. (2021 年真题) 可致超敏反应综合征(AHS)，推荐用药前做 HLA-B*5801 基因筛查的抗痛风药物是 ()

- A: 非布司他
- B: 苯溴马隆
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：D

11. 可掩盖顺铂所致的耳鸣、眩晕等症状的药物是

- A: 丙磺舒

- B: 甲氨蝶呤
- C: 苯海拉明
- D: 呋塞米

答案：C

12. 用于肝病的氨基酸制剂的是

- A: 复方氨基酸注射液（18AA）
- B: 复方氨基酸注射液（9AA）
- C: 赖氨酸注射液
- D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案：D

13. 有机磷酸酯中毒的解救宜选用

- A: 胆碱酯酶复活药
- B: 阿托品
- C: 阿托品+新斯的明
- D: 足量阿托品+胆碱酯酶复活药

答案：D

14. 以下抗心律失常药中，对光过敏的是

- A: 利多卡因
- B: 奎尼丁
- C: 普萘洛尔
- D: 胺碘酮

答案：D

15. （2016 年真题）组胺 H₂ 受体阻断的抑酸作用强度比较，正确的是

- A: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁
- C: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁
- D: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁

答案：B

16. 次水杨酸铋是

- A: 抗分泌药
- B: 抗动力药
- C: 吸附剂
- D: 微生态制剂

答案：A

17. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌或对 β -内酰胺类抗菌药物过敏的严重感染的抗生素为()

- A: 哌拉西林
- B: 万古霉素
- C: 阿莫西林
- D: 氨曲南

答案：B

18. 主要作用是抗部分革兰阴性杆菌和抗革兰阳性菌的青霉素是

- A: 替莫西林
- B: 哌拉西林
- C: 甲氧西林
- D: 阿莫西林

答案：D

19. (2018 年真题) 酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是 ()

- A: 痤疮样皮疹
- B: 血压升高
- C: 心肌损伤
- D: 骨髓抑制

答案: A

20. 有促进骨骼致密作用，可用于绝经期妇女治疗骨质疏松的药物是

- A: 长效避孕药
- B: 孕激素
- C: 雌激素
- D: 短效口服避孕药

答案: C

21. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

- A: 克林霉素
- B: 克拉霉素
- C: 万古霉素
- D: 红霉素

答案: B

22. 对耐药金黄色葡萄球菌感染有效的 β -内酰胺类抗生素是 ()

- A: 喹诺酮类
- B: 苯唑西林
- C: 甲硝唑
- D: 四环素

答案: B

23. 下列不属于凝血因子 X 抑制剂的是

- A: 阿哌沙班
- B: 华法林
- C: 利伐沙班
- D: 磺达肝癸钠

答案：B

24. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时, 接听病房咨询电话, 得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者, 出现高热、肺纹加重, 患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 15mg/kg
- B: 40mg/kg
- C: 5mg/kg
- D: 60mg/kg

答案：B

25. 多柔比星

- A: 干扰 RNA 转录
- B: 影响蛋白质合成和功能
- C: 干扰核酸生物合成
- D: 直接破坏 DNA 结构和功能

答案：A

26. 属于抗雌激素类的是()

- A: 睾酮
- B: 甲地孕酮
- C: 己烯雌酚

D: 他莫昔芬

答案: D

27. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A: 他莫昔芬

B: 红霉素

C: 氯丙嗪

D: 维生素 C

答案: A

28. 复方左炔诺孕酮片、去氧孕烯炔雌醇片、复方孕二烯酮片均含有的成分是

A: 去氧孕烯

B: 维生素 B6

C: 炔雌醇

D: 甲羟孕酮和炔雌醇

答案: C

29. 磺酰脲类降糖药的作用机制是

A: 加速胰岛素合成

B: 抑制胰岛素降解

C: 提高胰岛 β 细胞功能

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案: D

30. 预防和治疗各种原因引起的肝性脑病使用

A: 复方氨基酸 (18AA-I)

B: 复方氨基酸注射液 (3AA)

C: 复方氨基酸注射液 (9AA)

D: 苯丙氨酸

答案: B

31. 与核糖体 30S 亚基结合，阻止氨基酰 tR-NA 进入 A 位的抗菌药是

A: 四环素

B: 氯霉素

C: 万古霉素

D: 青霉素

答案: A

32. ACTH 的血浆浓度波动大，变化也很快，这是因为它是从垂体中以脉冲方式释放出来，在血液循环中的半衰期是

A: 8 小时

B: 10~25 分钟

C: 4 小时

D: 7~12 分钟

答案: D

33. 氨基苷类抗生素的抗菌机制是

A: 影响胞浆膜的通透性

B: 抑制蛋白质合成的全过程

C: 抑制细菌细胞壁的合成

D: 影响叶酸代谢

答案: B

34. () 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

A: 万古霉素

B: 克林霉素

C: 克拉霉素

D: 红霉素

答案：A

35. 外耳道红肿局部治疗可选用 ()

A: 赛洛唑啉

B: 3%硼酸乙醇

C: 2%酚甘油

D: 伪麻黄碱

答案：C

36. 属于 DNA 多聚酶抑制剂的是

A: 巯嘌呤

B: 长春瑞滨

C: 吉西他滨

D: 甲氨蝶呤

答案：C

37. 关于多柔比星治疗时使用右雷佐生的叙述，不正确的是

A: 右雷佐生水解后能与多柔比星螯合

B: 使用右雷佐生的目的是保护心肌

C: 右雷佐生剂量应为多柔比星剂量的 10 倍

D: 与多柔比星同时给药

答案：D

38. 用药后可使尿液呈橘红色的药物是

A: 链霉素

B: 乙胺丁醇

C: 异烟肼

D: 利福平

答案：D

39. (2021 年真题) 对角鲨烯环氧酶有非竞争性和可逆性抑制作用，属于丙烯胺类的抗真菌药物 ()

A: 克霉唑

B: 米卡芬净

C: 环吡酮胺

D: 特比萘芬

答案：D

40. 属于头孢一代的是

A: 拉氧头孢

B: 头孢唑林

C: 头孢曲松

D: 头孢呋辛

答案：B

41. 甲状腺素的合成需要 ()

A: 环氧化酶

B: 碳酸酐酶

C: 蛋白水解酶

D: 过氧化物酶

答案：D

42. 肝功能减退患者可按原治疗量应用而肾功能减退患者需减量使用的是

- A: 异烟肼
- B: 氟胞嘧啶
- C: 青霉素
- D: 红霉素

答案：C

43. 是 β -内酰胺酶抑制剂，常与青霉素组成复方制剂的是()

- A: 克拉维酸
- B: 氨曲南
- C: 他唑巴坦
- D: 美罗培南

答案：A

44. 属于 M 受体阻断剂的药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 阿托品
- C: 拉坦前列素
- D: 奥布卡因

答案：B

45. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向可选用

- A: 维生素 K1
- B: 低分子肝素
- C: 尿激酶
- D: 氨甲环酸

答案：A

46. 放线菌素 D 的主要作用环节在

- A: S 期
- B: G0 期
- C: G1 期
- D: M 期

答案：C

47. 弥散性血管内凝血症的晚期可选用

- A: 氨甲环酸
- B: 低分子肝素
- C: 维生素 K
- D: 尿激酶

答案：A

48. 可分解出新生态氧，杀菌除臭()

- A: 异维 A 酸
- B: 阿达帕林
- C: 维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案：D

49. 应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 四环素
- C: 多西环素
- D: 青霉素

答案：C

50. (2021 年真题) 患者，男，46 岁。新诊断为高血压，最高血压 155/95mmHg，心率 100 次 1 分，交感神经兴奋性明显增高，首选的治疗药物是 ()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 硝酸甘油
- C: 氯沙坦
- D: 美托洛尔

答案: D

51. 氯霉素的抗菌作用机制 ()

- A: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成
- B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- C: 作用于细菌 70S 核糖体的 50S 亚基，抑制转肽酶
- D: 影响胞浆膜通透性

答案: C

52. 属于抗雌激素类的是 ()

- A: 甲羟孕酮
- B: 己烯雌酚
- C: 他莫昔芬
- D: 睾酮

答案: C

53. 下列关于眼部细菌感染说法错误的是 ()

- A: 局部给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法
- B: 眼科术后引起细菌性眼内炎，可向眼内注射万古霉素
- C: 急性期或严重的衣原体感染可口服阿奇霉素治疗

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 淋球菌性结膜炎采用眼局部抗菌药物治疗即可

答案：D

54. 连续使用应间隔 4h 以上

A: 赛洛唑啉

B: 羟甲唑啉

C: 酚甘油滴耳液

D: 麻黄碱

答案：B

55. 可用于治疗厌氧菌感染和阴道滴虫病的药物是()

A: 喹诺酮类

B: 甲硝唑

C: 四环素

D: 苯唑西林

答案：B

56. (2020 年真题) 患者，男，60 岁。入院诊断为：高胆固醇血症、支原体肺炎。医师拟选用克拉霉素治疗支原体肺炎，同时需进行调血脂治疗，不宜与克拉霉素合用的调血脂药是

A: 依折麦布

B: 非诺贝特

C: 氟伐他汀

D: 辛伐他汀

答案：D

57. 铵属于 M 胆碱受体阻断剂的是

A: 孟鲁司特

- B: 福莫特罗
- C: 乙酰胆碱
- D: 异丙托溴

答案：D

58. 常用的外用痤疮治疗药不包括

- A: 过氧苯甲酰
- B: 阿达帕林
- C: 维 A 酸
- D: 特比萘芬

答案：D

59. 不属于口服避孕药所致不良反应的是()。

- A: 增加血栓栓塞性疾病风险
- B: 月经失调
- C: 突破性出血
- D: 低钙血症

答案：D

60. 肝素抗凝血治疗引起的自发性出血，宜用的抢救药物是

- A: 氨甲环酸
- B: 维生素 K
- C: 氨甲苯酸
- D: 鱼精蛋白

答案：D

61. 属于阴道局部用药的是

- A: 环磷酰胺

- B: 阿霉素
- C: 聚甲酚磺醛
- D: 地屈孕酮

答案：C

62. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 预防低血镁
- B: 预防低血钠
- C: 预防耳毒性
- D: 预防低血钾

答案：D

63. 主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮

- A: 苯妥英钠
- B: 加巴喷丁
- C: 苯巴比妥
- D: 卡马西平

答案：D

64. 普萘洛尔

- A: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成
- B: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- C: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- D: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

答案：D

65. 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是

- A: 甲状腺片
- B: 卡比马唑片
- C: 复方碘口服液
- D: 甲巯咪唑片

答案：D

66. 以下不属于抗雌激素类药物的是

- A: 来曲唑
- B: 他莫昔芬
- C: 氟他胺
- D: 托瑞米芬

答案：C

67. (2017 年真题) 治疗青光眼宜选用 ()

- A: 氯霉素滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 碘苷滴眼剂

答案：B

68. 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是 ()。

- A: 头孢曲松
- B: 罗红霉素
- C: 头孢他啶
- D: 利奈唑胺

答案：B

69. 长春碱使细胞有丝分裂停止于

- A: S 期
- B: M 期
- C: G1 期
- D: G0 期

答案：B

70. 普芦卡必利为泻药的作用机制是

- A: 在消化道不被吸收，在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用
- B: 通过激活 CFTR（囊性纤维化跨膜传导调节因子），细胞内 cGMP 可增加小肠腔内氯化物和碳酸氢盐的分泌量，最终使小肠液分泌增多和结肠转运速度增快
- C: 一种阴离子表面活性剂，口服后基本不吸收，在肠道内促进水和脂肪类物质浸入粪便，通过物理性润滑肠道排便
- D: 选择性、高亲和力的 5-HT₄ 受体激动剂，可通过 5-HT₄ 受体激活作用来增强胃肠道中蠕动反射和推进运动模式，具有促肠动力活性

答案：D

71. 作用机制是抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的药物是

- A: 异烟肼
- B: 红霉素
- C: 阿莫西林
- D: 氧氟沙星

答案：D

72. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物是()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 利多卡因
- B: 苯妥英钠
- C: 地高辛
- D: 胺碘酮

答案：B

73. 属于血小板糖蛋白 GP II b / IIIa 受体阻断剂的是

- A: 双嘧达莫
- B: 阿司匹林
- C: 替罗非班
- D: 替格瑞洛

答案：C

74. 华法林应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 氨基己酸
- B: 维生素 K
- C: 鱼精蛋白
- D: 葡萄糖酸钙

答案：B

75. 铂类化合物

- A: 环磷酰胺
- B: 喜树碱类
- C: 顺铂
- D: 丝裂霉素

答案：C

76. 地高辛最适合用于()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 心力衰竭伴有快速心室率的心房颤动的心功能不全
- B: 急性心力衰竭
- C: 心律失常
- D: 肺源性心脏病

答案：A

77. 环孢素合用可使赛洛多辛血药浓度升高，这是因为环孢素抑制

- A: UGT287
- B: CYP3A4
- C: p-糖蛋白
- D: 血浆蛋白

答案：C

78. 具有双向作用，小剂时抑制骨吸收，大剂量时抑制骨形成的药物是
()

- A: 氯屈膦酸二钠
- B: 帕米膦酸二钠
- C: 依替膦酸二钠
- D: 阿仑膦酸钠

答案：C

79. 与 50S 亚基结合，阻断转肽作用的药物是

- A: 甲氧苄啶
- B: 红霉素
- C: 青霉素
- D: 磺胺甲

答案：B

80. 糖皮质激素用于中毒性感染及各种休克宜选择的给药方法是

- A: 小剂量替代疗法
- B: 隔日一次给药法
- C: 大剂量冲击疗法
- D: 一般剂量长期疗法

答案：C

81. 与 α_1 受体阻断剂无相互作用的药物是

- A: 卡马西平
- B: 地尔硫
- C: 第三代头孢菌素
- D: 西咪替丁

答案：C

82. 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是()

- A: 头孢他啶
- B: 头孢米诺
- C: 头孢唑林
- D: 头孢呋辛

答案：B

83. 对 G

- A: 第四代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：A

84. 常引起外周神经炎的抗肿瘤药是

- A: 长春新碱
- B: 甲氨蝶呤
- C: 巯嘌呤
- D: 氟尿嘧啶

答案：A

85. 属于孕激素类的是()

- A: 己烯雌酚
- B: 他莫昔芬
- C: 睾酮
- D: 甲羟孕酮

答案：D

86. 甲氧苄啶联用华法林使

- A: 白细胞减少风险增加
- B: 肾毒性增加
- C: 半衰期缩短
- D: 抗凝作用增强

答案：D

87. 甲氨蝶呤主要用于

- A: 室管膜瘤
- B: 儿童急性白血病
- C: 慢性粒细胞性白血病
- D: 神经母细胞瘤

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/466055215000011032>