

2023 年山西中医助理医师考试模拟卷（5）

本卷共分为 1 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100 分，60 分及格。

一、单项选择题（共 50 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 男性，65 岁。因椎-基底动脉系统血栓形成入院，其临床表现中哪项不应出现

- A. 多个脑神经麻痹
- B. 运动性失语
- C. 交叉性感觉障碍
- D. 眩晕
- E. 交叉性瘫痪

2. 脊髓病变引起的肢体瘫痪不大可能发生

- A. 四肢痉挛性瘫痪
- B. 双下肢痉挛性瘫痪，双上肢弛缓性瘫痪
- C. 一侧上下肢痉挛性瘫痪
- D. 双下肢痉挛性瘫痪
- E. 一侧上肢痉挛性瘫痪

3. 左侧角膜直接反射消失，间接反射存在，病变在

- A. 右侧三叉神经
- B. 右侧面神经
- C. 左侧视神经
- D. 左侧三叉神经
- E. 右侧动眼神经

4. 男性，60岁，干部。突然右侧肢体活动不灵，历时10分钟缓解。次日晨起出现右侧偏瘫。病后3日来诊。BP：20/12kPa(150/90mmHg)，为确诊首选的检查是

- A. 脑超声
- B. 腰椎穿刺
- C. CT脑扫描
- D. 脑血流量
- E. 脑电图

5. 膝腱反射的反射中枢在

- A. 腰髓2~4
- B. 骶髓2~4
- C. 胸髓12~腰髓1
- D. 腰髓5—骶髓1

E. 胸髓 10~11

6. 男性，30 岁，一日同学聚会后大量饮酒，次日晨起时发现四肢无力，不能行走。查体：脑神经正常，四肢对称性弛缓性瘫痪，无感觉障碍，肱二头肌、肱三头肌及膝腱反射消失。

为明确诊断，最重要的实验室检查是

- A. 测血钾
- B. 测空腹血糖
- C. 脑电图描记
- D. 做头部 CT 扫描
- E. 查脑脊液

7. 男性，37 岁，急性四肢弛缓性瘫痪伴四肢末端可疑对称性痛觉减退 2 周。下列哪项检查无助于诊断及鉴别诊断

- A. 肌电图
- B. 血清皮质醇及尿 17-羟检查
- C. 血清肌酶检查
- D. 腰椎穿刺检查脑脊液
- E. 血清钾检查

8. 重症脑出血，在内科治疗中首选的治疗原则是

- A. 给予苏醒剂

- B. 预防休克
- C. 应用脱水剂
- D. 立即输血
- E. 控制血肿感染

9. 女性，22岁，双眼睑下垂，伴复视和吞咽费力1年，休息后好转。诊为重症肌无力，下列哪种药物不能应用

- A. 肾上腺皮质激素
- B. 硫唑嘌呤
- C. 氯丙嗪
- D. 抗胆碱酯酶剂
- E. 免疫球蛋白

10. 最常与重症肌无力同时存在的疾病有

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 多发性肌炎
- C. 胸腺肿瘤或胸腺增殖
- D. 甲状腺炎
- E. 系统性红斑狼疮

11. 一患者右侧肢体瘫痪，肢体能抵抗重力离开床面，但不能抵抗阻力，其肌力为

- A. 1 级
- B. 0 级
- C. 4 级
- D. 2 级
- E. 3 级

12. 下列哪项实验不能协助诊断重症肌无力

- A. 呼气诱发实验
- B. 疲劳试验
- C. 神经重频电刺激检查
- D. 腾喜龙实验
- E. 新斯的明实验

13. 患者能听到声音，但不能理解别人讲话的意思，病变最可能位于

- A. 非主侧半球顶叶
- B. 非主侧半球额极
- C. 主侧半球额中回后部
- D. 主侧半球颞上回后部
- E. 主侧半球中央前回下部

14. 皮质盲时瞳孔对光反射存在的原因是：

- A. 视觉传入通路黄斑纤维未受损
- B. 瞳孔对光反射传入纤维在到达外侧膝状体前离开视觉通路
- C. 视放射纤维分散，小的病变不至于引起全部受损
- D. 瞳孔对光反射传出纤维未受损
- E. 视觉通路未受损害

15. 一患者表现为：一侧眼球不能内收和外展，对侧眼球不能内收只能外展，外展时有眼震，但两眼球的聚合功能正常。属下列哪个综合征

- A. Millard-Gubler 综合征
- B. Foville 综合征
- C. 一个半综合征
- D. Weber 综合征
- E. Parinaud 综合征

16. 患者 10 岁，男性。老师发现其上课时经常愣神，双眼瞪视前方，呼之不应，持续数秒缓解，其治疗药物选择下列哪项最正确

- A. 首选苯妥英钠，次选卡马西平
- B. 首选卡马西平，次选苯妥英钠
- C. 首选乙琥胺，次选丙戊酸钠

- D. 首选 ACTH，次选氯硝安定
- E. 首选丙戊酸钠，次选苯巴比妥

17. 一 62 岁女性，诊断脑血栓形成。神志清醒，偏瘫，偏身感觉障碍和同向性偏盲，最常见于下述哪一条血管的闭塞

- A. 椎-基底动脉
- B. 小脑后下动脉
- C. 大脑中动脉
- D. 大脑前动脉
- E. 大脑后动脉

18. 左侧舌咽神经麻痹时，发“啊”音悬雍垂偏向

- A. 上方
- B. 右侧
- C. 不受影响
- D. 左侧
- E. 不动

19. 下列哪项不是重症肌无力的临床特征

- A. 呼吸肌麻痹是重症肌无力的常见死因
- B. 短暂用力后肌力增强，持续收缩后又出现病态疲劳
- C. 感染、妊娠和月经前常导致疾病恶化

D. 受累肌肉的病态疲劳多于下午或傍晚劳累后加重，早晨和休息后减轻

E. 严重时可出现肢体无力，一般上肢重于下肢，近端重于远端

20. 下列哪项不属于溶栓治疗的并发症

A. 再闭塞

B. 梗死灶继发出血

C. 脑水肿

D. 血管痉挛

E. 再灌注损伤

21. 下列何种检查所见不属于小脑病变时的体征

A. 辨距不良

B. 指鼻试验不准

C. 跟膝胫试验不准

D. 睁眼站立稳，闭眼时不稳

E. 轮替运动不灵活

22. 特发性面神经麻痹下列描述中错误的是

A. 任何年龄均可发病

B. 男性多于女性

- C. 急性期可用皮质类固醇治疗
- D. 可继发眼部合并症
- E. 本病大多预后差

23. 男性患者，35 岁，平素体健。先有低热(37.6℃)及全身不适 3 天，此后感两足麻木无力，逐渐加重，于 3 天内发展至两下肢完全瘫痪和大、小便排出困难。查体：两下肢完全瘫痪，肌张力低下，双侧 Babinski 征阴性，乳头水平以下痛触觉消失且无汗。腰椎穿刺脑脊液正常，椎管通畅。诊断应是

- A. 急性多发性神经根神经炎
- B. 脊髓肿瘤
- C. 急性脊髓炎
- D. 急性脊髓前角灰质炎
- E. 脊髓出血

24. 患者，男性，21 岁，近来工作劳累。昨晚入睡前一正常，今晨发现患者瘫痪在床，四肢均不能活动。既往有类似发作。体格检查：神志清楚，脑神经检查未发现异常，四肢肌力 2 级，肌张力减低，四肢腱反射引不出，无感觉障

- A. 静脉滴注地塞米松
- B. 口服或静脉补充钾

- C. 静脉滴注葡萄糖
- D. 新斯的明肌注
- E. 静脉滴注能量合剂

25. 脑出血的预后主要与下列哪种因素有关

- A. 并发症严重程度
- B. 出血量
- C. 出血量和出血部位
- D. 出血部位
- E. 是否有其他器官疾病

26. 男性, 80 岁, 有高血压史 10 年。突发睡眠增多, 口角歪, 右上下肢无力入院。查体: 左上睑下垂, 左眼向上视、下视及内收不完全。右中枢性面舌瘫, 右上下肢肌力 0 级, 双侧 Babinski 征阳性。右面及右半身痛觉减退。头 MRI 示左中脑及双侧丘脑长 T1 长 T2 信号。该病人最可能的诊断是

- A. TIA
- B. Wallenberg 综合征
- C. 脑出血
- D. 基底动脉尖综合征
- E. 蛛网膜下腔出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/466154024114010105>