

2022-2023 学年山东省济南市统招专升本医学综合自考模拟考试(含答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(100题)

1. 下列关于胰岛素作用的叙述, 错误的是()

A.促进组织对糖的摄取和利用 B.促进糖原合成 C.促进糖异生 D.促进脂肪合成 E.促进蛋白质合成

2. 脊柱的生理弯曲是 ()

A.颈曲凸向前, 胸曲凸向后 B.颈曲凸向后, 胸曲凸向前 C.腰曲凸向后, 骶曲凸向前 D.腰曲凸向前, 胸曲凸向前 E.以上都不对

3. 窦房结位于 ()。

A.冠状窦与右心房之间的心外膜深面
B.冠状窦口后方的心内膜深面
C.上腔静脉与右心耳的心外膜深面
D.上腔静脉与肺静脉之间的心外膜深面
E.上腔静脉与右心耳的心内膜深面

4. 破伤风属于

A.菌血症 B.毒血症 C.败血症 D.脓血症 E.脓毒败血症

5. 说明疾病本质的诊断是

A.病理形态诊断 B.病因诊断 C.病理生理诊断 D.专家诊断 E.排除诊断

6.胃十二指肠穿孔的诱因是()

A.情绪激动 B.暴食、进食刺激性食物 C.过度疲劳 D.以上都对

7. 引起输血发热反应最常见的原因是

A.细菌污染 B.红细胞破坏 C.血型不合 D.致热原 E.过敏物质

8. 在诊治疾病过程中，下列哪项不属于诊断学的基本内容()

A.询问病史 B.体格检查 C.心电图测试 D.药物治疗 E.尿常规检测

9. 下列关于胸导联电极的置放部位，不正确的是

A. V_1 ——胸骨右缘第4肋间

B. V_2 ——胸骨左缘第4肋间

C. V_3 —— V_2 与 V_4 连线中点

D. V_4 ——锁骨中线与第5肋间交界处

E. V_5 ——左腋前线第5肋间

10.诊断 ARDS 除呼吸困难、口唇发绀外，呼吸频率应为()

A.> 20 次 / min

B.> 25 次 / min

C.> 30 次 / min

D.> 35 次 / min

E.> 40 次 / min

11. 骨骼肌细胞静息电位水平接近于 ()

A.K⁺的平衡电位 B.Na⁺的平衡电位 C.Ca²⁺的平衡电位 D.Cl⁻的平衡电位 E.Mg²⁺的平衡电位

12. 颅内压增高的临床表现，下列不正确的是 ()

A. 婴幼儿颅内压增高时，头痛都很严重，且多在早期出现
B. 头痛呈阵发性加重
C. 后期多出现视力障碍
D. 某些病人可以始终不出现“三主征”

13. 与婴儿神经系统发育密切相关的激素是

A. 生长素 B. ACTH C. 甲状腺素 D. 胰岛素 E. 催乳素

14. 大量腹水时，腹包块的触诊，下列哪种方法最适宜 ()

A. 滑行触诊法 B. 深压触诊法 C. 双手触诊法 D. 冲击触诊法 E. 浅部触诊法

15. 左主支气管的特点是 【 】

A. 细而长 B. 细而短 C. 粗而短 D. 粗而长 E. 嵴下角小

16. 正常成年人安静时，通气/血流比值的正常值是 ()

A. 0.48 B. 0.64 C. 0.84 D. 1.4 E. 0.58

17. 一般脂溶性物质进出细胞膜是通过()

A.单纯扩散 B.主动转运 C.易化扩散 D.出胞作用 E.入胞作用

18. 第二心音反常分裂, 最常见于

A.完全性右束支传导阻滞 B.二尖瓣狭窄 C.完全性左束支传导阻滞 D.肺动脉高压 E.低血压

19.一旦确诊为心跳骤停,必须争取在多长时间內重建呼吸循环()。

A.4~6 分钟 B.6~8 分钟 C.8~10 分钟 D.10~12 分钟 E.12~15 分钟

20. 长期慢性组织缺氧时可出现()

A.匙状指 B.杵状指 C.梭状指 D.“猿手” E.“爪形手”

21.臀大肌注射定位的十字法垂线的起点是()

A.髂前上棘 B.髂嵴 C.髂嵴最高点 D.脊柱

22.CO 中毒所引起的缺氧比贫血引起的同等程度 Hb 减少所致的缺氧更为严重, 这是因为 【 】

A.动脉血 PO_2 降低

B.血氧容量降低

C.血氧含量升高

D. HbO_2 的 O_2 释放减少

E.氧离曲线右移

23.开口位置高于窦底的鼻旁窦是()

A.额窦 B.上颌窦 C.蝶窦 D.筛窦前中群 E.筛窦后群

24. 心脏收缩力增强时，静脉回心血量增加，这是因为()

A.动脉血压升高 B.血流速度加快 C.心排出量增加 D.舒张期室内压低
E.静脉压增高

25. 临床最常见的头痛伴剧烈呕吐多提示为()

A.偏头痛 B.癫痫 C.椎—基底动脉供血不足 D.神经功能性头痛 E.颅内
高压

26. 高调金属音的肠鸣音亢进最常见于()

A.消化道出血 B.腹泻 C.急性胃肠炎 D.机械性肠梗阻 E.服泻药后

27.视区位于()

A.颞横回 B.角回 C.海马旁回钩 D.距状沟两岸 E.缘上回

28. 患者浅感觉障碍，可能出现异常的是()

A.关节觉 B.痛温觉 C.震动觉 D.位置觉 E.两点辨别觉

29.十二指肠纵襞的位置多在()

A.十二指肠上部内侧 B.十二指肠降部外侧 C.十二指肠降部后内侧 D.
十二指肠水平部内侧 E.十二指肠升部内侧

30. 肝脏扩张性搏动常见于

A.正常人 B.肝炎 C.肝癌 D.二尖瓣关闭不全 E.主动脉瓣关闭不全

31.肺脓肿（ ）。

A.反复少量咯血伴呛咳

B.痰中带血伴发热盗汗

C.脓血痰，量多

D.咯血，皮肤黏膜出血点

E.突然大咯血，骤然咯血停止

32.肺气肿患者肺部叩诊为 【 】

A.鼓音 B.清音 C.过清音 D.浊音 E.实音

33.通过坐骨小孔的神经是（ ）。

A.闭孔神经 B.臀上神经 C.臀下神经 D.阴部神经 E.坐骨神经

34. 代谢性酸中毒时

A.呼吸快而浅 B.呼吸慢而浅 C.尿液呈碱性 D.钾离子进入细胞内 E.呼吸深而快

35. 当血小板数日低于下列哪一数值时，就会出现出血倾向？

A. $50 \times 10^9/L$

B. $100 \times 10^9/L$

C. $150 \times 10^9/L$

D. $200 \times 10^9/L$

E. $250 \times 10^9/L$

36.高血压病 () 。

A. A_2 增强

B. A_2 减弱

C. P_2 增强

D. P_2 减弱

E. S_1 减弱

37.烧伤创面适宜包扎疗法的部位是 ()

A.头部 B.面部 C.躯干 D.会阴 E.肢体

38. 小儿佝偻病常伴有 ()

A.尖颅 B.巨颅 C.方颅 D.长颅 E.小颅

39.阑尾动脉发自 【 】

A.空回肠动脉 B.中结肠动脉 C.右结肠动脉 D.回结肠动脉 E.左结肠动脉

40.血浆 pH 主要取决于哪种缓冲对 ()

A. $\text{KHCO}_3 / \text{H}_2\text{CO}_3$

B. $\text{K}_2\text{HPO}_4 / \text{KH}_2\text{PO}_4$

C. $\text{NaHCO}_3 / \text{H}_2\text{CO}_3$

D. $\text{Na}_2\text{HPO}_4 / \text{NaH}_2\text{PO}_4$

E.蛋白质—Na / 蛋白质

41.支配汗腺的交感神经节后纤维末梢释放的递质是()

A.肾上腺素 B.去甲肾上腺素 C.乙酰胆碱 D.多巴胺 E.5—羟色胺

42.舌的神经支配 ()

A. 舌的味觉由舌神经和舌咽神经传导

B. 舌神经管理舌前 2/3的一般黏膜感觉

C. 舌肌的运动由舌神经控制

D. 舌咽神经管理舌前 2/3的味觉

E. 舌的一般感觉由面神经和舌咽神经共同管理

43.产生收缩中、晚期喀喇音可见于()

A.房间隔缺损

B.动脉导管未闭

C.轻中度单纯性肺脉瓣狭窄

D.特发性二尖瓣脱垂

E.以上都不对

44.心迷走神经末梢释放的递质是 ()

A.A. 去甲肾上腺素 B. 乙酰胆碱 C. 肾上腺素 D. 多巴胺 E. 5-羟色胺

45. 第一心音减弱可见于（ ）

A.二尖瓣狭窄 B.左心室肥大 C.发热 D.主动脉瓣关闭不全 E.以上都不对

46. 最常引起完全无尿的是（ ）

A.肾前性肾衰 B.肾性肾衰 C.肾后性肾衰 D.大出血、休克 E.广泛烧伤

47. 下列选项中，不属于小脑中央核的是

A.齿状核 B.球状核 C.栓状核 D.顶核 E.基底核

48.复苏的主要目的是（ ）

A.A.迅速恢复脑的血液循环 B.恢复自主呼吸 C.减轻酸中毒 D.保护肾功能 E.使心脏迅速恢复跳动

49. 下列引起腹部外形改变的因素中，错误的是（ ）

A.右上腹膨隆——原发性肝癌

B.蛙状腹——腹内充气

C.弥漫性腹部膨隆——巨大腹块

D.下腹部隆起——早期妊娠

E.全腹膨隆有肠型——肠梗阻

2 肋间听到 3 级收缩期杂音伴 P2 亢时，应诊断为

()

B. 房间隔缺损 C. 先天性肺动脉瓣狭窄 D. 功能性杂音 E. 见于健康青少年

51. 在心室等容收缩期时 ()

- A. 房内压 > 室内压 > 主动脉压
- B. 房内压 < 室内压 > 主动脉压
- C. 房内压 = 室内压 > 主动脉压
- D. 房内压 < 室内压 < 主动脉压
- E. 房内压 > 室内压 < 主动脉压

52. 预防切口感染，下列叙述错误的是 ()

- A. 遵守无菌技术 B. 手术操作轻柔准确 C. 严格止血，避免血肿形成 D. 术后常规应用抗生素 7 天 E. 切口缝合避免死腔形成

53. 关于恶性肿瘤手术切除，下列选项正确的是 ()

- A. 根治性手术是指将恶性肿瘤彻底切除
- B. 前列腺癌不能行睾丸切除
- C. 姑息性手术是指有远处转移者，原发肿瘤较易切除，转移病变术后用放疗、化疗
- D. 有远处转移的肿瘤宜作根治性手术

54. 血氧饱和度的大小主要决定于 ()

A. 血中 Hb 含量多少

B. 血中 $P(N_2)$ 大小

C. 血中 $P(CO_2)$ 大小

D. 血中 $P(O_2)$ 大小

E. 血液温度高低

55. 临床用简便方法测定能量代谢率必须取得的数据是 【 】

A. 食物的热价 B. 食物的氧热价 C. 非蛋白呼吸商 D. 一定时间内的耗氧量 E. 一定时间内需要二氧化碳的量

56. 大隐静脉行走于 ()

A. 内踝前方

B. 内踝后方

C. 外踝前方

D. 外踝后方

E. 小腿后面

57. 在 40% 的环境中，机体散热的方式是

A. 辐射 B. 传导 C. 对流 D. 蒸发 E. 扩散

58.阻塞性或肝细胞性黄疸 ()

B.尿镜检白细胞满视野

C.尿外观正常，镜检可见各种管型

D.尿外观酱油色，隐血试验(十)

E.尿外观深黄色，含大量胆红素

59.肌肉的初长度取决于

A.被动张力 B.前负荷 C.后负荷 D.前负荷和后负荷之和 E.前负荷和后负荷之差

60.腰麻后一般采用 【 】

A.去枕平卧位 B.去枕侧卧位 C.15°~30°斜坡卧位 D.高坡卧位 E.低坡卧位

61. 恶性肿瘤的诊断中，准确性最高的是()

A.症状与体征 B.肿瘤标志物检查 C.X 线检查 D.磁共振成像检查 E.病理检查

62.当中心静脉压小于 4cmH₂O 时，可出现的主要表现是()。

A.少尿、意识淡漠、血压下降

B.头痛、意识障碍、喷射状呕吐

C.少尿、浮肿、血压升高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/467165112131006160>