
2020年云南省《心血管内科学》模拟卷

考试须知：

- 1、考试时间：180 分钟。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的地方填写您的答案。
- 4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。
- 5、答案与解析在最后。

姓名：_____

考号：_____

得分	评卷人

一、A1(共 30 题)

1. 急性左心衰竭的紧急处理不包括()。
 - A. 高流量的氧气吸入
 - B. 加快静脉补液速度
 - C. 皮下注射吗啡
 - D. 静脉注射呋塞米
 - E. 静脉注射毛花苷丙
2. 肺栓塞的栓子大多数来源于()。
 - A. 右心室
 - B. 右心房
 - C. 深静脉
 - D. 下肢浅静脉
 - E. 肺动脉内
3. 以下先天性心血管病中，x线显示肺纹理稀少，肺野清晰的是()。

-
- A. 房间隔缺损
- B. 动脉导管未闭
- C. 室间隔缺损
- D. 法洛四联症
- E. 单纯肺动脉瓣狭窄
4. 最近的统计结果显示急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是()。
- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 淋球菌
- C. A族链球菌
- D. 肺炎球菌
- E. 流感杆菌
5. 急性前壁心肌梗死患者入院后6小时应首选的治疗方式为()。
- A. 静滴硝酸甘油
- B. 口服普萘洛尔
- C. 尿激酶溶栓治疗
- D. 口服卡托普利
- E. 静滴低分子右旋糖酐
6. 法洛四联症患者发绀的程度主要取决于()。
- A. 肺动脉狭窄的程度
- B. 室间隔缺损的大小
- C. 室间隔缺损的部位
- D. 主动脉骑跨的程度
- E. 右心室肥厚的程度
7. 硝酸甘油的用药指导正确的是()。
- A. 嘱患者轻轻嚼碎后继续含服

-
- B. 对不稳定心绞痛患者, 点滴速度宜快
- C. 初次使用时应避免站立体位
- D. 对不稳定心绞痛患者, 点滴速度宜慢
- E. 常见的不良反应有颜面部潮红、头痛、头胀、心悸
8. 关于变异型心绞痛的叙述不正确的是()。
- A. 休息或一般活动时发生
- B. β 受体拮抗药会加重心绞痛
- C. 发作时ECG显示暂时性ST段抬高
- D. 硝酸甘油无效
- E. 首选治疗药物为钙拮抗药
9. 洋地黄中毒所致双向性室性心动过速的机制是()。
- A. 折返激动
- B. 触发活动
- C. 自律性升高
- D. 传导障碍
- E. 自律性降低
10. 对深静脉血栓形成的患者, 华法林应该在肝素治疗后24~48小时使用, 从而到达国际标准化凝血酶原时间比值INR为()的目标。
- A. 1.0~2.0
- B. 2.0~3.0
- C. 3.0~4.0
- D. 4.0~5.0
- E. 5.0~6.0
11. 洋地黄制剂不宜应用的情况是()。
- A. 二尖瓣狭窄合并快心室率心房颤动

-
- B. 急性心肌梗死伴快速室上性心律失常
- D. 有症状心力衰竭伴窦性心动过速
- E. 预激综合征合并心房颤动
12. 心室辅助装置的禁忌证不包括()。
- A. 严重感染, 败血症
- B. 恶性肿瘤
- C. HIV阳性
- D. HIV阴性
- E. 除心脏外伴有不可逆终末器官功能衰竭如肾衰竭, 不可逆神经系统损伤等
13. 关于嗜铬细胞瘤的治疗, 叙述不正确的是()。
- A. 手术切除嗜铬细胞瘤
- B. 术前单用 β 受体拮抗剂治疗
- C. 术前给予 α 、 β 受体拮抗剂联合治疗
- D. 复发患者再次手术仍有效
- E. 急性发作期进行血压控制和支持治疗
14. 导致心源性猝死的严重心律失常是()
- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 心室颤动
- D. 室上性心动过速
- E. 室性心动过速
15. 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄常见的临床“三联征”为()。
- A. 呼吸困难、心绞痛、心房颤动
- B. 呼吸困难、心绞痛、晕厥
- C. 呼吸困难、心绞痛、细迟脉

-
- D. 心绞痛、晕厥、细迟脉
- E. 心绞痛、细迟脉、心房颤动
16. 股静脉穿刺的部位在股三角区, 位于()。
- A. 股神经和股动脉内侧
- B. 股神经和股动脉外侧
- C. 股神经和股动脉之间
- D. 股神经内侧
- E. 股神经外侧
17. 自体瓣膜性心内膜炎超声检查的最典型表现是()。
- A. 瓣叶增厚
- B. 室间隔脓肿
- C. 瓣叶穿孔、粘连
- D. 瓣膜上有赘生物
- E. 主动脉细菌性动脉瘤
18. 术后需要口服阿司匹林的先天性心脏病介入手术是()。
- A. 经皮穿刺肺动脉瓣球囊成形术
- B. 房间隔造口术
- D. 动脉导管未闭封堵术
- E. 主动脉缩窄球囊成形术
19. Austin-Flint杂音见于()。
- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣关闭不全

-
20. 最常见的肺动脉栓塞类型是()。
- A. 脂肪栓塞综合征
 - B. 肺血栓栓塞症
 - C. 羊水栓塞
 - D. 空气栓塞
 - E. 细菌栓塞
21. 有助于判断心衰的预后和存活的临床参数不包括()。
- A. LVEF下降
 - B. NYHA分级恶化
 - C. 低钠血症的程度
 - D. 运动峰耗氧量减少
 - E. 血细胞压积升高
22. 主动脉瓣狭窄在正常心排血量时压力阶差峰值至少应大于()。
- A. 35mmh
 - B. 40mmHg
 - C. 45mmhg
 - D. 50mmHg
 - E. 55 mmHg
23. 在我国,心脏瓣膜病最常见的病因是()。
- A. 先天性心脏病
 - B. 风湿性心脏病
 - C. 系统性红斑狼疮
 - D. 染性心内膜炎
 - E. 老年性退行性钙化
24. 急性心肌梗死合并休克时禁用()。

-
- A. 去甲肾上腺素
- B. 多巴胺
- C. 糖皮质激素
- D. 洋地黄
- E. 异丙基肾上腺素
25. 闭塞性周围动脉粥样硬化的易患因素不包括()。
- A. 原发性高血压
- B. 高脂血症
- C. 糖尿病
- D. 吸烟
- E. 血管先天畸形
26. 体循环淤血的标志性体征为
- A. 颈静脉怒张
- B. 肝脏肿大及压痛
- C. 胸、腹腔积液
- D. 双下肢水肿
- E. 静脉压升高
27. 非洋地黄中毒引起的自律性房性心动过速药物治疗无效时, 宜采用()。
- A. 非同步直流电复律
- B. 植入式心脏复律除颤器
- C. 导管射频消融治疗
- D. 抗心动过速起搏器
- E. 外科Mae手术
28. 治疗Gordon综合征最有效的药物是()。
- A. 保钾利尿剂

B. 钠离子通道阻断剂

C. 性激素

D. 类固醇

E. 噻嗪类利尿剂

29. 消融术中在房间穿刺前给予肝素 $100\sim 150\text{U}/\text{kg}$,其后每小时追加 1000U ,建议每15分钟监测ACT,使ACT保持在()。

A. $100\sim 200$ 秒

B. $250\sim 300$ 秒

C. $350\sim 450$ 秒

D. $450\sim 500$ 秒

E. $500\sim 600$ 秒

30. 先天性心脏病的室性期前收缩可产生于原发的心脏损害或心脏手术损伤,报道较多的是

A. 动脉导管未闭

B. 房间隔缺损

C. 主动脉口狭窄

D. 主动脉缩窄

E. 法洛四联症

二、A2(共 20 题)

31. 患者,男性,40岁。因患原发性扩张型心肌病入院,治疗后病情好转,1小时前突感心悸,胸闷、头晕。查体:心率 180 次/分,血压 $110/70\text{mmHg}$;心电图示阵发性室上性心动过速。患者治疗应首选的药物为()。

A. 毛花苷丙

B. 利多卡因

C. 维拉帕米

D. 胺碘酮

E. 肾上腺素

32. 患者, 女性, 65岁。曾有10年冠心病史, 并有夜间阵发性呼吸困难发作。2天前因幽门窦癌手术后快速补液300ml, 突发呼吸困难而端坐。查体: 心率132次/分, 两肺底闻及湿性啰音, 患者最可能诊断为()。

- A. 肺梗死
- B. 自发性气胸
- C. 感染性心包炎
- D. 术后肺部感染
- E. 急性左心衰竭

33. 患者, 女性, 20岁。活动后感心悸, 气短。查体发现肺动脉瓣区可扪及收缩期震颤, 闻及收缩期吹风样杂音IV级, 向左上胸部传导。P2几乎消失。考虑该病与下列哪项机制有关()

- A. 右心室容量负荷过重
- B. 心脏舒张受限
- C. 心室容量负荷过重
- D. 右心室压力负荷过重
- E. 机械性肺淤血状态

34. 患者, 女性, 67岁。风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄并关闭不全、主动脉瓣关闭不全病史30年, 劳力时胸痛, 可试用的药物是()

- A. 血管扩张剂
- B. 洋地黄类药物
- C. 钙拮抗剂
- D. 利尿剂
- E. 硝酸酯类制剂

35. 患者, 男性, 40岁。发热2周入院。体检: 眼结合膜有淤点, 二尖瓣听诊区可闻及舒张期雷鸣样杂音, 足底可见紫红色结节, 有压痛。白细胞计数 $11 \times 10^9 / L$, 血红蛋白70g/L。最可能诊断为()。

- A. 红眼病
- B. 伤寒

C. SLE

D. 风湿热

E. 感染性心内膜炎

36. 患者, 男性, 70岁。突然晕厥, 查体: 血压90/60mmHg, 心率38次/分, 神志淡漠, 四肢湿冷; 心电图示急性下壁心肌梗死及三度房室传导阻滞, 首选的治疗方法是()。

A. 异丙肾上腺素静脉滴注

B. 安装临时心脏起搏器

C. 阿托品静脉滴注

D. 安装永久性心脏起搏器

E. 肾上腺糖皮质激素

37. 患者, 女性, 36岁。患风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄8年, 平时气急, 经常发生大咯血, 关于该病大咯血的说法不正确的是()。

A. 是肺动脉高压的首发症状

B. 是支气管黏膜下静脉曲张破裂引起

C. 咯血于几小时可自行终止

D. 极少发生出血性休克

E. 要警惕咯血引起的窒息

38. 患者, 女性, 27岁。头晕、头痛2个月, 查体: 左上肢血压170/100mmHg, 右上肢血压测不出, 双下肢血压140/90mmHg, 心脏查体阴性, 上腹部可闻及收缩期吹风样杂音。患者最可能的诊断是()。

A. 原发性高血压

B. 肾动脉狭窄

C. 多发性大动脉炎

D. 升主动脉狭窄

E. 嗜铬细胞瘤

39. 患者, 女性, 36岁。活动后心悸、气喘1年余。查体: 轻度贫血, 心率快, 律齐, 胸骨右缘第2肋间闻及响亮而粗糙的收缩期3/6级杂音, 首先应想到的疾病为()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468072116054006033>