

2024吉林大学白求恩第一医院心血管内科协调员招聘笔试冲刺题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、膀胱肿瘤最常见的病理类型是（ ）。

- ☐ A. 小细胞癌
- ☐ B. 内翻性乳头状瘤
- ☐ C. 移行细胞癌
- ☐ D. 横纹肌肉瘤
- ☐ E. 鳞癌

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2、关于苹果酸穿梭生理意义的叙述，正确的是（ ）。

- ☐ A. 维持线粒体内外有机酸的平衡
- ☐ B. 将草酰乙酸带入线粒体彻底氧化
- ☐ C. 将胞液中NADH+H⁺的2H带入线粒体内
- ☐ D. 为三羧酸循环提供足够的草酰乙酸
- ☐ E. 进行谷氨酸草酰乙酸转氨基作用

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3、休克扩容后，出现下列哪项应警惕肾衰竭？（ ）

- ☐ A. 尿少，CVP低，血压低
- ☐ B. 尿少，CVP高，血压低
- ☐ C. 尿少，CVP正常，血压正常
- ☐ D. 尿少，CVP低.血压正常
- ☐ E. 尿少，CVP正常，血压低

『正确答案』

C

『答案解析』

休克扩容后若CVP正常、血压正常，说明血容量已经补足，如果仍然有尿少，则说明可能发生肾衰竭。

4、一女童，体重比同龄正常儿童低30%，皮下脂肪厚0.5cm，同时伴有皮肤干燥、肌张力减低，应诊断为（ ）。

- ☐ A. 营养不良重度
- ☐ B. 营养不良中度
- ☐ C. 营养不良轻度
- ☐ D. 属正常儿童范畴
- ☐ E. 糖尿病

『正确答案』

B

『答案解析』

中度营养不良的患儿体重减低25%~40%，腹部皮褶厚度<0.4cm。

5、杀灭包括芽胞在内的微生物的方法称（ ）。

- ☐ A. 无菌
- ☐ B. 消毒
- ☐ C. 防腐
- ☐ D. 灭菌
- ☐ E. 抑菌

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

6、3岁女童，因发热、畏光、流涕、咳嗽入院。经查，患儿口腔两侧出现中心灰白伴有红晕的颊黏膜斑，面部、颈部出现红色斑丘疹。可诊断为（ ）。

- ☐ A. 麻疹
- ☐ B. 风疹
- ☐ C. 疱疹
- ☐ D. 猩红热
- ☐ E. 腮腺炎

『正确答案』

A

『答案解析』

麻疹病毒感染后首先出现发热、结膜炎、鼻炎和上呼吸道卡他症状，口腔颊黏膜的Koplik斑对麻疹早期诊断有重要意义，特异性斑丘疹先出现在面部、颈部、后躯干、最后出现于四肢。

7、女婴，1岁半，因头颅大，未出牙，前囟未闭来院门诊。生后人工喂养，间断服用钙剂和维生素D，用不详。体检：精神可，易哭，体重11kg，前囟2cm×2cm，方颅，头围48cm，胸部有肋骨串珠，心肺（一），双腕部呈手镯状。X线长骨示：骨骺软骨带明显增宽，干骺端呈杯口状，毛刷样改变。该患儿诊断应为（ ）。

- ☐ A. 软骨营养不良
- ☐ B. 脑积水
- ☐ C. 克汀病
- ☐ D. 佝偻病激期
- ☐ E. 佝偻病恢复期

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

8、关于核苷酸合成代谢的叙述，错误的是（ ）。

- ☐ A. PRPP参与嘌呤、嘧啶的从头合成
- ☐ B. PRPP参与嘌呤、嘧啶的补救合成
- ☐ C. 嘌呤核苷酸从头合成首先生成的是IMP
- ☐ D. 嘧啶核苷酸从头合成首先生成的是OMP
- ☐ E. 嘌呤核苷酸从头合成主要场所在脑和骨髓

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

9、关于细胞因子下列哪项是错误的（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468125011061006056>