专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年河南省安阳县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题大全及参考答案（实用）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.医生、护士和药师对新购入药品的知识缺乏培训，归属于

A：产品缺陷

B：患者经济拮据

C：管理缺失

D：操作失误

答案：C

2.下列白细胞计数中，成人静脉血的正常参考值为

A：（3.5～10.0）×109/L

B：（4.3～10.0）×109/L

C：（15.0～20.0）×109/L

D：（4.0～10.0）×109/L

答案：A

3.6岁以下的儿童应该慎用的抗过敏药品是

A：氯雷他定

B：四环素

C：庆大霉素

D：依巴斯汀

答案：D

4.（2019年真题）患者，男，34岁，既往有胃溃疡病史，现因反复关节疼痛、肿大就诊，诊断为骨关节炎，应选用的药物是

A: 吲哚美辛

B: 塞来昔布

C: 萘普生

D: 布洛芬

答案：B

5.严重肝功能减退者服用经肝、肾两种途径清除的药物时

A: 避免使用

B: 一般无需调整剂量

C: 必须减量应用

D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案：C

6.药名词干为"-penem"的药品是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

7.目前推荐的绝经激素治疗窗口期是

A: 绝经后5年之内

B: 60岁以后

C: 绝经后15年之内或60岁以后

D: 绝经后10年之内或60岁以前

答案：D

8.用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发ADR的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；可评价为

A：很可能

B：可能无关

C：可能

D：待评价

答案：C

9.属于药师参与临床药物治疗、提供药学服务的重要方式和途径的是

A：治疗药物监测

B：药物信息服务

C：参与健康教育

D：处方调剂

答案：A

10.痛经症状严重者可选用的处方药为

A：贝诺酯

B：可待因

C：布洛芬

D：对乙酰氨基酚

答案：B

11.属于治疗沙眼的处方药的是

A：红霉素眼膏

B：硫酸锌滴眼剂

C：磺胺醋酰钠滴眼剂

D：硫酸铜棒

答案：D

12.开具新药或增加药物前需考虑患者的总体情况和药物相互作用，是倡导开处方环节的

A：修订医嘱及时沟通

B：医嘱完整不漏项

C：医嘱清楚准确

D：实现个体化治疗

答案：D

13.急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

A：右美沙芬

B：苯海拉明

C：愈创木酚甘油醚

D：伪麻黄碱

答案：D

14.（2018年真题）患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白（HbA1c）9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片0.5gtidpo,格列美脲片2mgtidpo,罗格列酮片2mgbidpo,甲钴胺片0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊250mgbidpo。

A：立刻舌下含服硝酸甘油片

B：立刻喝白开水200mL

C：立刻服用美托洛尔片

D：立刻口服糖水或糖块

答案：D

15.在药物信息(MI)源中，文献资料的数量最大的是

A：一级信息源

B：二级信息源

C：数据库

D：互联网站

答案：A

16.以下对于高血压患者的健康教育说法，错误的是

A：每日吃新鲜蔬菜和水果

B：减少烹调用盐，每人每日食盐量不超过0.5g

C：减少食用油摄入（＜25g/d），鼓励摄入单不饱和脂肪酸（橄榄油等）

D：高血压患者需要控制体重，BMI尽可能控制在＜24kg/m2

答案：B

17.防心绞痛药物

A：硝酸甘油

B：甘草合剂

C：去氨升压素

D：胃黏膜保护剂

答案：A

18.(妊娠的危险性分级)在动物生殖试验中并未显示对胎儿的危险，但无孕妇的对照组；或对动物生殖试验显示有副作用(较不育为轻)，但在早孕妇女的对照组中并不能肯定其不良反应(并在中、晚期妊娠亦无危险的证据)

A：C级

B：D级

C: B级

D: A级

答案：C

19.降钙素属于

A: 激素替代剂

B: 骨吸收抑制剂

C: 骨形成刺激剂

D: 促进骨矿化剂

答案：B

20.患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大病史3年，临床上对该患者不宜选用（）

A: 多巴丝肼

B: 司来吉兰

C: 左旋多巴

D: 苯海索

答案：D

21.属于选择性5-HT4受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动力药是

A: 甲氧氯普胺

B: 莫沙必利

C: 昂丹司琼

D: 多潘立酮

答案：B

22.患者,男,36岁,因发热、咳嗽就诊,查血常规:白细胞计数6.28×109/L,中性粒细胞百分比65.7%,淋巴细胞百分比15.1%。诊断为感冒。医生处方:阿奇霉素片0.5gqdpo.该处方属于()

A: 无适应证用药

B: 有配伍禁忌

C: 有禁忌证用药

D: 用法、用量不适宜

答案：A

23.切勿嚼碎、咀嚼，宜在进餐时用水吞服，不宜睡前吞服的IBS治疗药物是

A: 蒙脱石散

B: 地芬诺酯

C: 环孢素A

D: 匹维溴铵

答案：D

24.肺结核最常见的传播方式为（）

A: 血液传播

B: 飞沫传播

C: 消化道

D: 垂直传播

答案：B

25.艾滋病的传播途径不包括

A: 经血传播

B: 经血制品传播

C: 消化道传播

D: 性途径传播

答案：C

26.目前治疗低HDL-C血症，较为有效的药物是

A: 烟酸类

B: 贝特类

C: 他汀类

D: ω-3脂肪酸制剂

答案：A

27.《药物事实与比较》属于

A: 药品不良反应

B: 药物相互作用

C: 药物综合信息

D: 药品标准

答案：C

28.在药物信息服务中，三级信息资料最突出的优势是

A: 提供的信息丰富、详实

B: 能看到研究细节如实验设计方法、数据统计分析等

C: 内容全面、细致

D: 内容广泛、使用方便

答案：D

29.关于非甾体抗炎药的叙述正确是

A: 使用非甾体抗炎药引起的肾功能不全发生率高于氨基糖苷类抗生素引起的肾功能不全

B：非甾体抗炎药联合应用糖皮质激素类药物是造成胃肠道损害的危险因素

C：发热时可首选非甾体抗炎药

D：出现疼痛症状可首选非甾体抗炎药

答案：B

30.尽可能避免使用小数，是倡导开处方环节的

A：医嘱完整不漏项

B：医嘱清楚准确

C：修订医嘱及时沟通

D：实现个体化治疗

答案：B

31.属于P一糖蛋白抑制剂的药物是

A：维拉帕米

B：圣约翰草提取物

C：卡马西平

D：利福平

答案：A

32.引起急性细菌性扁桃体炎最常见的致病菌是

A：大肠埃希菌

B：A组β溶血性链球菌（化脓性链球菌）

C：金黄色葡萄球菌

D：肺炎链球菌

答案：B

33.急性肠炎可出现()。

A：稀糊便
B：鲜血便
C：脓状便
D：脓血便
答案：A

34.肾素抑制剂
A：阿利吉仑
B：雷米普利
C：阿米洛利
D：依普利酮
答案：A

35.患者，男性，36岁，主因“反复上腹部疼痛3年，加重伴黑便2天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院3年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前2天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗳气，并伴有黑便，呈糊状，共排3次，每次约250g左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84次/分、R20次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音3～5次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一1.5cm×2cm椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。
A：尿素呼气试验

B: 粪便隐血试验
C: 尿酮体试验
D: 尿素酶试验
答案：A

36.关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是
A: 早晨服用
B: 早晚分别服用
C: 晚间服用
D: 早晨服用贝特类、而晚上服用他汀类
答案：D

37.药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。
A: 患者三?
B: 患者二?
C: 患者四?
D: 患者一?
答案：B

38.患者，女，76岁，患阿尔茨海默病，伴严重的肾功能不全，该患者禁用的药物为，
A: 加兰他敏
B: 卡巴拉汀
C: 多奈哌齐
D: 美金刚
答案：A

39.可引起尿胆红素阳性的是
A：肺结核
B：病毒性肝炎
C：再生障碍性贫血
D：肾小球肾炎
答案：B

40.以下中毒病例中，临床应用特殊试剂能够明确诊断的是
A：丙咪嗪
B：奋乃静
C：苯巴比妥
D：硝西泮
答案：D

41.首要标准是
A：药物治疗的规范性
B：药物治疗的方便性
C：药物治疗的有效性
D：药物治疗的安全性
答案：C

42.属于B级高危药品的是
A：5%葡萄糖注射液
B：50%葡萄糖注射液
C：全胃肠外营养液
D：血液透析液
答案：C

43.非甾体抗炎药的不良反应,可致肝损害，产生黄疸、肝炎

A: 美洛昔康

B: 保泰松

C: 布洛芬

D: 塞来昔布

答案：B

44.不宜与中成药虎骨酒、人参酒、舒筋活络酒同服的药品是

A: 氯苯那敏

B: 可待因

C: 氨茶碱

D: 地高辛

答案：A

45.患者，男，56岁。因肾功能不全行肾移植术。可引起移植肾发生慢性排斥反应的危险因素不包括

A: 糖尿病

B: 组织相容性差

C: 感染

D: 高血脂

答案：A

46.下列治疗良性前列腺增生症的药物中，可以引起性功能减退的是

A: 托特罗定

B: 奥昔布宁

C: 索利那新

D: 非那雄胺

答案：D

47.在应用碘解磷定时的注意事项中哪一项是错误的

A: 对毒蕈碱样作用和防止呼吸中枢抑制的作用较差

B: 对有机磷农药急、慢性中毒均有效

C: 在碱性溶液中易水解为氰化物，故忌与碱性药物配伍

D: 用量过大、注射过快或未经稀释直接注射均可引起中毒

答案：B

48.美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别头孢曲松属于药物妊娠毒性分级

A: C级

B: B级

C: A级

D: D级

答案：B

49.效果转化为货币表示

A: 最小效果分析

B: 最小效益分析

C: 成本-效用分析

D: 成本-效益分析

答案：D

50.口服奥司他韦(达菲)治疗流感宜及早用药，较为有效的用药时间是症状出现的

A: 72小时内

B: 108小时内

C：48小时内

D：96小时内

答案：C

51.铁剂与维生素C联用增效的机制是

A：延缓或降低抗药性

B：促进机体的利用

C：竞争性拮抗作用

D：作用于不同的靶点

答案：B

52.与左旋多巴合用，可提高疗效的药物是

A：奥美拉唑

B：叶酸

C：苄丝肼

D：克拉维酸钾

答案：C

53.巨幼细胞贫血患者出现周围神经系统症状应首选

A：硫酸亚铁片

B：苯妥英钠注射液

C：叶酸片

D：维生素B12

答案：D

54.患者，男，59岁，哮喘病史8年，近日因急性脑梗死就诊，住院治疗2周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是

A: 对乙酰氨基酚
B: 华法林钠
C: 氯吡格雷
D: 阿司匹林
答案：C

55.病毒性肝炎、肝硬化等可引起
A: 尿蛋白检测阳性
B: 尿酸碱度增高
C: 尿胆红素检测阳性
D: 尿酸碱度降低
答案：C

56.百日咳的临床表现是
A: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛
B: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血
C: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰
D: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达2～3个月
答案：D

57.指本次不良反应经采取相应的医疗措施后的结果；如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，此栏应填"好转"
A: ADR/ADE过程描述
B: 用药原因
C: 用药起止时间

D: 不良反应/事件的结果

答案：D

58.（2019年真题）患者，女，29岁，孕29+6周，血压160/100mmHg，尿蛋白（-），该患者降压药应选用

A: 卡托普利

B: 甲基多巴

C: 厄贝沙坦

D: 氨氯地平

答案：B

59.进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: 临床预试验

B: Ⅲ期临床试验

C: Ⅰ期临床试验

D: Ⅱ1期临床试验

答案：B

60.可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

A: 颠茄浸膏片

B: 菠萝蛋白酶

C: 阿司匹林

D: 伪麻黄碱

答案：D

61.（2015年真题）治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是（）。

A: 安全性

B: 经济性

C: 依从性

D: 有效性

答案：C

62.能早期发现患者用药伤害、尽快地采取干预措施的方法是

A: 病历审查

B: 岗位工作问责

C: 直接观察

D: 计算机检测方法

答案：D

63.患儿,女,5岁,误服香豆素灭鼠药,可选用的解救药物是（）

A: 二巯丙醇

B: 维生素K

C: 纳洛酮

D: 亚甲蓝

答案：B

64.验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: Ⅰ期临床试验

B: Ⅱ期临床试验

C: Ⅲ期临床试验

D: 临床预试验

答案：C

65.处方中“合剂”的规范书写是

A: Mist

B: Liq

C: Dos

D: Dil

答案：A

66.经检查，某患者A/G（白蛋白/球蛋白）＜1，提示患者可能患有

A: 胃肠炎

B: 胰腺炎

C: 慢性肝炎

D: 胆囊劗

答案：C

67.（2017年真题）可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是（）

A: 头孢克洛

B: 阿莫西林

C: 诺氟沙星

D: 复方磺胺甲噁唑

答案：D

68.更年期综合征最具特征性的症状为

A: 阴道萎缩

B: 月经周期延长，经量减少，最后绝经

C: 潮热、出汗

D: 心悸、胸闷不适

答案：C

69.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见WBC15×109/L，中性粒细胞百分比85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 首选针对革兰氏阳性菌的药物

B: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素

C: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物

D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

答案：A

70.属于癌症第二阶梯止痛药物的是

A: 对乙酰氨基酚

B: 谷维素

C: 美沙酮

D: 二氢可待因

答案：D

71.尤其适用于伴胸痛的干咳患者的药品是

A: 羧甲司坦

B: 可待因

C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案：B

72.下面有关帕金森病治疗的说法错误的是

A: 药物治疗的目标是延缓疾病进展，尽可能延长症状控制的年限

B: 司来吉兰适用于帕金森病早期阶段，胃溃疡患者慎用；其可以与5-羟色胺再摄取抑制剂一起提高疗效

C: 康复与心理治疗是帕金森病治疗中重要的辅助措施

D: 药物治疗在病程晚期多数疗效不佳

答案：B

73.抗菌药物适宜

A: 餐前服用

B: 清晨服用

C: 餐中服用

D: 餐后服用

答案：A

74.“将药物治疗的成本与所产生的效益归化为以货币为单位的数字，用以评估药物治疗方案的经济性”是指查看材料

A: 成本一效用分析方法

B: 最大效果分析方法

C: 最小成本分析方法

D: 成本一效益分析方法

答案：D

75.溃疡或胃酸过多的人不宜饮用

A: 吸烟

B: 饮茶

C: 高盐饮食

D: 咖啡

答案：D

76.患者，女，1岁6个月，因感冒发热到医院就诊，医生处方对乙酰氨基酚滴剂，药师误发成对乙酰氨基酚片，患者家属拿到药品后不知如何使用，故询问药师，此时药师发现发错了药。针对该类型差错，有效的防范措施是()

A：采用两种方式核对患者身份

B：使用药片通用名

C：双人核对

D：采用电子处方系统

答案：C

77.下列不属于痛风的非药物治疗方法的是

A：多饮水，每日保持尿量2～3L

B：运动治疗

C：禁酒

D：保持理想体重

答案：B

78.一些权威性较高的二次文献中，记载做皮肤敏感试验的药品是

A：青霉素钠注射剂

B：鱼肝油酸钠注射剂

C：链霉素注射剂

D：玻璃酸酶注射剂

答案：C

79.原料血浆包装、贮存、运输的温度应控制在

A：-15℃以下

B：-20℃以下

C：-10℃以下。

D：-4℃以下

答案：B

80.高血压合并冠心病，偶发窦性心动过速宜选用的药物是
A：美托洛尔
B：非洛地平
C：缬沙坦
D：氢氯噻嗪
答案：A

81.长期服用苯妥英钠，可能导致
A：丙氨酸氨基转移酶升高
B：γ-谷氨酰转移酶升高
C：血清碱性磷酸酶升高
D：A/G比值<1
答案：B

82.临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径
A：每日给药1次
B：静脉滴注给药
C：每2～3个半衰期给药1次
D：每个半衰期给药1次
答案：A

83.以下有关项目中，可作为药品外观质量检查的主要内容是
A：药品中包装
B：药品外包装
C：药品性状
D：药品内包装
答案：C

84.射击运动员使用后,可减慢心率,减少心肌耗氧量,消除比赛前紧张心理,因此被列入兴奋剂管理的药物是()

A: 普茶洛尔

B: 硝苯地平

C: 缬沙坦

D: 呋塞米

答案：A

85.患者用药咨询的内容是

A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

B: 抗菌药物的合理使用

C: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

D: 减肥、补钙、补充营养素

答案：C

86.血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患荨麻疹患者常出现的血常规检查异常是

A: 血小板计数增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 中性粒细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案：B

87.支气管扩张的临床表现是

A: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

B：有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/475120212121012033