

2024 安徽省怀远县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题王牌题库（夺分金卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 肾脏
- B: 肺
- C: 胃肠系统
- D: 肝脏

答案：D

2. 中毒时可采用催吐处理方法的患者

- A: 患有严重心脏病的患者
- B: 孕妇患者
- C: 昏迷状态病人
- D: 中毒引起抽搐，惊厥被控制之后的清醒病人

答案：D

3. 在血液透析患者中每次给予元素铁

- A: 60mgqd
- B: 60mgbid
- C: 60mg tid
- D: 100mg/次

答案：D

4. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇紫绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 西地兰
- B: 硝普钠
- C: 阿替洛尔
- D: 卡托普利

答案：A

5. 饮茶可减少其吸收的药物是

- A: 去氨加压素
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 阿莫西林
- D: 硫酸亚铁

答案：D

6. 嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

- A: 感染性疾病如肺结核
- B: 铅、钡中毒
- C: 病毒感染性腹泻
- D: 过敏性疾病如荨麻疹

答案：D

7. 上市后因出现局部缺血性结肠炎，并有死亡病例报道而导致撤市的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿昔洛韦

C: 甲氨蝶呤

D: 阿洛司琼

答案: D

8. 关于肿瘤疼痛控制的治疗原则，叙述不正确的是

A: 按需给药

B: 按阶梯给药

C: 提倡无创给药

D: 按时给药

答案: A

9. 妇女口服避孕药致阿米替林清除率下降，引起药源性疾病的因素主要为

A: 遗传因素

B: 基础疾病因素

C: 年龄因素

D: 性别因素

答案: D

10. 药师应具备的素质中，开展药学服务工作的关键是()。

A: 药历制订、修改

B: 良好的教育背景

C: 交流沟通能力

D: 高尚的职业道德

答案: C

11. 下列药物中，一般不会呈现肝毒性的药物是

A: 氯丙嗪

B: 水杨酸

C: 青霉素类

D: 异烟肼

答案: C

12. 阿糖腺苷属于

A: 抗过敏药

B: 抗肿瘤药

C: 抗真菌药

D: 抗病毒药

答案: D

13. 有糖尿病的高血压患者服用降压药，建议控制在

A: $<120 / 80\text{mmHg}$

B: $<130 / 80\text{mmHg}$

C: $<140 / 90\text{mmHg}$

D: $<140 / 80\text{mmHg}$

答案: B

14. 下列药品中，不需要避潮湿贮存的是

A: 维生素 C 片剂

B: 奥美拉唑肠溶片

C: 维生素 C 注射液

D: 布洛芬颗粒剂

答案: C

15. 在氯化钠注射液中可形成胶状不溶物是

A: 苯妥英钠

B: 氯化钾

C: 青霉素

D: 红霉素

答案：D

16. 下列药学服务的重要的人群中，特殊人群是指

A: 肝肾功能不全者

B: 需要重新选择药品或调整用药方案者

C: 药物治疗窗窄、需要做监测者

D: 应用特殊剂型者

答案：A

17. 马兜铃酸可导致

A: 前列腺素合成障碍

B: 肾小管坏死

C: 阻塞肾小管、肾小球

D: 肾间质纤维化

答案：D

18. (2017 年真题) 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是 ()

A: 硫酸镁

B: 番泻叶

C: 乳果糖

D: 聚乙二醇 4000

答案：B

19. 应将该药倒入 50ml 温水中充分稀释，摇匀服用，可用于 IBS 患者止泻的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 地芬诺酯
- B: 环孢素 A
- C: 匹维溴铵
- D: 蒙脱石散

答案：D

20. 静滴、静注不良反应发生率较高

- A: 生理因素
- B: 生活和饮食习惯
- C: 药物制剂因素
- D: 药物的使用

答案：D

21. 下列药物属于容积性泻药的是

- A: 羟甲基纤维素
- B: 聚乙二醇
- C: 多库酯
- D: 番泻叶

答案：A

22. (2018 年真题) 患者,男,40 岁,因感冒所致鼻塞到药店购药,药师应推荐的药品是 ()

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 氯苯那敏片
- C: 萘甲唑啉滴鼻液
- D: 酚麻美敏片

答案：C

23. 痛经症状严重者可选用的处方药为

- A: 贝诺酯
- B: 可待因
- C: 布洛芬
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

24. 含马兜铃酸的中药可导致

- A: 肾小管阻塞
- B: 不可逆性肾小管坏死
- C: 直接肾毒性
- D: 肾间质纤维化

答案：D

25. 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

- A: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，不需要使用额外的避孕措施
- B: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，在以后的 7 天内要加用屏障避孕法
- C: 在常规时间 20:00 服用 4 月 25 日的药片，不用补服 4 月 24 日的药片
- D: 不再继续服用此周期药物，经过一个 7 天的停药期，再开始继续服用下一周期的药物

答案：A

26. 患者，男，56 岁，因高血压常年服用苯磺酸氨氯地平 10mgqd，近期体检血脂指标为 LDL—C4.8mmol / L，药师应建议患者加服

- A: 阿托伐他汀
- B: 二甲双胍
- C: 福辛普利
- D: 叶酸

答案：A

27. 用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 西格列汀
- C: 格列吡嗪
- D: 二甲双胍

答案：C

28. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 氯吡格雷片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 双嘧达莫片
- D: 华法林片

答案：A

29. 起效快，抗焦虑作用强，对急性期焦虑患者可考虑短期使用的治疗药是

- A: 苯海索
- B: 丁螺环酮
- C: 加兰他敏

D: 地西洋

答案: D

30. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC 12.4×10

A: 1 片 bid

B: 1.5 片 qd

C: 1/2 片 qd

D: 1 片 qd

答案: D

31. 根据老年人的特殊生理变化，80 岁以上老年人用药的初始剂量应为成人剂量的

A: 45355

B: 1 / 5~1 / 4

C: 45387

D: 45293

答案: D

32. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

A: 3 岁以下儿童不应使用非处方抗感冒药

B: 抗生素对导致感冒和流感的病毒都有作用

C: 治疗成人感冒症状有效的药物仅限于非处方解热镇痛药和减轻鼻充血药

D: 感冒药连续服用不得超过 7 天

答案：B

33. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径, 半衰期 12h 的药物通常选择()

A: 2~3 个半衰期给药 1 次

B: 静脉滴注给药

C: 每个半衰期给药 1 次

D: 每日给药 1 次

答案：C

34. 纳洛酮作解毒剂用于

A: 阿片中毒

B: 巴比妥类中毒

C: 阿米替林中毒

D: 有机氟中毒

答案：A

35. 若空腹服药, 则胃排空快, 药物在短时间内进入十二指肠与小肠; 餐后服用可延缓胃排空, 使药物在胃中较充分地吸收, 且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此, 一般药品适宜餐后服用。

A: 餐后服用

B: 餐中服用

C: 餐前服用

D: 清晨服用

答案：C

36. 口服铁剂宜选用

- A: 2 价铁
- B: 3 价铁
- C: 1 价铁
- D: 4 价铁

答案：A

37. 从事药学服务的药师必须具备的专业技能是

- A: 沟通技能
- B: 药物警戒技能
- C: 调剂技能
- D: 药历书写技能

答案：C

38. 患者，女，8 岁，体重 22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在 2 天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3 天。在过去的 2 年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在 3 个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸 30 次 / 分、血压 110 / 83mmHg、心率 130 次 / 分、体温 37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO₂）90%。

- A: 茶碱片
- B: 孟鲁司特咀嚼片
- C: 雾化沙丁胺醇
- D: 沙丁胺醇静脉注射

答案：C

39. (2016 年真题) 患者，女，35 岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是 20 天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是 ()。

- A: 腭裂
- B: 牙齿色素沉着
- C: 流产或发育成正常胚胎
- D: 骨骼发育异常

答案: C

40. ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药的 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；ADR 因果关系可评价为

- A: 很可能
- B: 可能无关
- C: 可能
- D: 待评价

答案: B

41. 配制下列化疗药时只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是 ()

- A: 博来霉素
- B: 环磷酰胺
- C: 奥沙利铂
- D: 依托泊苷

答案: C

42. 躯干部出现鞭打状色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 柔红霉素
- C: 白消安

D: 氟尿嘧啶

答案: A

43. 属于 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是

A: 阿米替林

B: 文拉法辛

C: 吗氯贝胺

D: 氟西汀

答案: B

44. 以下药物中，不属于 WHO 划定的一线抗结核药物的是()

A: 吡嗪酰胺(Z)

B: 利福平(R)

C: 链霉素(S)

D: 异烟肼(H)

答案: C

45. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

A: 低血糖症状

B: 过敏反应

C: 血糖不降

D: 血压升高

答案: A

46. 药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

- A: 成本-效果分析
- B: 最大成本法
- C: 最小成本法
- D: 成本-效益分析

答案：A

47. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患荨麻疹患者常出现的血常规检查异常是

- A: 血小板计数增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 血红蛋白减少

答案：B

48. 癫痫持续状态首选的治疗方案是()

- A: 静脉注射丙戊酸钠 200mg
- B: 口服地西泮 10mg
- C: 静脉注射地西泮 10mg
- D: 口服丙戊酸钠 200mg

答案：C

49. 用药后可出现非痛风性多关节痛的抗结核药是

- A: 链霉素
- B: 乙胺丁醇
- C: 吡嗪酰胺

D: 利福平

答案: C

50. 依据 CTP 评分，肝功能不全 A 级病人用药剂量为正常患者剂量的

A: 50%维持剂量

B: 60%维持剂量

C: 80%维持剂量

D: 70%维持剂量

答案: A

51. 为防止血管扩张、促进毒物吸收。应用 1%氯化钠溶液洗胃应该避免的是

A: 多次反复进行冲洗

B: 最多不超过 500ml

C: 减小注入压力

D: 溶液事先加热

答案: D

52. 服用维生素 A、维生素 D 等应该食用的是

A: 食醋

B: 酒

C: 食盐

D: 脂肪

答案: D

53. IV 期新药临床试验样本数要求

A: 常见病 $\geq$ 12000 例

B: 主要病种 $\geq$ 300 例

C: 20~30 例

D: ≥ 300 例

答案：A

54. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗寻常痤疮时，正确的用法是（）

A: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

B: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏

C: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用

D: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶

答案：D

55. 服用抗结核药异烟肼时，不

A: 吸烟

B: 饮酒

C: 吃鱼

D: 喝茶

答案：C

56. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是（）

A: 痛风

B: 双侧肾动脉狭窄

C: 心力衰竭

D: 冠心病

答案：C

57. 药物治疗管理 (MTM) 是由美国多家药师协会学会共同定义：通过重整患者的医嘱药物或药疗方案，评估药物治疗的有效性、安全性和经济性，核查患者的用药依从性。旨在提高患者的生命质量，目前我国药学服务行业也属于热门话题。下列人群中最需要提供药物治疗管理的是

- A: 糖尿病患者
- B: 沙眼患者
- C: 湿疹患者
- D: 肺炎患者

答案：A

58. 另有草药专辑、营养品专辑、眼药专辑、非处方药和食品补充剂专辑的是

- A: 《英国国家处方集》
- B: 《中国国家处方集 (2010 年版) 》
- C: 《医师案头参考》
- D: 《国家基本药物处方集 (2012 年版) 》

答案：C

59. 患者，男，22 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃。经实验室和 X 线胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是

- A: 亚胺培南-西司他丁
- B: 阿米卡星
- C: 阿奇霉素
- D: 阿莫西林

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

60. 抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的“盐” $1\mu\text{g}$ 作为 IU 的抗生素是

- A: 红霉素
- B: 链霉素
- C: 土霉素
- D: 四环素

答案：D

61. 对局部发生水疱和糜烂者可选用

- A: 赛庚啶
- B: 溃疡膏
- C: 10%樟脑软膏
- D: 10%氧化锌软膏

答案：D

62. 饮水冲淡药物对感受器的刺激是指

- A: 舌下片（丸）
- B: 抗利尿药
- C: 苦味健胃药
- D: 利胆药

答案：C

63. （2015 年真题）痛风急性发作期应禁用的药物（）。

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 布洛芬
- D: 碳酸氢钠

答案：A

64. 可造成儿童呼吸抑制，故 5 岁以下儿童不宜应用的是

- A: 喷托维林
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 右美沙芬

答案：A

65. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片
- B: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片
- C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液
- D: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

答案：C

66. 可以迅速缓解哮喘症状，起效快的药品是

- A: 吸入型糖皮质激素
- B: 非甾体抗炎药
- C: β 受体拮抗剂
- D: 短效 β

答案：D

67. 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是

- A: 氟马西尼
- B: 青霉胺
- C: 纳洛酮
- D: 乙酰胺

答案：B

68. 医师书写处方时经常使用外文缩写，医师在指导用药时需要准确掌握和解释。OS. 是()

- A: 右眼
- B: 适量
- C: 立即
- D: 左眼

答案：D

69. 属于雄激素受体拮抗剂，使增生的前列腺体积缩小的药品

- A: 黄酮哌酯
- B: 非那雄胺
- C: 氟他胺
- D: 阿夫唑嗪

答案：C

70. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

- A: 再生障碍性贫血
- B: 缺铁性贫血
- C: 巨幼细胞性贫血
- D: 溶血性贫血

答案：B

71. 如“齐二药事件”

- A: 药品上市后风险评估

- B: 药品上市前风险评估
- C: 发现与规避假、劣药流入市场
- D: 发现药品质量问题

答案：C

72. 药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是()

- A: 异烟肼与牛奶同服
- B: 华法林与人参同服
- C: 左甲状腺素与钙剂同服
- D: 硫酸亚铁与维生素 C 同服

答案：D

73. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

- A: 精神刺激剂
- B: β 受体阻断剂
- C: 利尿剂
- D: 钙通道阻断剂

答案：D

74. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 抗菌药物
- B: 布洛芬
- C: 阿司匹林
- D: 糖皮质激素

答案：D

75. 核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂 ()

- A: PIs
- B: FIs
- C: NNRTIs
- D: NRTIs

答案: D

76. 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

- A: 需增加给药剂量
- B: 须谨慎使用，必要时减量给药
- C: 一般无须调整剂量
- D: 尽可能避免使用

答案: C

77. 患者，男，72 岁，因腰痛无法起床 1 天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经 X 线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

- A: 长期服用抗癫痫药
- B: 老年性骨质疏松症
- C: 长期服用糖皮质激素
- D: 维生素 D 中毒

答案: B

78. 缺铁性贫血患者常表现为 ()

- A: 血红蛋白减少
- B: 中性粒细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 红细胞增多

答案：A

79. 常见老年人 ADR 的药物类别, 普萘洛尔致心动过缓、心脏停搏、诱发哮喘, 加重心衰

A: β 受体阻断剂

B: 抗胆碱药

C: 抗生素

D: 钙通道阻滞剂

答案：A

80. “室温”所指温度范围是

A: $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$

B: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

C: $-5^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

D: $2^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$

答案：A

81. 适用于阿司匹林哮喘伴有过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

A: 孟鲁司特钠咀嚼片

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 茶碱片

D: 异丙托溴铵气雾剂

答案：A

82. 非选择性 β -受体阻断剂的禁忌证是

A: 高血钾

- B: 体位性低血压
- C: 哮喘
- D: 充血性心力衰竭

答案: C

83. 患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温 38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

- A: 0.8g，3 次 / 日
- B: 0.8g，2 次 / 日
- C: 0.8g，4 次 / 日
- D: 0.8g，5 次 / 日

答案: A

84. 适用于绝经过渡期()

- A: 单纯雌激素补充治疗
- B: 雌孕激素连续联合用药
- C: 雌孕激素序贯用药
- D: 单纯孕激素补充治疗

答案: D

85. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 吗啡
- B: 痰液稀释剂
- C: 氨茶碱
- D: 泼尼松

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/475142322124012033>