

2023 年执业药师之西药学综合知识与技能基础试题库和答案要点

单选题（共 50 题）

1、白细胞分类中，淋巴细胞参考范围为

- A.1%~5%
- B.50%~70%
- C.20%~40%
- D.3%~8%
- E.0~1%

【答案】 C

2、与西咪替丁、喹诺酮类及大环内酯类药物合用，应减少其用量的药品是

- A.孟鲁司特
- B.氨茶碱
- C.异丙托溴铵
- D.噻托溴铵
- E.抗 IgE 抗体

【答案】 B

3、（2016 年真题）患者，女，55 岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶

呤用法用量正确的是（ ）。

A.75mg qd

B.7.5mg tid

C.7.5mg qod

D.7.5mg qw

E.7.5mg qm

【答案】 D

4、肝功能评价的方法是

A.CH_A DS₂ -VAS_e评分

B.HAS-BLED₂评分

C.CTP分级

D.FEV₁占预计值%

E.CAT评分

【答案】 C

5、处方中“餐后给药”的外文缩写是

A.Ac

B.pc

C.po

D.qn

E.prn

【答案】 B

6、(2020 年真题) 患者,男,66 岁,2 型糖尿病,长期口服二甲双胍,格列美脲,近日查空腹血糖 12.3mmol/L,糖化血红蛋白 9.0%,主诊医师加用“甘精胰岛素每日 1 次+门冬胰岛素每日 3 次”,关于该患者药物治疗方案的说法,正确的是()

- A.门冬胰岛素应在三餐前 30 分钟皮下注射
- B.因采用一日多次胰岛素治疗,格列美脲应停用
- C.患者为 2 型糖尿病,加用胰岛素一日 4 次方案不适宜
- D.甘精胰岛素应避免与二甲双胍联合使用
- E.因采用一日多次胰岛素治疗,二甲双胍应停用

【答案】 B

7、患者,女,71 岁,2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白(HbA)9.2%,空腹血糖 10.5mmol/L,餐后血糖 15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片 0.5 g tid po, 格列美脲片 2 mg tid po, 罗格列酮片 2 mg bid po, 甲钴胺片 0.5mg tid po, 羟苯磺酸钙胶囊 250 mg bid po 。

- A.二甲双胍片 0.5 g tid po
- B.格列美脲片 2 mg tid po
- C.罗格列酮片 2 mg bid po
- D.甲钴胺片 0.5 mg tid po
- E.羟苯磺酸钙软胶囊 250 mg bid po

【答案】 B

8、以下有关高血压的药物治疗方案的叙述中,不正确的是

- A.可采用两种或两种以上药物联合用药
- B.药物治疗高血压时要考虑患者的并发症
- C.采用最小有效剂量，使不良反应减至最小
- D.首先选用血管扩张剂和中枢性抗高血压药
- E.最好选用一天 1 次给药持续 24 小时降压的药品

【答案】 D

9、治疗缺铁性贫血的首选药物是

- A.叶酸
- B.维生素 B12
- C.硫酸亚铁
- D.维生素 C
- E.硫酸铁

【答案】 C

10、一新生儿确诊感染乙型肝炎，提示其生母妊娠期间血清学检查结果是

- A.HBsAg为阳性
- B.HBeAg为阳性
- C.HBsAg HBeAg均为阳性
- D.HBsAb HBeAg均为阳性
- E.HBsAg HBeAb均为阳性

【答案】 C

11、洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀等他汀类所致的药源性损伤为

- A.胃肠道损害
- B.肝损害
- C.肾损害
- D.肺损害
- E.神经损害

【答案】 B

12、长期慢性便秘者不宜长期大量使用的是

- A.硫酸镁
- B.乳果糖
- C.番泻叶
- D.开塞露
- E.聚乙二醇 4000

【答案】 C

13、（2016 年真题）患者到药店购买“扑尔敏片”，药师应给予（ ）。

- A.氯苯那敏片
- B.阿昔洛韦片
- C.更昔洛韦片
- D.奥司他韦片
- E.苯海拉明片

【答案】 A

14、荨麻疹患者常出现()

- A.血红蛋白减少
- B.中性粒细胞增多
- C.嗜酸性粒细胞增多
- D.血小板计数增多
- E.淋巴细胞增多

【答案】 C

15、白细胞分类中，嗜酸性粒细胞参考范围为

- A.1%~5%
- B.50%~70%
- C.20%~40%
- D.3%~8%
- E.0~1%

【答案】 A

16、对过敏性结膜炎宜选用()

- A.0.1%羟苄唑
- B.0.1%利巴韦林
- C.阿昔洛韦
- D.醋酸氢化可的松
- E.硫酸锌

【答案】 D

17、(2017 年真题) 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20 IU/L，血肌酐 (Cr) 1.8 mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率 ≤ 5 ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

A.25.5ml/min

B.30ml/min

C.34ml/min

D.40ml/min

E.47.2ml/min

【答案】 A

18、 治疗滴虫性阴道炎可应用的处方药是

A.甲硝唑栓

B.克霉唑栓

C.硝酸咪康唑栓

D.聚甲酚磺醛栓

E.甲硝唑栓或替硝唑栓

【答案】 D

19、(2017 年真题) 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是 ()

- A. 金刚烷胺
- B. 奥司他韦
- C. 金刚乙胺
- D. 利巴韦林
- E. 阿昔洛韦

【答案】 B

20、半衰期 150-200h，属于长效磺胺类药物是

- A. 磺胺嘧啶
- B. 替硝唑
- C. 磺胺多辛
- D. 磺胺甲噁唑
- E. 磺胺二甲嘧啶

【答案】 C

21、药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A. 药理作用

- B.药物的使用
- C.药物制剂因素
- D.药动学相互作用
- E.药效学相互作用

【答案】 C

22、据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达80%左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A.缬沙坦
- B.甲氧多巴
- C.卡托普利
- D.硫酸镁
- E.硝苯地平

【答案】 D

23、（2016年真题）甲状腺功能亢进患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是（ ）。

- A.粒细胞减少症
- B.消化性溃疡
- C.慢性肾衰竭
- D.溶血性贫血
- E.呼吸抑制

【答案】

24、长期的高磷血症会导致心脏、血管钙化，腹膜透析患者必须在进食的同时服用的药物是

- A.铁剂
- B.磷化物
- C.磷结合剂
- D.钙结合剂
- E.磷软化剂

【答案】 C

25、可升高红细胞，用于肾性及非肾性贫血的是

- A.硫酸亚铁
- B.非格司亭
- C.维生素 B12
- D.重组人促红素
- E.蔗糖铁

【答案】 D

26、患者,女,45 岁,6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁,在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗,症状控制较好,近 3 个月服用西咪替丁,患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱,该患者各地求医,服用各种药物,具体药物品种不详。围绕该病例,医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

- B.卡马西平
- C.丙戊酸钠
- D.苯巴比妥
- E.苯妥英钠

【答案】 C

27、具有沉淀作用，不宜在胃内滞留，可用浓茶代替的洗胃液是

- A.1：5000 高锰酸钾
- B.活性炭混悬液
- C.淀粉溶液
- D.3%鞣酸溶液
- E.生理盐水

【答案】 D

28、应用患儿年龄、体重或体表面积等计算用药剂量，显示儿童用药应该

- A.密切监护
- B.避免食物的影响
- C.严格掌握用药剂量
- D.根据儿童特点选择适宜的给药方案
- E.明确诊断。选择疗效确切、不良反应小的药物

【答案】 C

成复方制剂的目的是

- A.减轻焦虑
- B.保肝
- C.减轻胃肠道反应
- D.减轻骨髓抑制
- E.防止脱发

【答案】 C

30、使用硫酸亚铁片治疗缺铁性贫血，元素铁的治疗量是

- A.60mg qd
- B.60mg bid
- C.60mg tid
- D.100mg/次
- E.180mg/次

【答案】 C

31、给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

- A.密切监护
- B.避免食物的影响
- C.严格掌握用药剂量
- D.根据儿童特点选择适宜的给药方案

【答案】 D

32、慢性汞中毒患者的首发症状是（ ）

- A.口腔炎
- B.易兴奋症
- C.神经衰弱
- D.剥脱性皮炎
- E.意向性震颤

【答案】 C

33、患者男 78 岁,因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑,用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是（ ）

- A.氟康唑抑制华法林的肾脏排泄,导致华法林血药浓度升高
- B.氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力,导致血中游离的华法林浓度升高
- C.氟康唑可增加华法林的吸收,导致华法林血药浓度升高
- D.氟康唑可抑制 CYP2C9,导致华法林血药浓度升高
- E.氟康唑可抑制 CYP3A4,导致华法林血药浓度升高

【答案】 D

34、通过直接阻断 α

- A.利血平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/475341003131011323>