

助产士考试真题精选及答案 8 篇

助产士考试真题精选及答案 8 篇 第 1 篇

实施男性绝育术在复通后比女性绝育术复通后的复孕率要高。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

患者剖宫产术后 30 天，突然阴道大出血 3 小时，入院时血压 70 / 40mmHg，心率 130 次 / 分，血色素 60g / L。患者出血的原因首先考虑()。

- A. 胎盘胎膜残留
- B. 继发性子宫收缩乏力
- C. 剖宫产后子宫切口裂开出血
- D. 胎盘附着面血栓脱落
- E. 胎盘部位滋养叶细胞疾病

正确答案：C

盆腔炎性疾病感染途径描述不正确为()。

- A. 沿生殖道黏膜上行感染是非妊娠期、非产褥期盆腔炎性疾病的主要感染途径
- B. 经淋巴系统蔓延是放置宫内节育器感染的主要途径
- C. 经淋巴系统蔓延是产褥感染主要途径

D.经血循环传播是结核菌感染主要途径

E.直接蔓延是阑尾炎及流产后感染的主要传播途径

正确答案：E

人工流产术后 10 多天，仍有较多阴道流血，首先应考虑()

A.吸宫不全

B.子宫穿孔

C.子宫内膜炎

D.宫颈裂伤

正确答案：A

常用的发育诊断性方法有丹佛发育筛查测验、儿童智能筛查测验量表、绘人试验、图片词汇测验、瑞文测验等。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

使用 **DMPA**期间，骨密度轻度降低，停止使用后又升高至正常，这种变化会增加骨折的风险。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

药物流产中使用前列腺素药物的禁忌证包括()。

A.心血管疾病

- B. 青光眼
- C. 哮喘
- D. 癫痫
- E. 结肠炎

正确答案：ABCDE

关于产后出血,下列正确的有()。

- A. 胎盘娩出后 24 小时内的出血量超过 500ml 游为产后出血
- B. 产后出血是我国目前孕产妇死亡最主要的原因
- C. 产后出血的病因有宫缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤和凝血功能障碍
- D. 产后出血最常见的病因是宫缩乏力
- E. 胎盘娩出前阴道多量出血应首先考虑宫缩乏力

正确答案：BCD

培养婴幼儿的注意力应从哪些方面着手()。

- A. 加强注意目的性教育
- B. 无意注意
- C. 有意注意
- D. 有意注意和无意注意两者交替进行
- E. 根据年龄特点进行

正确答案：ADE

助产士考试真题精选及答案 8 篇 第 2 篇

下述哪项不是维持子宫正常位置的韧带()。

- A.圆韧带
- B.阔韧带
- C.骶棘韧带
- D.主韧带
- E.宫骶韧带

正确答案：C

下列哪些是第二代 IUD()。

- A.带铜 V 形节育器
- B.左旋 18 甲基炔诺酮丁形 IUD
- C.活性 γ 形 IUD
- D.含铜宫腔形 IUD
- E.硅胶 T 形 IUD

正确答案：ABCD

关于月经下列哪项是错误的()。

- A.月经周期从月经来潮第 1 天算起
- B.经血一般不凝，是由于缺乏凝血因子
- C.一次月经出血量为 30~50mL

D.正常月经周期是 28~30 天加减 3 天

E.经血中含有子宫内膜碎片、宫颈黏液及脱落的阴细胞

正确答案：B

关于子宫腺肌症的描述,下列哪项是正确的()。

A.子宫腺肌症是一种肿瘤

B.与雌激素无关

C.当子宫内膜侵入子宫肌层时,称子宫腺肌症

D.多发生于未产妇

E.病灶累及前壁居多

正确答案：C

下列疾病易发生 DIC除外哪种()。

A.过期流产

B.重度妊高征

C.早产

D.胎盘早剥

E.前置胎盘大出血休克

正确答案：C

雄激素是合成孕激素的前体,且是维持女性正常生殖功能的重要激素。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

在人工流产后可以马上开始服用复方口服避孕药，服用后 7 天内应采用其他避孕措施。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

因胎盘残留致晚期产后出血的产妇，首先的治疗是()。

- A.绝对卧床
- B.行开腹探查术
- C.行子宫动脉结扎
- D.输血，补充血容量
- E.刮宫术

正确答案：E 此产妇产后出血的原因为胎盘残留，影响子宫收缩，故应针对病因行刮宫术。

女性，25 岁，剖宫产术后 3 月，性交后出现下腹疼痛伴发热 2 天。妇科检查：子宫后位，正常大小，轻压痛，双侧附件区明显增厚及压痛。血 WBC $18 \times 10^9 / L$ ，尿妊娠试验(一)。可能的诊断()。

- A.子宫内膜异位症
- B.异位妊娠
- C.卵巢囊肿蒂扭转

D.输卵管积水

E.急性盆腔炎

正确答案：E

助产士考试真题精选及答案 8 篇 第 3 篇

留体激素避孕方法主要通过下列什么环节发挥避孕作用()。

A.抑制生殖细胞的生成

B.抑制排卵

C.抗着床

D.改变宫颈黏液的性状

E.子宫内膜非细菌性炎症

正确答案：BCD

席汉氏综合征引起的闭经属于()。

A.子宫性闭经

B.卵巢性闭经

C.垂体性闭经

D.下丘脑性闭经

E.中枢性闭经

正确答案：C

医师进行实验性临床医疗,应当()。

- A. 征得本人口头同意
- B. 经医院批准
- C. 征得患者本人或者其家属同意
- D. 经医院批准并征得患者本人或者其家属同意
- E. 与本人签订知情同意书

正确答案：D

妊娠期心脏负担最重的哪个时期容易发生心衰()。

- A. 早孕期
- B. 孕 32 到 34 周
- C. 分娩期
- D. 产褥期
- E. 产后 3 日

正确答案：BCE

女性生殖管道始基是()。

- A. 中肾管
- B. 副中肾管
- C. 性索
- D. 苗勒氏管
- E. 生殖嵴

正确答案：B

妊娠 29 周及其以后为晚期妊娠。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

1 岁左右行走时出现腰椎前凸。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

男,4 岁,体检:“O 型腿,血钙 $2.5 \text{ mmol} / \text{L}$ ($10 \text{ mg} / \text{dL}$)、血磷 $1.6 \text{ mmol} / \text{L}$ ($5 \text{ mg} / \text{dL}$)、碱性磷酸酶 $140 \text{ U} / \text{L}$ (金氏单位)。诊断为()。

- A.佝偻病初期
- B.佝偻病激期
- C.佝偻病恢复期
- D.佝偻病后遗症期
- E.软骨营养不良

正确答案：B

孕妇行剖宫产的绝对指征应是()

- A.颏前位
- B.臀先露
- C.骶耻外径 14 cm

持续性枕后位

正确答案：C

助产士考试真题精选及答案 8 篇 第 4 篇

男性外生殖器从开始发育到发育成熟的平均时间为()。

- A.半年
- B.1 年
- C.2 年
- D.3 年
- E.4 年

正确答案：D

长效避孕针 DMPA 和 NET-EN 分别是每几个月注射一次()。

- A.3、2
- B.2、1
- C.3、1
- D.1、3
- E.2、3

正确答案：A

小儿会踢球,会跑,会说 2~3 个字的短句,能按嘱完成简单动作。其最可能的年龄是几岁()。

岁

B.1 岁半

C.2 岁

D.3 岁

E.4 岁

正确答案：C

单卵双胎下列哪些不正确()。

A.由一个受精卵分裂而形成的双胎妊娠

B.单卵双胎占双胎妊娠的 2/3

C.单卵双胎发生率受种族、遗传、药物影响

D.受精后 9~13 日分裂，易和双卵双胎混淆

E.单卵双胎两胎儿可以性别不同

正确答案：BCDE

输卵管结扎术手术时间可以为分娩后、中期妊娠引产流产后及人流后,但不适用银夹法。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

提示胎盘功能低下的是()。

A.胎儿监护试验阳性

B.缩宫素激惹试验阴性

羊膜镜检查羊水为白色浊状

D.妊娠 36 周血清胎盘生乳素为 8ug/mL

E.妊娠 36 周尿雌三醇测定为 8mg/24h,1 周后测定为 4mg/24h

正确答案：E

我国优选 IUD 的标准是放置 1 年时的妊娠率是多少()。

A.≤1%

B.≤2%

C.≤3%

D.≤4%

E.≤5%

正确答案：B

产褥感染中毒症状严重者,抗生素治疗同时短期加用肾上腺皮质激素,提高机体应激能力。()

此题为判断题(对,错)。

正确答案：√

卵巢合成及分泌的性激素均为甾体激素。

此题为判断题(对,错)。

正确答案：√

助产士考试真题精选及答案 8 篇 第 5 篇

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/476041133142010221>