SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

内科学模拟试题含答案

1、有关 RA 晨僵描述正确的是:()

A、晨僵常为 RA 非常突出的临床表现

B、出现晨僵的原因可能由于在睡眠或活动减少时,水肿液蓄积在炎性组织中的缘故

C、随着肌肉的收缩、水肿液被淋巴管和小静脉所吸收,晨僵也随着缓解

D、当 RA 病情缓解时,晨僵渐渐消失,它是评估 RA 活动的指标之一

E、以上均是

答案：E

2、诊断反流性食管炎最准确的方法()

A、内镜检查

B、X 线钡餐检查

C、24 小时食管 pH 监测

D、食管滴酸试验

E、食管测压

答案：A

3、男性,34 岁。发现晨起眼睑水肿 2 年,腰酸,体格检查血压 167/93mmHg,双踝部凹陷性水肿,血红蛋白 101g/L,尿常规:蛋白++,红细胞 10~15 个/HP,白细胞 0~3 个/HP,24 小时尿蛋白定量 1.8g,血浆白蛋白 34g/L,血 Cr133.8μmol/L,BUN10.5mmol/L 最可能的诊断是()

A、缺铁性贫血

B、急性肾小球肾炎

C、慢性肾小球肾炎

D、肾病综合征

E、原发性高血压

答案：C

4、妊娠与狼疮下列说法不正确的是:()

A、在妊娠头 3 个月容易流产

B、末 3 个月及产后能导致病情加重

C、怀孕时避免用任何药物以免畸胎的发生

D、狼疮病人在病情至少稳定一年以上方可考虑怀孕

E、怀孕时孕妇也要服用激素治疗

答案：C

5、患者,32 岁,女性,2 年前分娩时失血过多伴晕厥,产后无乳汁,闭经 2~3 年伴怕冷乏力,体位性头晕,餐前经常手抖,心悸,饥饿感。查体:消瘦,嗓音低哑,

毛发稀疏,双乳房萎缩,BP80/50mmHg,血糖 4.0mmol/L(正常 3.68~6.12mmol/L),血皮质醇,雌二醇均低,B 超显示:子宫体积小。为纠正患者内分泌功能减退,最理想的治疗方法()

A、靶腺激素替代

B、用促激素刺激靶腺

C、应用促激素释放激素

D、抑制靶腺激素的拮抗激素

E、补充靶腺激素所调节的物质

答案：A

6、男 32 岁。发现血压增高 3 年。近 1 年血压持续为 170~200/130~140mmHg,近 1 周头痛、视物模糊。眼底检查发现视盘水肿,最可能的诊断为( )

A、急性视盘病变

B、脑出血

C、恶性高血压

D、脑梗死

E、高血压脑病

答案：C

7、急性感染性心内膜炎的常见致病菌是( )

A、立克次体

B、金黄色葡萄球菌

C、肺炎球菌

D、淋球菌

E、草绿色链球菌

答案：B

8、哪种药物可控制 Graves 病患者的部分症状,但不能降低甲状腺激素的合成与释放()

A、普萘洛尔

B、复方碘溶液

C、丙基硫氧嘧

D、甲巯咪唑

E、甲亢平

答案：A

9、风湿性二尖瓣狭窄最具诊断价值的检查是( )

A、心电图检查

B、胸部 X 线片

C、血沉检查

D、抗 O 检查

E、心脏听诊

答案：E

10、男,55 岁,无“三多一少”症状,空腹血糖 6.8mmol/L,有糖尿病家族史,疑糖尿病就诊,下列哪项试验最具有诊断意义()

A、尿糖定性

B、餐后 2 小时血糖

C、尿糖定量

D、OGTT 和胰岛素释放试验

E、糖化血红蛋白

答案：D

11、消化性溃疡最常见的并发症()

A、出血

B、穿孔

C、癌变

D、幽门梗阻

E、电解质紊乱

答案：A

12、下列哪一项最能提示急性胰腺炎为重症急性胰腺炎()

A、腹肌紧张有反跳痛

B、Grey-Turner 征

C、发热持续 3 天

D、剧烈腹痛

E、黄疸

答案：B

13、急性胰腺炎首发症状是()

A、腹痛

B、恶心

C、呕吐

D、发热

E、休克

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/476205142123010131