

版本要求

本课件需用office2010及以上版本打开，如果您的电脑是office2007及以下版本或者WPS软件，可能会出现不可编辑的文档。

乱码问题

如您在使用过程中遇到公式不显示或者乱码的情况，可能是因为您的电脑缺少字体，请登录网站www.canpointgz.cn/faq 下载。

联系我们

如您还有其他方面的问题，请登录网站www.canpointgz.cn/faq ，点击“常见问题” ，或致电010-58818058。



全品 学_了一_二 坼⁷考

高中数学

选择性必修第一册 RJA



第三章圆锥曲线的方程

录

3.1 椭圆

3.1.2 椭圆的简单几何性质

第2课时直线与椭圆的位置关系

课前预习课中探究 备课素材

探究点一直线与椭圆的位置关系

探究点二中点弦问题

探究点三生活中的椭圆问题

【学习目标】

1. 由直线与椭圆的方程，利用代数方法解决直线与椭圆位置关系的相关问题.
2. 能灵活运用椭圆的相关知识解决一些生活中的问题.

课前预习

◆ 知识点一 直线与椭圆的位置关系

直线 $y=kx+m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的位置关系的判断方法:

由 $\begin{cases} y = kx + m, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$ 消去 y , 得到一个关于 x 的一元二次方程.

直线与椭圆的位置关系、对应一元二次方程解的个数与 Δ 的取值的关系如下表所示:

位置关系	解的个数	Δ 的取值
相交	<u>2</u>	$\Delta > 0$
相切	1	$\Delta = 0$
相离		$\Delta < 0$

课前预习

【诊断分析】 判断正误. (请在括号中打“√”或“×”)

(1) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 与点 $P(b, 0)$, 则过点 P 可作出该椭圆的一条切线. (×)

[解析] 易知点 $P(b, 0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的内部, 因此过点 P 作不出椭圆的切线.

(2) 直线 $y = k(x - a)$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的位置关系是相交. (√)

[解析] 易知直线 $y = k(x - a)$ 恒过点 $(a, 0)$, 此点为椭圆的右顶点, 且直线斜率存在, 故直线与椭圆相交.

课前预习

◆ 知识点二 直线与椭圆的相交问题

解决椭圆中点弦问题的方法:

(1) 根与系数的关系法: 联立直线方程和椭圆方程构成方程组, 消去一个未知数, 利用一元二次方程根与系数的关系以及中点坐标公式解决.

(2) 点差法: 利用弦的端点在椭圆上, 坐标满足方程, 将端点坐标分别代入椭圆方程, 然后作差, 构造出中点坐标和斜率的关系.

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (x_2 \neq x_1)$, AB 的中点

为 $O(0, 0)$, 则有 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1, \end{cases}$ 两式相减得 $\frac{x_2^2 - x_1^2}{a^2} + \frac{y_2^2 - y_1^2}{b^2} = 0$, 整理得

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_2 + x_1}{y_2 + y_1} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_0}{y_0}, \text{ 即直线 } AB \text{ 的斜率 } k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$$

课中探究

◆探究点 一直线与椭圆的位置关系

例1 对不同的实数 m , 讨论直线 $y=x+m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的位置关系

解： 由 $\begin{cases} y = x + m, \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}$ 消去 y , 得 $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$,

则 $\Delta = (8m)^2 - 4 \times 5 \times (4m^2 - 4) = 16(5 - m^2)$.

当 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ 时, $\Delta > 0$, 直线与椭圆相交;

当 $m = -\sqrt{5}$ 或 $m = \sqrt{5}$ 时, $\Delta = 0$, 直线与椭圆相切;

当 $m < -\sqrt{5}$ 或 $m > \sqrt{5}$ 时, $\Delta < 0$, 直线与椭圆相离.

课中探究

变式(1) 若直线 $y = \frac{1}{2}kx + 2$ 与椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 相切则 k 的值是(C)

A.1

B.-1

C.±1

D.± $\frac{1}{3}$

[解析] 把 $y = \frac{1}{2}kx + 2$ 代入 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$, 得 $(1+k^2)x^2 + 8kx + 8 = 0$, 由题知 $\Delta = 0$, 所以 $k^2 = 1$, 所以 $k = \pm 1$.

课中探究

(2) 若直线 $y=kx+2$ 与焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 恒有两个公共点，则实数 b 的取值范围是 (2, 4)

[解析] 直线 $y=kx+2$ 恒过定点 $(0, 2)$ ，要使直线与椭圆恒有两个公共点，则定点在椭圆内， $\therefore \frac{0}{16} + \frac{4}{b^2} < 1$ ，又 $b > 0$ ， $\therefore b > 2$ 。又椭圆的焦点在 x 轴上， $\therefore b^2 < 16$ ， $\therefore b < 4$ 。故实数 b 的取值范围是 $(2, 4)$ 。

课中探究

[素养小结]

1. 判断直线与椭圆的位置关系时，由直线方程与椭圆方程构成方程组，消去方程组中的一个变量，得到关于另一个变量的一元二次方程，则

$\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 直线与椭圆相交；

$\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 直线与椭圆相切；

$\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 直线与椭圆相离.


2. 除联立椭圆方程与直线方程由判别式符号判断它们的交点个数外，还可利用直线的某些特征，如过定点等，把“直线与椭圆的位置关系”转化为“点与椭圆的位置关系”判断.

课中探究

拓展曲线: $y = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$ 与直线 $y = 2x + m$ 有且只有一个公共点, 则实数 m 的取

值范围是 $m = \sqrt{17}$ 或 $-4 \leq m < 4$

[解] 曲线 $y = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$ 即为曲线 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$
它为如图所示的半个椭圆. 由 $\begin{cases} y = 2x + m \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}$ 得



$17x^2 + 16mx + 4m^2 - 4 = 0$. 若直线与椭圆相切, 则

$\Delta = 16(17 - m^2) = 0$, 解得 $m = \pm\sqrt{17}$ 若直线过点 $(2, 0)$, 则 $m = -4$; 若直线

过点 $(-2, 0)$, 则 $m = 4$. 由图可知, 若曲线 $y = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$ 与直线 $y = 2x + m$ 有且

只有一个公共点, 则 $m = \sqrt{17}$ 或 $-4 \leq m < 4$.

课中探究

◆ 探究点二 中点弦问题

例2 已知点P(4,2)是直线l 被椭圆 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$ 所截得的弦的中点.

(1) 求直线l 的方程;

解：方法一：由题意可知直线l的斜率存在，设直线l的方程为 $y-2=k(x-4)$ ，直线l与椭圆的两交点分别为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，椭圆的方程可化为 $x^2+4y^2-36=0$.

将直线方程与椭圆方程联立，消去y化简得

$$4k^2+1)x^2-8k(4k-2)x+4(4k-2)^2-36=0, \text{ 所以 } x_1 + x_2 = \frac{8k(4k-2)}{4k^2+1} = 8$$

解得 $k = -\frac{1}{2}$ ，所以直线l的方程为 $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 4)$ 即 $x+2y-8=0$.

课中探究

方法二：设直线 l 与椭圆的交点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

则 $x_1^2+4y_1^2-36=0, x_2^2+4y_2^2-36=0$,

两式相减, 得 $(x_1+x_2)(x_1-x_2)+4(y_1+y_2)(y_1-y_2)=0$.

因为 $x_1+x_2=8, y_1+y_2=4$,

所以 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2} = -\frac{1}{2}$ 即直线 l 的斜率 $k = -\frac{1}{2}$, 所以直线 l 的方程为 $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 4)$

即 $x+2y-8=0$.

课中探究

(2) 求直线l 被椭圆截得的弦长.

解：由(1)可知直线l的方程为 $x+2y-8=0$ ，与椭圆的方程联立，消去y得 $x^2-8x+14=0$.

方法一：由 $x^2-8x+14=0$ ，得 $x=4+\sqrt{2}$ 或 $x=4-\sqrt{2}$ ，则可得 $\begin{cases} x = 4 + \sqrt{2}, \\ y = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ 或

$\begin{cases} x = 4 - \sqrt{2}, \\ y = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ ，所以直线l 被椭圆截得的弦长为

$$\sqrt{[(4 + \sqrt{2}) - (4 - \sqrt{2})]^2 + [(2 - \frac{\sqrt{2}}{2}) - (2 + \frac{\sqrt{2}}{2})]^2} = \sqrt{10} ,$$

方法二：由根与系数的关系可得 $x_1+x_2=8, x_1x_2=14$ ，所以直线l被椭圆截得的弦

长为 $\sqrt{1 + (-\frac{1}{2})^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + (-\frac{1}{2})^2} \times \sqrt{8^2 - 4 \times 14} = \sqrt{10} .$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/476205215223010141>