

国开电大《妇产科学与儿科护理学》

形考任务二参考答案

CTRL+F 搜索文档

试题 1

护理脱水补液的患儿时，如输液后患儿出现乏力、腹胀、肠鸣音减弱、腱反射消失、心音低钝，应考虑发生了()。

A.低钾血症

B.低氯血症

C.钙血症

D.低镁血症

E.低磷血症

正确答案是：低钾血症

试题 2

新生儿肺透明膜病患儿给予肺表面活性物质的途径是()。

A.口服

B.肌肉注射

C.静脉注射

D.气管内滴入

E.雾化吸入

正确答案是：气管内滴入

试题 3

新生儿出生后开始排胎便的时间一般为（ ）

A.生后 3 小时内。

B.生后 8 小时内。

C.生后 12 小时内。

D.生后 24 小时内。

E.生后 48 小时内。

正确答案是：产后 12 小时内。

试题 4

对新生儿窒息的描述，下列错误的是()。

- A.胎儿因缺氧发生宫内窘迫
- B.新生儿娩出后无呼吸或呼吸抑制
- C.出生时无窒息，数分钟后出现呼吸抑制不属于新生儿窒息
- D.是围产期婴儿死亡和致残的重要原因
- E.新生儿窒息是以呼吸功能障碍为主的一组综合征

正确答案是：出生时无窒息，数分钟后出现呼吸抑制不属于新生儿窒息

试题 5

缓解哮喘患儿呼吸困难的措施，不包括()。

- A.患儿取半卧位或头抬高位
- B.给予鼻导管或面罩给氧，氧浓度 30% ~ 40%

C.指导和鼓励患儿做浅而快的呼吸运动

D.定时进行血气分析，及时调整氧流量，保持 PaO₂ 在 70 ~ 90mmHg

E.及时评价药物治疗的效果和副作用

正确答案是：指导和鼓励患儿做浅而快的呼吸运动

试题 6

腹泻患儿在补充累积损失量时其静点速度约为每小时()。

A.2 ~ 4ml/kg

B.5 ~ 7ml/kg

C.8 ~ 10ml/kg

D.11 ~ 13ml/kg

E.14 ~ 16ml/kg

正确答案是：8 ~ 10ml/kg

试题 7

新生儿病理性黄疸要密切观察病情变化，观察内容不包括()。

- A.黄疸出现的时间、颜色、范围、部位
- B.监测生命体征、体温、哭声、吸吮力和肌张力等变化
- C.观察大小便次数、量及性质
- D.估计血清胆红素浓度
- E.腹部体征的变化

正确答案是：腹部体征的变化

试题 8

维生素 D 缺乏性佝偻病初期的主要临床表现是()。

- A.易激惹、多汗等神经精神症状
- B.颅骨软化
- C.肋骨串珠明显
- D.手镯征

E.X 型腿

正确答案是：易激惹、多汗等神经精神症状

试题 9

适于胎龄儿指的是新生儿出生体重在同胎龄儿平均体重（ ）

A.第 10 ~ 50 百分位数之间

B.第 10 ~ 60 百分位数之间

C.第 10 ~ 70 百分位数之间

D.第 10 ~ 80 百分位数之间

E.第 10 ~ 90 百分位数之间

正确答案是：第 10 ~ 90 百分位数之间

试题 10

一 Rh 溶血患儿，出现嗜睡、尖声哭叫、肌张力下降，胆红素上升至 $342\mu\text{mol/L}$ ，该患儿最可能发生了（ ）

A.颅内出血

B.呼吸衰竭

C.胆红素脑病

D.新生儿化脓性脑膜炎

E.低血糖

正确答案是：胆红素脑病

试题 11

超低出生体重儿是指（ ）

A.出生体重不足 2500g 的新生儿

B.出生体重不足 2000g 的新生儿

C.出生体重不足 1500g 的新生儿

D.出生体重不足 1000g 的新生儿

E.出生体重不足 800g 的新生儿

正确答案是：出生体重不足 1000g 的新生儿

试题 12

正常新生儿 Apgar 评分应为()

A.0 ~ 3 分

B.4 ~ 5 分

C.6 ~ 7 分

D.8 ~ 10 分

E.10 分以上

正确答案是：8 ~ 10 分

试题 13

对新生儿肺透明膜病患儿进行氧气疗法，PaO₂ 应维持在()。

A.6.7 ~ 9.3kPa (50 ~ 70mmHg)

B.2.7 ~ 9.3kPa (20 ~ 70mmHg)

C.2.7 ~ 5.3kPa (20 ~ 40mmHg)

D.10.7 ~ 13.3kPa (80 ~ 100mmHg)

E.2.7 ~ 13.3kPa (20 ~ 100mmHg)

正确答案是：6.7 ~ 9.3kPa (50 ~ 70mmHg)

试题 14

新生儿生后排尿的时间一般为 ()

A.生后 8 小时内

B.生后 10 小时内

C.生后 12 小时内

D.生后 24 小时内

E.生后 48 小时内

正确答案是：生后 24 小时内

试题 15

营养性缺铁性贫血的一般表现，不包括 ()。

A.皮肤、黏膜逐渐苍白或苍黄

B.易感疲乏无力，易烦躁哭闹

C.不爱活动

D.食欲减退

E.年长儿可诉头晕、腹痛

正确答案是：年长儿可诉头晕、腹痛

试题 16

关于生理性黄疸描述，不正确的是（ ）

A.生后 2~3 天开始出现黄疸

B.表现为食欲下降，哭声低弱

C.一般 7~14 天自然消退

D.早产儿可延迟 3 周消退

E.血清胆红素浓度 $<205.2\mu\text{mol/L}$

正确答案是：表现为食欲下降，哭声低弱

试题 17

指导家长对母乳喂养早产儿及低体重儿及早补充元素铁 $2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ，时间为（ ）。

A.出生后 4 周

B.出生后 8 周

C.出生后 3 月

D.出生后 4 月

E.出生后 6 月

正确答案是：出生后 4 周

试题 18

早产儿指的是（ ）。

A.胎龄小于 36 周的新生儿

B.胎龄小于 38 周的新生儿

C.胎龄小于 35 周的新生儿

D.胎龄小于 37 周的新生儿

E.胎龄小于 34 周的新生儿

正确答案是：胎龄小于 37 周的新生儿

试题 19

患儿，女，9 个月，人工喂养。近 4 天来大便次数明显增多，每日 15~18 次，蛋花汤样便，无脓血，偶有呕吐，近日尿量减少。查体：T38.5℃，血压 62/40mmHg，发病以来体重下降 7%，精神萎靡，前囟、眼窝凹陷。化验：血钠：140mmol/L，血钾 3.6mmol/L。

该患儿脱水的性质和程度是

A.等渗中度脱水

B.等渗重度脱水

C.低渗中度脱水

D.低渗重度脱水

E.高渗中度脱水

正确答案是：等渗中度脱水

试题 20

预防维生素 D 缺乏性佝偻病最应强调()。

A.合理喂养

B.经常口服钙片

C.经常服用鱼肝油

D.经常晒太阳

E.强母亲孕期及哺乳期的保健

正确答案是：经常晒太阳

试题 21

营养性缺铁性贫血的描述，错误的是()。

A.是由于体内铁缺乏导致血红蛋白合成减少所致

B.大细胞性贫血

C.血清铁蛋白减少

D.铁剂治疗有效

E.是我国重点防治的小儿常见病之一

正确答案是：大细胞性贫血

试题 22

肺炎合并心力衰竭的表现，不包括()。

A.心率突然加快，婴儿 ≥ 180 次/分，幼儿 ≥ 160 次/分

B.呼吸突然加快，超过60次/分

C.突然出现极度烦躁不安，明显发绀，面色发灰等

D.尿少或无尿，颜面、眼睑或下肢水肿，颈静脉怒张

E.脾脏迅速增大

正确答案是：脾脏迅速增大

试题 23

10%葡萄糖 200ml、 生理盐水 300ml、 1.4%碳酸氢钠 100ml,其混合液的张力是 ()。

A.1/2 张

B.1/3 张

C.2/3 张

D.1/4 张

E.等张

正确答案是：2/3 张

试题 24

正常新生儿的心率平均为 ()

A.90 ~ 99 次/min

B.100 ~ 109 次/min

C.110 ~ 119 次/min

D.120 ~ 140 次/min

E.150 ~ 160 次/min

正确答案是：120 ~ 140 次/min

试题 25

婴幼儿肺炎最常见的类型是()

A.大叶性肺炎

B.间质性肺炎

C.支气管肺炎

D.毛细支气管炎

E.非典型性肺炎

正确答案是：支气管肺炎

试题 1

对新生儿肺透明膜病患儿气管内滴入表面活性物质的描述，下列错误的是()。

A.应先作气管插管

B.将表面活性物质用 4~5ml 生理盐水或蒸馏水配制成混悬液

C.在 4 个不同体位（平卧、左侧、右侧卧位、再平卧）从气管滴入总量的 1/4

D.用药后 4~6 小时内可以进行气道内吸引

E.加压吸氧有利药液更好地弥散

正确答案是：用药后 4~6 小时内可以进行气道内吸引

试题 2

新生儿窒息的预防措施，不包含（ ）。

A.作好产前检查

B.对高危胎儿进行监护

C.孕妇不需检测血糖

D.教会孕妇自我监护测数胎动

E.出现胎动变慢或加速及心率改变时给孕妇吸氧

正确答案是：孕妇不需检测血糖

试题 3

目前哮喘治疗的最好方法是()。

A.口服药物治疗

B.吸入治疗方法

C.注射治疗

D.静脉注射治疗

E.手术治疗

正确答案是：吸入治疗方法

试题 4

人体所需的维生素 D 主要来源于()。

A.猪肝中的维生素 D

B.乳类中的维生素 D

C.蛋黄中的维生素 D

D.植物油中的维生素 D

E.人体皮肤中的 7-脱氢胆固醇

正确答案是：人体皮肤中的 7-脱氢胆固醇

试题 5

关于支气管哮喘的描述,错误的是 ()。

A.是一种以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病

B.以反复发作的喘息、咳嗽、气促和胸闷为主要临床表现

C.呼吸道症状的具体表现形式和严重程度随时间变化而改变

D.早期确诊及规范化治疗对预后至关重要

E.常在白日发作或加剧,夜间很少发作

正确答案是：常在白日发作或加剧,夜间很少发作

试题 6

新生儿病理性黄疸特点,错误的是()。

A.黄疸出现于出生后 2 天

B.程度重，血清胆红素超过 $221\mu\text{mol} / \text{L}(12.9\text{mg}/\text{dl})$

C.病情发展快，胆红素每日上升超过 $85\mu\text{mol} / \text{L}(5\text{mg} / \text{d1})$

D.黄疸消退延迟，足月儿超过 2 周

E.血清结合胆红素超过 $34\mu\text{mol} / \text{L}(2\text{mg}/\text{dl})$

正确答案是：黄疸出现于出生后 2 天

试题 7

一新生儿胎龄 37 周，出生体重 2600g，其出生体重在同胎龄儿平均体重的 15 百分位，该新生儿是（ ）

A.足月儿、适于胎龄儿

B.足月儿、小于胎龄儿

C.足月儿、大于胎龄儿

D.早产儿、适于胎龄儿

E.早产儿、大于胎龄儿

正确答案是：足月儿、适于胎龄儿

试题 8

佝偻病活动期（激期）的主要表现是（ ）

A.突然发生惊厥

B.易激惹、夜惊

C.骨骼系统改变

D.烦躁不安、多汗

E.各方面发育迟缓

正确答案是：骨骼系统改变

试题 9

营养性缺铁性贫血的治疗指导，错误的是（ ）。

A.注意休息

B.适量活动

C.生活有规律

D.绝对卧床休息

E.贫血较轻的患儿对日常活动均可耐受

正确答案是：绝对卧床休息

试题 10

早产儿生理特点的描述，下列描述不恰当的是（ ）。

A.呼吸功能不成熟

B.循环系统发育未完善

C.消化功能弱

D.生长发育慢

E.神经系统发育不成熟

正确答案是：生长发育慢

试题 11

腺病毒肺炎发病年龄最多见于()。

A.新生儿

B.2~6月婴儿

C.6~12月婴儿

D.6~24月小儿

E.任何年龄

正确答案是：6~24月小儿

试题 12

腹泻脱水患儿补液后排尿，此时输液瓶中尚有不合钾液体 300ml，此液体中最多可加入 10%氯化钾()。

A.6ml

B.9ml

C.10ml

D.12ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/477002152152006042>